

126. Wykaz chrząszczy z rodziny kusakowatych (*Coleoptera*, *Staphylinidae*) zebranych 2–6 VI 1994 na Ukrainie, u podnóża Gorganów

Checklist of the staphylinid beetles (*Coleoptera*, *Staphylinidae*) collected on 2–6 VI 1994 in West Ukraina, at the base of the Gorgany Mts.

Ukraina, Svaliava, okolice, 2–6 VI 1994, zbiór sitem entomologicznym, 66 gatunków.

Penetrowane środowiska:

I. Łęg nadrzeczny – rzeka Latorica

a) ściółka topolowo-wierzbowa

b) grzyb *Polyporus sulphureus*

II. Las górski

a) ściółka bukowa

b) grzyb *Polyporus sulphureus*

c) grzyb *Polysticus* sp.

c) nieokreślone grzyby nadrzewne

| | | | |
|--|---------|---|-------------|
| <i>Abemus chloropterus</i> (PANZ.) | IIa | <i>Habrocerus capillaricornis</i> (GRAV.) | IIa |
| <i>Acrulia inflata</i> (GYLL.) | IIId | <i>Ischnopoda balteata</i> (ER.) | Ia |
| <i>Aloconota gregaria</i> (ER.) | Ia | <i>Ischnopoda constricta</i> (ER.) | Ia |
| <i>Aloconota sulcifrons</i> (STEPH.) | Ia | <i>Ischnopoda umbratica</i> (ER.) | Ia |
| <i>Atheta boletophila</i> (THOMS.) | Ib IIId | <i>Lathrobium longulum</i> GRAV. | IIa |
| <i>Atheta crassicornis</i> (FABR.) | Ib IIId | <i>Liogluta granigera</i> (KIESENW.) | IIa IIId |
| <i>Altheta fungi</i> (GRAV.) | Ia IIa | <i>Mycetoporus inaris</i> LUZE | IIa |
| <i>Atheta liturata</i> (STEPH.) | Ib IIId | <i>Mycetoporus splendens</i> (MARSH.) | IIa |
| <i>Atheta pallidicornis</i> (THOMS.) | IIId | <i>Myllaena intermedia</i> ER. | Ia |
| <i>Atheta picipennis</i> (MANN.) | IIId | <i>Ocalea badia</i> ER. | IIa |
| <i>Atheta sodalis</i> (ER.) | IIId | <i>Ochtheophilus omalinus</i> (ER.) | Ib |
| <i>Atheta xanthopus</i> (THOMS.) | Ib | <i>Othius anagustus</i> STEPH. | IIId |
| <i>Autalia longicornis</i> SCHEERP. | IIId | <i>Oxypoda alternans</i> (GRAV.) | Ib IIc IIId |
| <i>Bolitochara obliqua</i> ER. | IIId | <i>Oxypoda haemorrhoea</i> (MANN.) | IIa |
| <i>Bolitochara reyi</i> SHARP | IIId | <i>Oxypoda lividipennis</i> MANN. | IIa IIId |
| <i>Brachyusa concolor</i> (ER.) | Ia | <i>Oxytelus sculpturatus</i> (GRAV.) | IIa |
| <i>Carpelimus angustae</i> BERNH. | Ia | <i>Planeustomus palpalis</i> (ER.) | Ia |
| <i>Carpelimus arcuatus</i> (STEPH.) | Ia IIa | <i>Plataraea elegans</i> (BENICK) | IIa |
| <i>Carpelimus corticinus</i> (GRAV.) | Ia | <i>Platystethus arenarius</i> (GEOFFROY) | IIc |
| <i>Carpelimus rivularis</i> (MOTSCH.) | Ia | <i>Phloeonomus minimus</i> (ER.) | IIId |
| <i>Drusilla canaliculata</i> (FABR.) | Ia | <i>Phloeonomus pusillus</i> (GRAV.) | IIc |
| <i>Evanystes circellaris</i> (GRAV.) | IIa | <i>Pseudosemiris kaufmanni</i> (EPELSH.) | Ib |
| <i>Falagria sulcatula</i> (GRAV.) | Ia | <i>Quedius fuliginosus</i> (GRAV.) | IIa |
| <i>Gabrius femoralis</i> (HOCHH.) | IIa | <i>Quedius humeralis</i> STEPH. | IIa |
| <i>Gabrius spurius</i> SMET. | Ia | <i>Quedius oblitteranus</i> ER. | IIa |
| <i>Gyrophaena affinis</i> (C. R. SAHLB.) | IIc | <i>Quedius obscuripennis</i> BERNH. | IIa |
| <i>Gyrophaena angustata</i> (STEPH.) | Ib IIId | <i>Quedius paradisianus</i> (HEER) | IIa |
| <i>Gyrophaena boleti</i> (L.) | Ib | <i>Quedius picipes</i> (MANN.) | IIa |
| <i>Gyrophaena fasciata</i> (MARSH.) | Ib | <i>Quedius umbrinus</i> ER. | IIa |
| <i>Gyrophaena joyioides</i> WÜSTHOFF | Ib | <i>Rugilus rufipes</i> GERM. | IIa |
| <i>Gyrophaena minima</i> ER. | IIId | <i>Scopaeus debilis</i> HOCHH. | Ia |
| <i>Gyrophaena nana</i> (PAYK.) | Ib | <i>Stenus boops</i> LJUNGH | Ia |
| <i>Gyrophaena strictula</i> ER. | Ib | <i>Stenus carpathicus</i> GANGLB. | IIa |

MARCIN SMOLEŃSKI, Warszawa