450. Nowe stanowisko *Cis lucasi* (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (*Coleoptera*: *Ciidae*) w Polsce

A new locality of *Cis lucasi* (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (*Coleoptera*: *Ciidae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*,*Ciidae*, *Cis lucasi*, new locality, Poland.

Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN) to gatunek zamieszkujący południową i zachodnią część Europy oraz południową część Europy środkowej, wykazywany ponadto z Algierii, Kaukazu i Syberii (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, **14**: 1-309). W Polsce wykazany niedawno z: Puszczy Białowieskiej, Niziny Mazowieckiej, Beskidu Zachodniego i Bieszczadów (KRÓLIK 2003: Acta ent. sil., **9–10**: 67-68).

W trakcie przeglądu zagrzybiałych pni topoli (*Populus* sp.) i wierzby (*Salix* sp.) stwierdziłem nowe stanowisko tego gatunku:

– Nizina Sandomierska: Dębica (UTM: EA34), II 2004, 3exx.

Wraz z omawianym gatunkiem zebrałem m.in.: *Sulcacis bidentulus* (ROSENHAUER, 1847), *Sulcacis affinis* (GYLLENHAL, 1827), o których informacje zostały opublikowane wcześniej (KRÓLIK i in. 2005: Wiad. entomol., **24**, 4**:** 227-233).

Dziękuję Panu Romanowi KRÓLIKOWI za oznaczenie chrząszczy oraz udostępnienie materiałów dotyczących chrząszczy z rodziny *Ciidae*.

Andrzej TRZECIAK, Nadleśnictwo Dębica

451. Nowe stanowisko *Triplax collaris* (SCHALLER) (*Coleoptera*: *Erotylidae*) w Polsce

A new record of *Triplax collaris* (SCHALLER) (*Coleoptera*: *Erotylidae*) in Poland

KEY WORDS: *Erotylidae*, *Triplax collaris*, new record, W Poland.

Triplax collaris (SCHALLER, 1783) po raz pierwszy został podany z Polski przez HORIONA w 1960 r. (BURAKOWSKI i in. 1986: Kat. Fauny Pol., XXIII, **13**: 1-278). Informację tę powtórzył MAZUR (1983: Klucze oznacz. Owad. Pol., XIX, **74–75**: 1-31); jednak obydwaj autorzy wyrazili wątpliwości co do rzeczywistego występowania tego gatunku w naszym kraju. Do tej pory jedynym pewnym stanowiskiem, na którym w Polsce odławiano *T. collaris*, była Puszcza Białowieska (BURAKOWSKI i in. 1986: ibid.; KUBISZ 2001: [W:] Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: 172; obserwacje własne – P. WĘGRZYNOWICZ). Poniżej podajemy pierwsze stanowisko tego rzadkiego chrząszcza na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej:

– Puszczykowo ad Poznań (UTM: XT29), 14 V 2005, 1 ex., na liściu buka w nasłonecznionej buczynie, leg. et coll. P. JAŁOSZYŃSKI.

W tym samym dniu w podobnych warunkach złowiono też dwa osobniki pospolitego przedstawiciela *Erotylidae* – *Tritoma bipustulata* FABR., również siedzące w miejscach nasłonecznionych na liściach buków.

Triplax collaris jest łatwy do odróżnienia od wszystkich krajowych gatunków tego rodzaju na podstawie czarno ubarwionej głowy. Gatunek ten jest rozmieszczony w środkowej i południowej Europie, jednak wszędzie spotykany sporadycznie, a wszelkie doniesienia są niezwykle rzadkie. Na temat jego bionomii też niewiele wiadomo; pewne informacje zebrał BU-

RAKOWSKI (BURAKOWSKI i in. 1986: ibid.). *Triplax collaris* troficznie związany jest z nieokreślonymi gatunkami grzybów nadrzewnych, które porastają martwe lipy i wiązy. W Puszczy Białowieskiej był również obserwowany na białych grzybach przypominających boczniaki, rosnących na zwalonym pniu osiki (obserwacje własne – P. WĘGRZYNOWICZ). Przepoczwarczenie następuje późnym latem, w kolebce, tuż pod powierzchnią gleby, na którą schodzą, a właściwie swobodnie spadają larwy po skończonym rozwoju. Zimują postacie dorosłe, podobnie zresztą, jak i w przypadku innych *Erotylidae* występujących w Polsce. Stadia przedimaginalne nie zostały do tej pory opisane.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Poznań
Piotr WĘGRZYNOWICZ, Muz. i Inst. Zool. PAN, Warszawa

452. *Calosota aestivalis* CURTIS – nowy dla Polski gatunek bleskotki (*Hymenoptera*: *Eupelmidae*) wyhodowany z *Anthaxia manca* (L.) (*Coleoptera*: *Buprestidae*)

Calosota aestivalis CURTIS – the chalcid wasp (*Hymenoptera*: *Eupelmidae*) new to the fauna of Poland reared from *Anthaxia manca* (L.) (*Coleoptera*: *Buprestidae*)

KEY WORDS: *Calosota aestivalis*, *Eupelmidae*, *Anthaxia manca*, *Buprestidae*, fauna, host record, W Poland.

Parazytoidy z należącej do bleskotek z rodziny *Eupelmidae* są w Polsce bardzo słabo poznane. Wykazano dotąd zaledwie 12 gatunków, podczas gdy w Czechach – 29 (ok. 760 w faunie światowej), z czego 3 należą do rodzaju *Calosota* CURTIS, 1836, wliczając niedawno odkrytego parazytoida *Agrilus salicis* FRIV. – *C. agrili* NIKOLSKAYA (WIŚNIOWSKI, MIŁKOWSKI 2005: Wiad. entomol., **24**, 4: 250-251). Kolejnego przedstawiciela tego rodzaju – *Calosota aestivalis* CURTIS, 1836 [= *C. vernalis* auct., nec *C. vernalis* CURTIS, 1836] – znaleziono w zachodniej części Polski, w rezerwacie „Bielinek" nad Odrą:

– Pojezierze Pomorskie, rez. „Bielinek" (UTM: VU46), 3 VI 2001, leg. J. M. GUTOWSKI, między „Wąwozem Paklonowym" a „Doliną Borsuczą", przy górnej krawędzi skarpy o wystawie południowo-zachodniej, stanowisko średnio nasłonecznione.

Materiał, w którym żerowały liczne larwy *Anthaxia manca* (L.) pobrano z dolnej części pni dwóch stojących, niedawno uschniętych wiązów *Ulmus minor* MILL. o średnicy 10 i 12 cm (GUTOWSKI 2006: Parki nar. Rez. Przyr., **25**, 1: 31-64). Do hodowli zebrano ok. 4 mb. wałków wiązu, które umieszczono w dużych szklanych cylindrach. Hodowle znajdowały się w ogrzewanym pomieszczeniu, były sukcesywnie przeglądane, regulowano wilgotność i wybierano lęgnące się owady. Wyhodowano łącznie 11 okazów *Calosota aestivalis*: 10 IX 2001 – 1 ex., 14 XI 2001 – 8 ex., 5 XII 2001 – 1 ex., 25 II 2002 – wydobyto 1 martwe imago. Z materiału wyhodowano także kilka gatunków chrząszczy (*Coleoptera*): *Ptilinus pectinicornis* (L.) (*Anobiidae*) (det. J. BOROWSKI), *Cis pseudolinearis* LOHSE (*Ciidae*) (det. D. KUBISZ), *Anaglyptus mysticus* (L.), *Clytus arietis* (L.) (*Cerambycidae*).

Calosota aestivalis nie był wcześniej notowany na terenie Polski, choć znany jest z krajów ościennych. Dotychczas jego występowanie stwierdzono w Europie i Azji Mniejszej na terenie następujących krajów: Chorwacja, Republika Czeska, Węgry, Izrael, Rosja (okręg kaliningradzki, Sankt Petersburg, okręg wołgogradzki), Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Zjedno-