

tego gatunku zebranych w Przemysłu przez ś. p. prof. Kotulę. W zbiorze inż. Stobieckiego w Krakowie znalazłem kilka sztuk opatrzonych nazwą *O. Kotulae*, którą to nazwę przyjmuję ze względu na to, że po raz pierwszy został ten gatunek znaleziony przez śp. Kotulę. Inne znane mi okazy znajdują się w zbiorze Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie (2 sztuki z Przemysła) oraz w mym prywatnym zbiorze (2 sztuki z Janowa).

Na podstawie klucza Reittera: Bestimmungs-Tabellen der europaeischen Coleopteren (Heft 70, Brünn 1913) dochodzi się do podrodzaju *Dorymerus* Seidl., i do grupy *Duphanastus* Reitt., zawierającej dotychczas 2 gatunki: *O. fraxini* Germ. z Alp i *O. Apfelbecki* Stierl. z Bośni i Krocji.

Od *O. fraxini* Germ. różni się wielkością, większą wypukłością ciała, obfitą szatą błyszczących łusek oraz oczyma bardziej wystającymi.

Od *O. Apfelbecki* Stierl. wyróżnia się wielkością, kształtem ryjka, oraz krótkością końcowych członków biczyka, które podobnie są wykształcone jak u *O. fraxini* Germ.

O biologji jego nic pewnego dotychczas nie wiadomo.

FAUNA OWADÓW OKOLIC LWOWA

[LES INSECTES DES ENVIRONS DE LEOPOL]

HALIPLIDAE (Col.)

podał

J. KINEL.

Na zebraniu II. z r. b. uchwaliła S. E. ogłaszać pod powyższym nagłówkiem wykazy serjami w miarę opracowywania poszczególnych grup. Serja koleopterów nawiązuje do publikacji A. M. Łomnickiego: Fauna okolic Lwowa. I. Chrząszcze (Coleoptera). [Sprawozd. Kom. Fiz. Ak. Um. w Krakowie, T. T. XXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX]. Rozpaczynam ją rodziną Flisakowatych na podstawie materiałów, zebranych przezemnie w ciągu kilku lat. Przejrzenie ich dało pewne zmiany w spisie Łomnickiego;

skreślić wypadło jeden gatunek: *Haliplus fulvicollis* Er., podany tam na podstawie mylnego oznaczenia; w okolicach Lwowa nie spotkałem go dotychczas.

BRYCHIUS Thoms.

B. elevatus Panz. Dwa okazy w wodzie stojącej pod zamkniętą śluzą stawu „na Grobli“ w Sokolnikach 24. VII. 1918; obok zaraz druga śluz, którą woda spływa do młyna.

HALIPLUS Latr.

H. variegatus Sturm. W okolicy Lwowa rzadki. Kłapacz znalazł go na Kleparowie w stawie Barana.

H. fulvus Fbr. Dwa okazy złowiłem w Szkle: 28. V. 1917 w jeziorze Borysowem i 6. VII. 1917 w jednym z jeziorek „na Kogutach“.

H. flavicollis Sturm. (*impressus* F.) Niezbyt rzadki. Poławiałem go na Kleparowie (staw Barana), Hołosku, w Dublanach, w Szkle (j. Borysowe); Kłapacz w Nawarji.

H. laminatus Schall. (*cinereus* Aubé). Dosyć pospolity. Mam okazy ze Snopkowa, Pohulanki, ze stawku koło gipsarni Franza i pobliskich stawków w południowej stronie Lwowa, z Dublan i Szklä.

H. ruficollis De Geer. Najpospolitszy gatunek zarówno jak:

H. heydeni Wehncke. Obydwa zachodzą się w każdej prawie wodzie, często razem.

H. fluvialis Aubé. Koło Lwowa dosyć pospolity. Mam go prócz Janowa z szeregu miejscowości bliższych i dalszych.

H. lineolatus Mannh. (*transversus* Thoms., *wehnckeii* Gerh.). Może jeszcze więcej pospolity od poprzedniego. Z okolic Lwowa mam do 50 okazów ze Snopkowa, Pohulanki, Biłohorszcza, Hołoska W., Majerówki, Dublan, Zielowa, Szklä.

H. immaculatus Gerh. Również dosyć pospolity.

H. obliquus F. (*amoenus* Ol.) Niezbyt częsty. Prócz Zofjówki poławiałem go w pojedynczych okazach na Pohulance, Kleparowie (staw Barana), w Winnikach i Szkle (Siwa Woda, Kurnicki potok); w wyjątkowo wielkiej ilości natomiast (przeszło 100 egz.) 11 i 12 sierpnia 1921 r. w Dublanach w stawku na wschód od Szkoły

Rolniczej, silnie glonami i inn. wodorostami zarosłym. Tu znalazł się równocześnie:

H. confinis Steph. (*lineatus* Aubé) w jednej parze.

H. lineatocollis Marsh. Koło Lwowa pospolicie; w niektórych wodach poławiałem go masowo.

PELTODYTES Rég. (*Cnemidotus* Er.)

P. caesus Duft. (*impressus* Panz.). Poławiałem go w nielicznych okazach na Kleparowie w stawku Barana.

SPRAWOZDANIA Z ZEBRAŃ MIESIĘCZNYCH S. E. 1922 R.

[COMPTES-RENDUS DES SÉANCES MENSUELLES
DE LA SECTION ENTOMOLOGIQUE DU 1922].

Sprawozdania za r. 1921 ukazały się częściowo (5 spr.) w piśmie „Kosmos“ (Rocznik XLVI, Zesz. 1) i w odbitkach zostały rozesełane wszystkim entomologom w kraju, których adresy były nam znane. Pozostałe sprawozdania z zebrań r. 1921 w ilości 5, ukażą się również w „Kosmosie“, w ostatnim zeszytzie tegoż roku, który niebawem wyjdzie z druku. Odbitki ich będą rozesełane członkom S. E.

I. 2 stycznia.

Sprawozdanie z części administracyjnej włączono do sprawozdania Oddziału lwowskiego P. T. P. im. Kopernika.

Naukowe referaty wygłosili:

Prof. Łomnicki: O myrmekofilach, z demonstracjami.

P. Noskiewicz: O nowym dla fauny Karpat gatunku miesierki (*Megachile lapponica* C. G. Thoms). W czasie kilkudniowej wycieczki na Czarną Horę z początkiem sierpnia 1921 r., schwycił prelegent w dolinie Prutu, powyżej Worochty, 1 okaz ♀ *Megachile lapponica* C. G. Thoms. na *Lotus corniculatus*. Gatunek ten znany był przez długi czas jedynie z Europy płn. (Finlandja, Norwegja) i Alp i dopiero w ostatnim dziesiątku lat, wykazano go także