

140. Chrząszcze (*Coleoptera*) nowe dla Wyżyny LubelskiejBeetles (*Coleoptera*) new to Wyżyna Lubelska (the Lubelska Upland)

Wyżyna Lubelska należy do słabiej poznanych krain pod względem chrząszczy. Tylko nieliczne grupy, zwłaszcza *Curculionoidea*, doczekały się dokładniejszych opracowań. W ramach badań prowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Entomologów Uniwersytetu Wrocławskiego w okolicach Hrubieszowa, odłowiono szereg gatunków nie podawanych do tej pory z Wyżyny Lubelskiej. Ich lista podana jest poniżej. Wszystkie pochodzą z jednego stanowiska:

– Gródek k. Hrubieszowa, 2–6 VIII 1995, leg. L. BOROWIEC, P. CHMIELARZ, A. DĄBROWSKA i J. ŚWIĘTOJAŃSKA.

*Hydrophilidae*: *Anacaena limbata* (F.); *Staphylinidae*: *Philonthus spinipes* SHARP; *Phyllodrepa salicis* (GYLL.); *Cyphonidae*: *Cyphon coarctatus* PAYK.; *Cyphon ochraceus* STEPH.; *Prionocyphon serricornis* (MÜLL.); *Latridiidae*: *Cartodere constricta* (GYLL.); *Corticaria elongata* (GYLL.); *Melanophthalma curticolis* MANN.; *Melanophthalma distinguenda* (COM.); *Phalacridae*: *Stilbus pannonicus* FRANZ; *Sphindidae*: *Sphindus dubius* (GYLL.); *Cryptophagidae*: *Atomaria lewisi* REITT.; *Atomaria pusilla* PAYK.; *Ephistemus globulus* (PAYK.); *Ephistemus reitteri* CASEY; *Alleculidae*: *Hymenalia rufipes* (F.); *Chrysomelidae*: *Asiorestia motschulskii* KONST.; *Longitarsus pulmonariae* WEISE; *Longitarsus tabidus* (F.).

LECH BOROWIEC, Wrocław

141. Nowe stanowisko *Holoparamesus caularum* AUBÉ, 1843 (*Coleoptera*, *Merophysiidae*) w PolsceA new record of *Holoparamesus caularum* AUBÉ, 1843 (*Coleoptera*, *Merophysiidae*) in Poland

Rodzina *Merophysiidae* (dawniej zaliczana do *Latridiidae* na szczeblu podrodziny) skupia 110 gatunków małych chrząszczy należących do 15 rodzajów. Centrum rozszedlenia tej rodziny stanowi Podobszar Śródziemnomorski, skąd szereg gatunków bywa rozwlekanych prawie po całym świecie. Z Europy Środkowej notowano dotąd tylko przedstawicieli rodzaju *Holoparamesus* CURTIS, liczącego 5 gatunków. Jeden z nich – *Holoparamesus caularum* AUBÉ – wykazany był także z terenu Polski, z dwóch stanowisk na Śląsku. Poniżej podaję nowe stanowisko tego gatunku:

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koło, UTM CC38, 27 VI 1994, 1 ex. przyleciał do światła przez otwarte okno.

*Holoparamesus caularum* AUBÉ jest gatunkiem kosmopolitycznym, zdomowionym w wielu krajach poza centrum rozszedlenia. Na podstawie opisanego powyżej stanowiska trudno jest ustalić, czy gatunek ten stanowi stały element naszej fauny, czy też mamy to do czynienia z przypadkiem zawleczenia go do naszego kraju. Za tym ostatnim przemawiać może fakt nie znalezienia innych okazów mimo systematycznego przetrząsania środowisk charakterystycznych dla tego gatunku w najbliższej okolicy znaleziska.

Okaz dowodowy został złowiony przez autora i znajduje się w jego zbiorze.

TOMASZ MAJEWSKI, Koło