

186. Stanowisko *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 (*Coleoptera: Dytiscidae*) w Wielkopolskim Parku Narodowym

A new locality of *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 (*Coleoptera: Dytiscidae*) in the Wielkopolski National Park

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Dytiscidae*, *Dytiscus*, *latissimus*, record, Wielkopolski National Park, W Poland.

Dytiscus latissimus L. znany jest z zachodniej i środkowej części Europy oraz z zachodniej Syberii. W Polsce występował na całym jej obszarze, z wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju i gór. Większość doniesień pochodzi jednak sprzed kilkudziesięciu lat (BURAKOWSKI i in., 1976: Katalog fauny Polski, Warszawa, XXIII, 12: 1-307.). W ostatnich latach w wyraźny sposób ograniczył liczebność i jest nadzwyczaj rzadko obserwowany.

Podczas obserwacji prowadzonych w Wielkopolskim Parku Narodowym, stwierdziłem występowanie tego interesującego gatunku pływaka:

– Jezioro Budzyńskie (UTM: XT29), 28 VIII 1996, 1♂, wyłowiony siatką planktonową z kępy *Myriophyllum verticillatum* (L.), leg. et coll. S. CERBIN.

Sławomir CERBIN, Poznań

187. *Attelabidae*, *Apionidae* i *Curculionidae* (*Coleoptera*) nowe dla Kotliny Sandomierskiej

Attelabidae, *Apionidae* and *Curculionidae* (*Coleoptera*) new to the fauna of Kotlina Sandomierska region (SE Poland)

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Attelabidae*, *Apionidae*, *Curculionidae*, new records, SE Poland.

Opierając się na „Katalogu Fauny Polski” (BURAKOWSKI i in., 1992, 1993, 1995, 1997) można stwierdzić, że Kotlina Sandomierska należy do stosunkowo słabo poznanych faunistycznie rejonów Polski. Rekonesansowe badania prowadzone w najbliższych okolicach miejscowości: Jarosław (J), Radawa (R), Sieniawa (S) i Wola Mołodycka (WM) w latach 1990, 1993 i 1994, przyniosły szereg interesujących odkryć o których piszemy w innym miejscu. W niniejszej notatce podajemy jedynie gatunki nie wykazane do tej pory z Kotliny Sandomierskiej, chociaż znane z szeregu innych krain Polski:

ATTELABIDAE: *Coenohrinus pauxillus* (GERM.) – J (FA14), R (FA25).

APIONIDAE: *Omphalapion dispar* (GERM.) – J (FA14), WM (FA35); *Protapion assimile* (KIRBY) – J (FA14); *P. filirostre* (KIRBY) – J (FA14); *Pseudoperapion brevirostre* (HERBST) – R (FA25); *Apion cruentatum* WALT. – J (FA14); *Stenopterapion tenue* (KIRBY) – J (FA14), WM (FA35); *Holotrichapion aethiops* (HERBST) – J (FA14), R (FA25); *H. ononis* (KIRBY) – J (FA14); *Cyanapion columbinum* (GERM.) – J (FA14), S (FA16); *C. gyllenhali* (KIRBY) – S (FA16); *C. platalea* (GERM.) – J (FA14); *Oxystoma dimidiatum* (DESBR.) – S (FA16); *O. subulatum* (KIRBY) – J (FA14), S (FA16); *Eutrichapion ervi* (KIRBY) – J (FA14); *E. punctigerum* (PAYK.) – J (FA14), WM (FA35).

CURCULIONIDAE: *Omiamima mollina* (BOH.) – J (FA14); *Phyllobius virideaeris* (LAICH.) – R (FA25); *Polydrusus fulvicornis* (FABR.) – R (FA25); *P. inustus* (GERM.) – J (FA14); *Eusomus ovulum* (GYLL.) – J (FA14); *Sitona macularius* (MRSH.) – J (FA14); *S. ononidis* SHARP – J (FA14); *S. humeralis* STEPH. – J (FA14), WM (FA35); *Tropiphorus elevatus* (HERBST) – J (FA14); *Hypera contaminata* (HERBST) – J (FA14); *Limnobius borealis* (PAYK.) – J (FA14); *Leiosoma cribrum* (GYLL.) – S (FA16); *Dorytomus hirtipennis* BED. – J (FA14); *Anthonomus pedicularius* (L.) – J (FA14); *Curculio crux* (FABR.) – J (FA14); *Tychius aureolus* KIESEW. – J (FA14); *T. meliloti* STEPH. – J (FA14); *Sibinia pyrrhodactyla* (MRSH.) – R (FA25), S (FA16); *Ceutorhynchus hampei* BRIS. – R (FA25); *C. ignitus* GERM. – J (FA14); *Datonychus angulosus* (BOH.) – R (FA25); *Microplontus figuratus* (GYLL.) – J (FA14).

Bogusław PETRYSZAK, Kraków
Paweł DĄBEK, Nowy Targ

188. Bogatkowate (*Coleoptera*: *Buprestidae*) nowe dla Gór Świętokrzyskich *Buprestidae* (*Coleoptera*) new to the Świętokrzyskie Mts.

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Buprestidae*, new records, Świętokrzyskie Mts., S Poland.

Wymienione poniżej gatunki nie były dotychczas podawane z Gór Świętokrzyskich. Całość materiału dowodowego znajduje się w moim zbiorze.

Dicerea berolinensis (HERBST, 1779)

– Pasma Zgórskie ad Kielce, 23–25 VII 1988, 4 exx., wyhodowane z gałęzi buka.

Phaenops formaneki JACOBSON, 1913

– Mójcza ad Kielce, 10 V 1989, 6 exx., wyhodowane z cienkiej sosny.

Agrilus derasofasciatus LACORDAIRE in BOISDUVAL et LACORDAIRE, 1835

– Kielce, Domaszowice ad Kielce, od 20 VI do 16 VII 1992, liczne egzemplarze na winorośli.

Agrilus integerrimus (RATZEBURG, 1837)

– Mójcza ad Kielce, 22 VI 1993, 2 exx. na wawrzynku wilczelyko (*Daphne mezereum* L.).

Habroloma nana (PAYKULL, 1799)

– Kielce - Białogon, różne daty zebrania wiosną w latach 1988 - 1996, liczne egzemplarze na bodziszku czerwonym (*Geranium sanguineum* L.)

Trachys troglodytes GYLLENHAL in SCHÖNHERR, 1817

– Kielce - Zagórze, V, VI, różne daty zebrania od 1993 do 1996, liczne egzemplarze na świerzbniicy polnej (*Knautia arvensis* (L.)).

Dziękuję Panu Romanowi KRÓLIKOWI za sprawdzenie oznaczeń.

Marek BIDAS, Kielce