

21. Nowe stanowiska polskich *Xantholininae* (Coleoptera, Staphylinidae)New records of Polish *Xantholininae* (Coleoptera, Staphylinidae)

Poniżej podaję nowe stanowiska dla 7 gatunków z podrodziny *Xantholininae*. Wszystkie okazy, poza jednym, były łowione przeze mnie.

*Leptacinus intermedius* DONISTHORPE, 1936

– Dolny Śląsk, Wrocław-Wojnów, VI 1990, 3 exx.

Dotychczas podany tylko z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i ogólnikowo z Mazur. Nowy dla Dolnego Śląska.

*Leptacinus sulcifrons* (STEPHENS, 1833)

– Roztocze, Obroc, 10 VI 1988, 1 ex., Kąty II k. Zamościa, 20 VI 1990, 2 exx.

Notowany tylko z 4 krain. Nowy dla Rostocza.

*Gyrophypnus fracticornis* (MÜLLER, 1776)

– Dolny Śląsk, Wrocław-Wojnów, VI 1990, 1 ex.

Znany z 5 krain. Nowy dla Dolnego Śląska.

*Xantholinus clairei* COIFFAIT, 1956

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Ruda Milicka, 25 VII-8 VIII 1989, 1 ex., 10-15 VII 1990, 1 ex. leg. J. KANIA.

Notowany z 7 krain. Nowy dla Wielkopolski.

*Xantholinus longiventris* HEER, 1839

– Wyżyna Małopolska, Pińczów, 10-15 V 1991, 1 ex., Chotel Czerwony, 14 V 1991, 1 ex.

Dość pospolity gatunek, znany z 11 krain, ale z Wyżyny Małopolskiej nie notowany.

*Xantholinus roubali* COIFFAIT, 1956

– Dolny Śląsk, Wrocław-Książę Małe, 7 III 1974, 1 ex.

Rzadki gatunek, z Polski podany tylko ogólnikowo z woj. lubelskiego.

*Othius angustus* STEPHENS, 1833

– Dolny Śląsk, Wrocław-Mokry Dwór, 19 VI 1988, 1 ex.

Dość pospolity gatunek, znany z 12 krain. Nowy dla Dolnego Śląska.

LECH BOROWIEC, Wrocław