

*E. tetratrichus* Nal. Brzeg liścia *Tilia cordata* wąsko zawięty: Pawonków (słabo rozwinięte).

*E. thomasi* Nal. Liście wierzchołkowe *Thymus serpyllum* zwłosione i w główkę skupione: Czarny Las, Miotki; małe kolonje.

*E. tiliae liosoma* Nal. Liście *Tilia cordata* z plamkami włosków: Cm. w Olszynie; pospolicie.

*E. tiliae rudis* Nal. Powierzchnia liści *Tilia cordata* z różkowatemi wypuklinami: Park Grunwaldzki; rzadko.

*E. ulmicola brevipunctatus* Nal. Powierzchnia liścia *Ulmus effusa* pokryta główkowatymi wypuklinkami: Lisów; pospolicie.

*E. ulmicola typicus* Nal. Chrostkowate wypuklinki *Ulmus campestris*, po obu stronach liścia widoczne: Park Grunwaldzki; rzadko.

*E. spec.* Brzeg liścia *Salix purpurea* wąsko i nierówno zawięty: Kalety, Herby Śląskie; nierzadko.

#### Zusammenfassung.

In den Sommerferien 1930 hat Verfasser den Kreis Lubliniec bereist und daselbst Zirpen, Blattflöhe, Schildläuse und Zoocecidien gesammelt. Die ungünstige Witterung hat leider das Sammelergebnis sehr beeinträchtigt. Es wurden an Arten festgestellt: 77 Zirpen, 16 Blattflöhe, 20 Schildläuse und 160 Cecidiozoen.

### Notatki o Cerambycidach Polski. I.

Notizen über polnische Cerambycidae. I.

podał

MIECZYŚLAW SULMA.

W latach 1927—1930 zebrałem poważny materiał z rodziny Cerambycidae, który jednak dopiero w ostatnich miesiącach, po skomunikowaniu się z Dr. Heyrovským z Pragi Czeskiej i zebraniu odpowiedniej literatury, mogłem szczegółowo opracować. Uważając wszelkie przyczynki do znajomości i rozmieszczenia polskich Kózek za bardzo pożądane, podaję niżej daty o rzadszych gatunkach fauny krajowej.

Za ceną pomoc przy zestawieniu tej notatki składam serdeczne słowa podziękowań Dr. Heyrovskému z Pragi Czeskiej.

*Stenochorus meridianus* ab. *cantharinus* Hbst. Z formą typową na świdwie w Przegorzałach obok Krakowa (maj 1927); ab. *ruficrus* Scop. razem z poprzednią odmianą (det. Heyrovský); Kołomyja (Kinel), ok. Przemyśla (Trella).

*Leptura sexguttata* ab. *exclamationis* F. Występuje wszędzie z formą typową. Mam okazy: z ok. Gorlic, Gór Świętokrzyskich, Krakowa, Pomorza (Bory Tucholskie). Dotychczas znane miejsca znalezienia: ok. Lwowa (Łomnicki), Kołomyja (Kinel), ok. Częstochowy (Lgocki), ok. Przemyśla (Trella).

*Leptura fulva* Deg. M. Łomnicki (Wykaz chrząszczów ziem polskich) notuje ją bez podania miejsca występowania; Hildt (Krajowe owady Kózkowate) podaje Górny Śląsk, Podole. Kilka okazów złowiłem w dol. Rostoki ok. Rytra na *Spiraea* w lipcu 1929. Mam również jeden okaz z ok. Nowogródka (Czombrow, leg. K. Karpowicz).

*Leptura dubia* ab. *chamomillae* F. Ok. Przemyśla (Trella), Krynica, Pieniny (Tenenbaum). W pokażnej ilości zbierałem tę odmianę w dolinie Czerczy koło Piwnicznej, w Wysowie koło Gorlic, w Rytrze, na Umbelliferach; ab. *limbata* Laich. ok. Przemyśla (Trella). Wilno (Ciszkiewicz). Razem z poprzednią odmianą w tych samych miejscowościach. Jest rzadszą od ab. *chamomillae* F.

*Leptura sexmaculata* L. Z pośród zebranych dotychczas przeze mnie 32 okazów, 6 różni się od formy typowej tem, że druga przepaska jest na szwie całkowicie przzerwana; pierwsza przepaska i trzecia całkowita. Pieniny 8 VII 1928.

*Leptura erratica* ab. *erythrura* Küst. Jeden okaz tej odmiany (ostatnia czarna przepaska zastąpiona brązową przepaską) mam z Zaleszczyk.

*Leptura nigripes* Deg. Łomnicki (Wykaz chrząszczów) tego gatunku nie uwzględnia; Kinel (Kózki Polski) podaje z Litwy na podstawie okazów Muzeum im. Dzieduszyckich, tak etykietowanych; Hildt (Krajowe owady Kózkowate) podaje: Wilno, Kowel. Jeden okaz znalazłem przypadkowo w Mołczadzi, ok. Słonima, sierpień 1927.

*Srangalia septempunctata* Fbr. Gatunek ten należy u nas do rzadkości; Hildt notuje go z Zakopanego, Kinel z Krakowa (Ulanowski). 3 okazy złowiłem w Piwnicznej (dol. Czerczy 10 VII 1928) na kwinającym bzie *Sambucus niger*; ab. *incon-*

*stans* Reitt. (Fauna germanica, Bd. IV). Odmianę tę zupełnie pozbawioną plamek, o rdzawych nogach i rożkach złowilem w Wy-sowie, pow. Gorlice, lipiec 1929.

Przeważną część wymienionych gatunków złożyłem w Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie.

### Résumé.

Es werden neue Fundorte einiger, interessanter Cerambyciden-Arten in Polen angegeben und Exemplare von *Leptura sexmaculata* L. erwähnt, bei denen die zweite Querbinde der Flügeldecken an der Naht völlig unterbrochen ist; somit wird die Variationsbreite der Flügeldeckenfärbung bei dieser Art um noch eine Abweichung vergrößert.

## Sprawozdania z zebrań P. Z. E. 1931 r.

[Comptes rendus des séances de la Soc. Pol. des Ent. du 1931].

### III. 13 kwietnia.

Kinel i Noskiewicz — Pokaz materiału do artykułu o palearktycznych gatunkach rodzaju *Epicypta* Winn. (ref. Dr. Noskiewicz);

Dr. Eichler — Chrząszcze okolic Brześcia nad Bugiem (ref. Kinel);

Szulczewski — Notatki entomologiczne i zoocecidiologiczne z powiatu lublinieckiego na Górnym Śląsku (ref. Kinel).

### IV. 4 maja.

Przewodniczący, Dr. Świątkiewicz, poświęca słowa wspomnienia ś. p. Prof. Jarosławowi Łomnickiemu, nieodżałowanemu wiceprezesowi P. Z. E. od początku jego istnienia, i zdaje sprawę z udziału Związku w obrzędzie pogrzebowym oraz zapowiada szczegółowe omówienie działalności Zmarłego w jednym z najbliższych zeszytów P. P. E.; całego przemówienia wysłuchali obecni, stojąc.

Nastąpiły referaty i pokazy.

Dr. Świątkiewicz — Pokaz motyli z ostatniego sezonu;

Hr. Toll — Nowe odmiany motyli własnego zbioru (ref. Dr. Świątkiewicz);

Judenko — Materiały do fauny mszyc okolicy Puław z uwzględnieniem biologii. 2 cz. (ref. Dr. Noskiewicz);

Sulma — Notatki o Cerambycidach Polski. I. (ref. Kinel).