

221. *Cis vestitus* MELLIÉ, 1849 (*Coleoptera: Ciidae*), nowy dla fauny Polski*Cis vestitus* MELLIÉ, 1849 (*Coleoptera: Ciidae*), new to the Polish faunaKEY WORDS: *Coleoptera*, *Ciidae*, *Cis vestitus*, new record, S Poland.

*Cis vestitus* MELLIÉ to bardzo rzadki gatunek, notowany głównie z Europy południowej i południowych części Europy środkowej, zwykle nie odróżniany od *C. festivus* (PANZ.). Z Polski nie był do tej pory notowany w sposób pewny, a ogólne dane HORIONA (1961) opierały się na nieudokumentowanych doniesieniach z szeroko pojętego Śląska. Omawiany gatunek różni się od *C. festivus* przede wszystkim mocną mikrorzeźbą przedplecza powodującą, że jego powierzchnia jest wyraźnie bardziej matowa od powierzchni pokryw (u *C. festivus* mikrorzeźba jest zatarta, a przedplecze i pokrywy lekko błyszczące) i bardzo krótkimi, trudno zauważalnymi szczecinkami na przednim brzegu przedplecza (u *C. festivus* te szczecinki są wyraźne). W pełni wybarwione okazy *C. vestitus* są ciemnobrunatne, natomiast *C. festivus* czerwobrunatne.

*C. vestitus* odkryty został jak dotąd na jednym stanowisku:

– Beskid Wschodni: Zyndranowa ad Dukla (EV57), 26 VII 1998, 2 exx., leg. L. BOROWIEC.

Wymagania biologiczne *C. vestitus* są mało znane, w Zyndranowej był łowiony na pryzmie drewna bukowego i brzoźowego.

Lech BOROWIEC, Wrocław

222. Stonkowate (*Coleoptera: Chrysomelidae*) nowe dla Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej*Chrysomelidae* (*Coleoptera*) new to the Lublin Upland and Sandomierz LowlandKEY WORDS: *Coleoptera*, *Chrysomelidae*, records, SE Poland.

Doniesienie to jest uzupełnieniem stanu poznania *Chrysomelidae* południowo-wschodniej Polski. Część wymienionych gatunków jest szeroko rozsielona w kraju, jednak dotychczas nie zostały one podane z Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej. Związane jest to z wyjątkowo słabym poznaniem rozsielenia stonkowatych tych regionów.

*Donacia cinerea* HERBST, 1784

– Nizina Sandomierska: Dębowiec (EB81), 29 IV 1998, 1 ex., leg. P. BUCZYŃSKI.

Gatunek występujący na obszarze całej Polski. Zebrany został na torfowisku przejściowym w zbiorowisku szuwarowym, na pałce szerokolistnej – *Typha latifolia* L.

*Donacia vulgaris* ZSCHACH, 1788

– Nizina Sandomierska: Dębowiec (EB81), 29 IV 1998, 1 ex., leg. P. BUCZYŃSKI.

Zebrany na torfowisku przejściowym w zbiorowisku szuwarowym na pałce szerokolistnej – *Typha latifolia* L. Z Polski podany z wielu krain, jednak spotykany jest nieczęsto i w małej liczbie okazów.

*Coptocephala rubicunda* (LAICHARTING, 1781)

– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05)

W Polsce notowany ze stanowisk położonych w południowej części kraju. Na stanowisku, na którym go zbierano występował licznie w ostatniej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia, na kwiatach roślin z rodziny baldaszkowatych – *Apiaceae*.

*Pachybrachis tessellatus* (OLIVIER, 1791)

– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 25 VII 1997, 1♂

Chrzyszcz ten jest związany ze środowiskami kserotermicznymi, gdzie żeruje na młodych dębach. W Polsce znany z południowej części kraju, gdzie wielokrotnie był stwierdzany w znacznych odstępach czasu i zazwyczaj pojedynczo.

*Lochmaea crataegi* (FORSTER, 1771)

– Wyżyna Lubelska: Łysaków (EB82)

W kwietniu gatunek ten licznie poławiano na kwiatach i liściach głógów porastających wapienne zbocza w Łysakowie. Występuje prawdopodobnie w całej Polsce, choć nie jest jeszcze wykazany z niektórych krain.

*Longitarsus kutscherae* (RYE, 1872)

– Wyżyna Lubelska: Łysaków (EB82); Bychawa (FB05)

Pojedynczo poławiany wiosną i latem w zbiorowiskach trawiastych sąsiadujących z terenami muraw kserotermicznych. Gatunek występujący prawdopodobnie w całej Polsce, jednak nie ze wszystkich krain podany.

*Altica brevicollis* FOU DRAS, 1861

– Nizina Sandomierska: Łązek Ordynacki (EB90), 23 IV 1998, 1♂

Gatunek podawany z wielu stanowisk na terenie całego kraju. Otrząśnięty został do parasola entomologicznego z krzewów leszczyny sąsiadujących z wilgotną łąką.

*Crepidodera nitidula* (LINNAEUS, 1758)

– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 30 IV 1998, 1♂, 1♀

Gatunek ten występuje w całej Polsce, jednak nie jest zbyt często poławiany. Okazy otrząśnięte zostały z młodych osik – *Populus tremula* L. Zadrzewienia sąsiadowały z płatem roślinności kserotermicznej.

*Cassida rufovirens* SUFFRIAN, 1844

– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 14 VIII 1997, 1 ex.

Gatunek poławiany w Polsce rzadko, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Złowiony został do czerpaka, na szczycie wapiennego zbocza z roślinnością kserotermiczną.

Serdecznie dziękuję Panu Prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za sprawdzenie oznaczeń.

Radosław ŚCIBIOR, Lublin