

Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla
(Verzeichnis der Käfer der Umgebung von Przemyśl)

ELATERIDAE — SPREŻYKI
EUCNEMIDAE — GOLEŃCZYKI
CERAMBYCIDAE — KÓZKI

podał
T. TRELLA.

ELATERIDAE.

Adelocera: *lepidoptera* Gyll. (Brylińce, Turnica — wyłącznie w jodłach).

Brachylacon: *murinus* L.

Corymbites: *virens* Schrnk (tylko na pld. od Sanu); *pectinicornis* L.; + *cupreus* Fbr. a. *aeruginosus* Fbr. (Turnica, — Chwaniów) w wyk. Carp.; *purpureus* Poda; ♀ p. a. *flavus* Gredl.; *castaneus* L.; *tesselatus* L.; t. a. *assimilis* Gyll.; + t. a. *strigatus* Gerh. w wyk. Sil.

Selatosomus: *aeneus* L.; ae. a. *germanus* L.; + ae. a. *cyanus* Mrsh. w Przyb. Warszawa; *latus* Fbr.; l. a. *saginatus* Ulén; *cruciatus* L. (Byków); *bipustulatus* L.; b. a. *semiflavus* Fleisch.; *affinis* Payk. (Chwaniów); + *depressus* Grm. (podany poprzednio, w Przyb. Małopolska, Wołyń).

Prosternon: *holosericeus* Ol.

Sericus: *brunneus* L.

Dolopius: *marginatus* L.; m. a. *fulvus* Mrsh.

Agriotes: *aterrimus* L. (Lacka Wola); at. a. *wolhyniensis* Fisch. (z poprzednim); *ustulatus* Schall.; u. a. *flavicornis* Pnz.; ♀ u. a. *inustus* Buyss.; + u. a. *sputator* Redt. (1 ok.), w wyk. Sil. Bor.; *pilosus* Pnz.; ♀ p. a. *simulator* Buyss.; *acuminatus* Steph.; *sputator* L.; s. a. *negatus* Buyss.; s. a. *rufulus* Lac.; *lineatus* L.; *obscurus* L.; + o. a. *badius* Müll. w Przyb. Warszawa.

Ludius: *ferrugineus* L. a. *occitanicus* Vill. (Żurawica).

Synaptus: *filiformis* Fbr.; ♀ f. a. *erivanus* Falda.

Adrastus: *limbatus* Fbr.; l. a. *axillaris* Er.; l. a. *nigrinus* Schilsk.; *nitidulus* Mrsh.; n. a. *pallens* Er.; *rachifer* Geofr.; *montanus* Scop.

Hypnoidus: maritimus Curt.; *pulchellus* Er.; *dermestoides* Hrbst.; *d. a. tetraphagus* Grm. (najczęstszy); + *d. a. bipustulatus* Schilsk. w wyk. Sil.; *meridionalis* Lap.

Cardiophorus: ruficollis L. (Turnica, jodła); *rufipes* Geoffr. (= *Erichsoni* Buyss.); *asellus* Er.; *cinereus* Hrbst.

Melanotus: rufipes Hrbst.; # *r. a. bicolor* Fbr.; *punctolineatus* Peler.

Procræterus: tibialis Lac. (Brylińce, Turnica).

Elater: cinnabarinus Esch.; *sanguineus* L.; s. a. *rubidus*¹⁾. *Cand.*; *praeustus* Fbr.; *pomonae* Steph.; *sanguinolentus* Schrnk.; *ferrugatus*, Lac.; + *f. a. ferrugatulus* Reitt., Fejfer: Florjanka; # *f. a. adumbratus* Buyss. (= *apicalis* Schilsk.); *balteatus* L.; *nigroflavus* Goeze; *elegantulus* Schönh. (dęby, jodły, wierzby); *erythrogonus* Müll.; # *e. a. concolor* Stierl.; + *tristis* L. (Brylińce, Turnica) w wyk. Carp.; *nigrinus* Payk.; + *nigerimus* Lac. (pol. pniaki dębowe), w wyk. Sil., w Przyb. Małopolska zach., Zamość; *aethiops* Lac. (Turnica); + *Megerlei* Lac. (Hurko 3 ok. w topoli czarnej) w wyk. Sil.

Limonius: pilosus Lesk.; *aeruginosus* Ol.; *minutus* L.; *parvulus* Pnz.

Pheletes: quercus Ol.; # *q. a. nigricollis* Schilsk.; # *q. a. lythrodès* Grm.

Harminius: undulatus Deg. (Turnica VI, 1 okaz)

Athous: rufus Deg. (rewir Łętownia, 1 okaz); *hirtus* Hrbst; *niger* L.; # *n. a. laesus* Grm.; *n. a. scrutator* Hrbst.; *vittatus* Fbr., v. a. *inopinatus* Buyss.; + v. a. *Stephensi* Buyss., w Przyb. Wilno.; v. a. *dimidiatus* Drap.; *haemorrhoidalis* Fbr.; + h. a. *ruficaudis* Gyll., Fejfer: Klemensów.; *subfuscus* Müll.; *mollis*²⁾ Reitt.

Denticollis: rubens Pill. (na płd. od Sanu); *linearis* L.; l. ♂ a. *subcantharoides* Ol.; l. ♀ a. *mesomelas* L.; + l. a. *variabilis* Deg.; + l. a. *suturalis* Duf. (dwie ostatnie podał dr. Mazur z Howerli).

¹⁾ Wobec niezgodności autorów, co do znamion tej aberacji podaje, że mój okaz posiada żłobek na środku przedplecza (Mittelfurche) sięgający do samego przodu tegoż, pokrywy prawie brunatno-czerwone, wielkość 15 mm.

²⁾ Niezdecydowane znamiona odróżniające *Ath. carpathicus* Reitt. od *Ath. mollis* Reitt., do tego zgodność ubarwienia, pozwalają wątpić w samodzielność tego pierwszego.

EUCNEMIDAE.

Melasis: buprestoides L.; ♫ b. a. *semicastaneus* Reitt.

Isorhipis + melasoides Lap.; ♫ m. a. *bicolor* Reitt. (Brylińce 1 okaz na buku VI.). W wyk. Sil. Bor.

Eucnemis: capucina Ahr.

Dirrhagus: pygmaeus Fbr.; *clypeatus* Hmpe.

Xylobius: corticalis Payk. (Brylińce, Turnica, jodły); *seidlitzi* Csiki (olcha czarna, wierzby); ♫ s. a. *slavipennis* Reitt.;

Trixagus: brevicollis Bouv.; *dermestoides* L.; *obtusus* Curt.

Drapetes: biguttatus Pill.; ♫ b. a. *mordelloides* Hort.

CERAMBYCIDAE.

Spondylis: buprestoides L.

Prionus: coriarius L.

Ergates: faber L. (1 ♂ Dąbrówka ad Dynów).

Rhagium: sycophanta Schrk.; *mordax* Deg.; *inquisitor* L.

Rhamnusium: bicolor Schrnk.; + b. a. *glaucopterum* Schall. (Zamek), w wyk. Pos.

Oxymirus: cursor L.; + o. a. *Verneuli* Muls. (1 ♀ Brylińce), w wyk. Sil.

Stenochorus: meridianus L. (= ♂ *cantharinus* Hrbst = ♀ *chrysogaster* Schrnk.); ♫ m. a. *ruficrus* Scop. (Przedmieścia).

Pachyta + 4-maculata L. (Turnica Braniów), w wyk. Carp., w Przyb.¹⁾ Ojców, Zamość, Białowieża.

Evodinus + clathratus Fb. (Turnica IV, V), w wyk. Carp.; + c. a. *signatus* Pnz. (= *nigrosignatus* Reitt) (z poprzednia) w wyk. Sil.; ♫ c. a. *Flecki* Reitt. (z poprz.) i + c. a. *pedemonjanus* Dan. (z poprz.) Mazur: Tatry.

Acmaeops + septentrionis Thoms. (1 ok. Chwaniów) w wyk. Tatry; *collaris* L.

Gauroles + virginea L. (Braniów), w wyk. Carp.; + v. a. *violacea* Deg. (1 ok. z poprz.), Mazur: Tatry.

Cortodera: femorata Fbr.; *humeralis* Schall.

Pidonia + lurida Fbr. posp., w wyk. Carp.; + l. a. *Ganglbaueri* Orm. z poprz., w wyk. Carp.

¹⁾ Przyb.: S. Tenenbaum: Przybytki do fauny chrząszczów Polski Lwów 1923.

Leptura: rufipes Schall.; *6-guttata* Fbr.; # *6-g. a. biguttata* Muls.; *6-g. a. exclamacionis* Fbr.; # *6-g. a. atrata* Schilsk.; *livida* Fbr.; *maculicornis* Deg.; *rubra* L. (= ♀ *maculiceps* Gabr.); + *scutellata* Fbr. (Turnica), w wyk. Carp.; + *virens* L. (Braniów, Chwaniów), w wyk. Carp., w Przyb. Białowieża; *sanguinolenta* L.; *dubia* Scop. (Brylińce, Turnica); # *d. a. limbata* Laich. (z poprz.); *d. a. chamomillae* Fbr. (z poprz.), w wyk. Sil., w Przyb. Krynica; # *d. a. Starki* Schilsk. (z poprz.); *cerambyciformis* Schrnk.; *c. a. 10-punctata* Ol.; + *c. a. 6-punctata* Muls. (= *bescidica* Reitt.) (z poprz.), Mazur: Łapanów; + *c. a. 4-maculata* Scop. (z poprz.), Mazur: Wojniłów; *erratica* Dalm. (winna Góra); + *6-maculata* L. (Braniów), w wyk. Carp.; *revestita* L. (Prałkowce); *4-fasciata* L.; *4-f. a. interrupta* Heyd.; *maculata* Poda; # *m. a. binotata* Muls. (z poprz.); *arcuata* Pnz.; *aethiops* Pnz.; *melanura* L.; *bifasciata* Müll.; *nigra* L.; *attenuata* L.

Alosterna: tabacicolor Deg.,

Grammoptera: ruficornis Fbr.

Necydalis: major L. (Prałkowce).

Caenoptera: minor L.; *umbellatarum* Schreb.

Stenopterus + *rufus* L. (w 1916 dość licznie na Zamku), w wyk. Sil.

Obrium: cantharinum L.; *brunneum* Fbr.

Gracilia + *minuta* Fbr. (1 ok. Zasanie), w wyk. Sil. Pos. Bor., w Przyb. Warszawa.

Cerambyx cerdo L. (Łetownia, na przydrożnych dębach przed wojną); *scopolii* Fuessl.

Criocephalus: rusticus L.; *polonicus* Mocz. (1 ok. Gruszów).

Asemum: striatum L.; s. a. *agreste* Fbr.

Tetropium: fuscum Fbr. (Tartak na Wybrzeżu)

Tetropium: castaneum L.; c. a. *luridum* L.; c. a. *aulicum* Fbr.; c. a. *fulcratum* Fbr.

Phymatodes: testaceus L. a. *variabilis* Fbr. t. a. *rufipes* Costa; + t. a. *fennicus* Fbr. (z poprz.) w wyk. Sil.; + t. a. *praeustus* Küst. (z poprz.), w wyk. Sil.; *alni* L.

Pyrrhidium: sanguineum L.

Callidium + *aeneum* Deg. (Budy Wk., Brylińce), w wyk. Carp.; *violaceum* L.

Hylotrupes: bajulus L.

Rhopalopus: clavipes Fbr. (Prałkowce); *macropus* Grm.

Rosalia: alpina L. (Turnica 1 ok., Bakoczyce 1 ok. VI).

Aromia: moschata L.

Plagionotus: detritus L.; *arcuatus* L.

Clytus: arietis L. ♀ ar. a. *gazella* Fbr. (z poprzednim); + *lama* Muls. (Brylińce), w wyk. Carp.; ♀ l. a. *aegagra*¹⁾ nov.

Clytanthus: varius Fbr.; *Herbsti* Brahm.; *sartor* Fbr.

Anaglyptus: mysticus L.; m. a. *hieroglyphicus* Hrbst.

Dorcadiion + striatum Dalm. (pospolity w bliżej okolicy IV, V), w wyk. Pod.

Lamia: textor L.

Monochamus: sartor Gyll. (Turnica); *sutor* L. (z poprz.);

Acanthoderes: clavipes Schrnk.

Acanthocinus: aedilis L.

Liopus: nebulosus L.

Hoplosia: fennica Payk.

Exocentrus: adspersus Muls. (Nienadowa); + *Stierlini* Gnglb. (faszyny nad Sanem), w wyk. Kołomyja, w Przyb. Zamość, Warszawa.

Pogonocherus: hispidulus Pill.; *hispidus* L.; *ovatus* Goeze.

Haplocnemia: curculionoides L.; *nebulosa* Fbr.

Anaesthetis: testacea Fbr.

Agapanthia: villosoviridescens Deg.

Saperda: carcharias L.; *populnea* L.; *scalaris* L.; *perforata* Pall. (Brylińce).

Tetrops: praeusta L.

Stenostola: ferrea Schrnk.

Phytoecia: affinis Harr.; *cylindrica* L.

Oberea: oculata L.; *linearis* L.; *erythrocephala* Schrnk.

RÉSUMÉ.

Es werden Käfer von den Familien: *Elateridae*, *Eucnemidae* und *Cerambycidae* angegeben und dabei eine neue Aberration unterschieden:

Clytus lama Muls. a. *aegagra* nov. mit einfarbig rostgelben Beinen.

¹⁾ *Clytus lama* Muls. a. *aegagra* nov. posiada nogi jednostajnie rdzawe.