

Wykaz Chrząszczów okolic Przemyśla.
 Verzeichnis der Käfer der Umgebung von Przemyśl.
 Ryjkowce — *Circulionidae*.
 podał
 T. TRELLA.

Otiorrhynchus multipunctatus Fbr.; + *niger* Fbr. a. *villosopunctatus* Gyll. Chwaniów (Wyk.: Carp.); + *fuscipes* Ol. Kiczera u źródeł Wiaru (Wyk.: Carp.; Tenenbaum: Ojców); *laevigatus* Fbr.; + *morio* Fbr. a. *ebeninus* Gyll. Chwaniów (Wyk.: Carp.); + *repletus* Boh.¹⁾: Starzawa nad Wisznią (Wyk.: Carp. or.; Smreczyński: Stanisławów, Drohobycz; Tenenbaum: Warszawa, Białowieża); *raucus* Fbr.; r. a. *tristis* Fbr.; *scaber* L.; # *duinensis* Grm. v. *stenorostris* Apfelb.²⁾ Brylińce; *equestris* Richt. v. *regularis* Strl.³⁾ Turnica, Brylińce, Lacka Wola (Wyk.: Tatr. m.; Tenenbaum: Truskawiec); + *kratteri* Boh. Turnica, Braniów, Chwaniów (Wyk.: Carp.); + *obsidianus* Boh. Kiczera, Chwaniów (Wyk.: Carp. or.); + *opulentus* Grm. Turnica, Braniów (Wyk.: Carp.); *tristis* Scop.; *kotulae* Smulikowski⁴⁾: Lipowica, Łętownia,

¹⁾ Strzęsiony z początkiem czerwca z szakłaku (*Rhamnus cathartica* L.) w miejscowości podmokłej, dochodzącej zaledwie 210 m n. p. m.; występuje tu zatem w podobnych warunkach jak pod Warszawą. Należy aby się spodziewać stanowisk, nawiązujących między Podkarpaciem a Mazowszem wzduż Sanu i Wisły.

²⁾ Dwa okazy wysiane wiosną z pod zeszłych liści u stóp dębów i buków, w poziomie zwyk 350 m. Obecność tego illiryjskiego gatunku pod Przemyślem stanowi do pewnego stopnia niespodziankę, wobec tak znacznej dysjunkcji, jak i ze względu na wybitnie zaznaczającą się w tej grupie ryjkowców regionalną lokalizację. Jest to może relikt pliocencki, który zdąział przetrwać okres lodowy na przemyskim brzegu karpackim (niepokrytym wiecznym śniegiem) podobnie, jak np. ligustr (*Ligustrum vulgare* L.), porastający w dzikim stanie pobrzeża lasów w tych samych właśnie stronach okolicy Przemyśla.

³⁾ Nad potokami i na mokradłach śródleśnych zwyczajnie od 400 m. zwyk, schodzi jednak — zresztą rzadko — i na nizinę: Wielka Łąka pod Lacką Wolą w poziomie niecałych 220 m.

⁴⁾ Według dotyczeńowych danych endemiczny średnio-małopolski, występuje w okolicy Przemyśla wyłącznie w krainie pagórkowatej (przedgórze), w poziomie około 300 m, wymijając góry i nizinę, najczęściej na kilkuletnich dębach, pozatem nie rzadki na leszczynach i podrastających brzozach, wyjątkowo na młodych iwach, w porze mniej więcej od połowy maja do początku lipca.

Prałkowce, Pikulice, Siedliska (Smulikowski: Przemyśl, Janów, Lwów); *ligustici* L.; *pauxillus* Rosenh.; *ovatus* L.
Myiacus rotundatus Fbr.

Argoptochus + 4-signatus Boh.¹⁾: Winna Góra (Wyk.: Sil.; Kinel: Kasowa Ga; Smreczyński: Zaleszczyki).

Phyllobius glaucus Scop.; *gl.* # a. *atrovirens* Gyll.; *gl.* + a. *densatus* Schilsk. (Wyk.: Sil.); *gl.* + a. *nigrofemoratus* Gabr. (Wyk.: Tatr. m.); *gl.* # a. *pseudodensatus* Reitt.; *urticae* Deg.; *urt.* # a. *caesius* Steph.; *pyri* L.; p. a. *mali* Gyll.; p. a. *vespertinus* Gyll.; + *contemptus* Stev. (Wyk.: Hal. or.; Kuntze: Podole, Podkarpacie); *scutellaris* Redtb.; sc. # a. *wankae* Reitt.; *argentatus* L.; arg. a. *viridans* Boh.; *maculicornis* Grm.; *psittacinus* Grm.; *betulae* Fbr.; *oblongus* L.; obl. a. *floricola* Gyll.; *pomonae* Ol.; pom. # a. *cinereipennis* Gyll.; pom. # a. *pseudochlorizans* Reitt.; *cinereus* Fbr.; *sinuatus* Fbr.

Polydrosus impar Gozis; *imp.* + a. *vranicensis* Reitt. (Tenenbaum: Pieniny); *atomarius* Ol.; *mollis* Stroem.; m. a. *chlorophanus* Westh.; *sericeus* Schall.; + *thalassinus* Gyll. (Kinel: Podole); *flavipes* Deg.; *inustus* Grm.; *confluens* Steph.; *cervinus* L.; c. + a. *melanotus* Steph.; (Tenenbaum: Warszawskie); c. # a. *maculosus* Hrbst.; *pilosus* Gredl.; *tereticollis* Deg.; ter. a. *uniformis* Strl.; ter. # a. *niveopictus* Reiche; *ruficornis* Bonsd.; *picus* Fbr.; *pterygomalis* Boh.; *coruscus* Grm.

Scythropus mustela Hrbst.; m. a. *squamulatus* Hrbst.

Sciaphilus asperatus Bonsd.

Paophilus hampei Seidl.

Brachysomus + *hirtus* Boh. Winna Góra (Wyk.: Sil; Tenenbaum: Warszawskie); *subnudus* Seidl.; *echinatus* Bonsd.

Foucartia squamulata Hrbst.

Barypithes # *globus* Seidl.²⁾. Szechynie, Medyka; + *chevrolati* Boh. Brylince (Wyk.: Sil.); + *gabrieli* Pen. Medyka (Tenenbaum: Warszawa).

¹⁾ Nie częsty w czerwcu i lipcu na słonecznych, ciepłych, południowo-zachodnich zboczach, porośniętych ziołami o charakterze półstepowym.

²⁾ Gatunek siedmiogrodzki, nie rzadki na brzegach nizinnego, w części podmokłego lasu, na niskich ziołach, porastających wyżej polożone, mniej wilgotne miejsca; od maja do początku lipca.

Omius + hanaki Friv. Brylińce, Turnica (Wyk.: Carp. or.); *rufipes* Boh. Łuczyce; *mollinus* Boh.; *forticornis* Boh. Brylińce.

Strophosomus melanogrammus Forst.; *capitatus* Deg.; *cap.* # a. *zebrinus* Flach.

Eusomus ovulum Grm.

Brachyderes incanus L.

Sitona griseus Fbr. Szechynie, Lacka Wola; *lineatus* L.; *lin.* # a. *stricticollis* Desbr.; *lin.* # a. *geniculatus* Fbr.; *suturalis* Steph.; *sut.* a. *elegans* Gyll.; *sulcifrons* Thunbg.; *sulc.* a. *campestris* Ol.; *puncticollis* Hrbst.; *longulus* Gyll.; *flavescens* Mrsh.; + *lineellus* Bonsd. (Smreczyński: Krakowskie, Gorce; Tenenbaum: Zamojskie, Warszawskie); *crinitus* Hrbst.; cr. # a. *albescens* Steph.; *hispidulus* Fbr.; *humeralis* Steph.; *inops* Gyll.

Trahyphloeus alternans Gyll.; *spinimanus* Grm.; *bifoveolatus* Bech.; *bif.* a. *tesselatus* Mrsh.; *aristatus* Gyll.

Liophloeus tessulatus Müll. Szechynie, Byków; *herbsti* Gyll.

Barynotus obscurus Fbr.; + *elevatus* Mrsh. Brylińce, Turnica (Wyk.: Carp.).

Thylacites pilosus Fbr.

Chlorophanus viridis L.; *vir.* a. *salicicola* Grm.; *graminicola* Gyll.

Thangmecus palliatus Fbr.

Lepyrus palustris Scop. a. *asperatus* Schauf.; *capucinus* Schall.

Conioleonus glaucus Fbr. a. *turbatus* Fahr. Starzawa.

Mecaspis alternans Hrbst. Starzawa.

Pseudocleonus cinereus Schrank. Lacka Wola.

Chromoderus fasciatus Müll. Starzawa.

Cyphocleonus tigrinus Pn. Winna Góra, Łuczyce.

Cleonus piger Scop.

Lixus paraplecticus L. Hurko, Starzawa; *iridis* Ol. Lacka Wola, Starzawa, Bolestraszyce; *sanguineus* Rossi, Winna Góra; *ascanii* L. Łuczyce; *algirus* L. Brylińce; *bar-danae* Fbr. Lacka Wola, Szechynie.

Larinus brevis Hrbst. Winna Góra, Łuczyce; *turbinatus* Gyll. Starzawa; *sturnus* Schall. Pralkowce; *planus* Fbr.

Rhinocyllus conicus Fröhl. Szechynie, Brylińce, Kopyśno.
Tropiphorus micans Ol.; *carinatus* Müll.

Alophus triguttatus Fbr. + v. *vau* Schrank. (Wyk.: Hal. or. Bor.); v. + a. *weberi* Penecke (Wyk.: Hal. or.); v. + a. *carpathicus* Reitt. Chwaniów (Wyk.: Carp.); v. + a. *subcarinatus* Reitt. (Wyk.: Hal. or.); v. + a. *uniformis* Reitt. (Wyk.: Beskid).

Hylobius piceus Deg. Turnica; *abietis* L.; *fatuus* Rossi, Szechynie, Medyka.

Liparus + *glabrirostris* Küst. Prałkowce, Brylińce, Turnica (Wyk.: Carp.); *coronatus* Goeze, Prałkowce.

Plinthus + *sturmi* Grm. Lipowica, Kruhel Wlk., Brylińce, Turnica (Wyk.: Carp.); + *tischeri* Grm. Turnica (Wyk.: Carp.).

Liosoma deflexum Pn. z.; *defl.* # a. *collare* Rye; + *oblongulum* Boh. Pikulice, Brylińce, Turnica (Wyk.: Carp.); *cibrum* Gyll.; cr. # a. *ruficollis* Brancs.

Adexius scrobipennis Schönh.

Trachodes hispidus L.

Hypera oxalidis Hrbst. v. *viennensis* Hrbst. Lipowica, Szechynie, Brylińce (Smreczyński: Rytro, Ustrzyki, Przemyśl, Lwów); + *elegans* Boh. Chwaniów (Wyk.: Carp., Tatr. m.); Smreczyński: Rytro, Ustrzyki, Czarnohora; + *comata* Boh. v. *carpathica* Petri, Chwaniów (Smreczyński: Karpaty); + *rubi* Kraus, Kiczera, Chwaniów (Wyk.: Carp. or.; Smreczyński: Rytro).

Phytomyzus punctatus Fbr.; *fasciculatus* Hrbst. Żurawica; *adspersus* Fbr.; *ruminis* L.; *arundinis* Payk. Hurko; *contaminatus* Hrbst.; *meles* Fbr.; *mel.* # a. *pallidus* Cap.; *nigrirostris* Fbr.; *nigr.* a. *stierlini* Cap.; *arator* L.; *pedestris* Payk.; *elongatus* Payk.; *plantaginis* Deg.; *murinus* Fbr.; *variabilis* Hrbst.; var. # a. *parens* Gyll.; *viciae* Gyll.; *trilineatus* Marsh.

Limobius borealis Payk.

Pissodes piceae Ill. Pikulice, Brylińce, Jabłonów, Turnica; *notatus* Fbr.; *pini* L.; p. # a. *ferrugineus* Rey.; *validirostris* Gyll.; *harcyniae* Hrbst. Grochowce.

Grypidius equiseti Fbr.; eq. # a. *atritostris* Fbr.; *brunneirostris* Fbr.

Erirrhinus scirrhosus Gyll. Hurko, Medyka.

Notaris scirpi Fbr.; *acridulus* L.; *maerkeli* Boh. Winna Góra, Brylińce.

Dorytomus longimanus Forst.; *tremulae* Payk.; *tortrix* L.; + *minutus* Gyll. Medyka (Wyk.: Sil. Bor.; Tenenbaum: Warszawa); *validirostris* Gyll.; *hirtipennis* Bed.; *flavipes* Pn.z.; *filirostris* Gyll.; *dejeani* Faust.; *taeniatus* Fbr.; *affinis* Payk.; *occalescens* Gyll.; *melanophthalmus* Payk.; *mel. a. clitellarius* Boh.; *rufulus* Bed.; # *nebulosus* Gyll. Szechynie; *dorsalis* Fbr. Pikulice.

Smicronyx jungermanniae Reich.

Thanysphyrus lemnae Payk.

Bagous cylindrus Payk.; # *claudicans* Boh.; *lutulosus* Gyll.; *nigritarsis* Thoms.; *argillaceus* Gyll.

Hydronomus alismatis Mrsh.

Pseudostyphlus + *pilumnus* Gyll. Medyka, Szechynie, Łuczyce, Siedliska (Wyk.: Sil. Bor.; Kuntze: Podole; Tenenbaum: Warszawskie, Zamojskie).

Orthochaetes setiger Beck.

Dryophthorus corticalis Payk. Brylińce.

Codiosoma spadix Hrbst.

Cossonus parallelepipedus Hrbst.; *linearis* Fbr.; *cylindricus* Sahlb.

Eremotes elongatus Gyll.; *ater* L.; *punctulatus* Boh.;

Rhyncolus culinaris Grm.; *truncorum* Grm.; *lignarius* Mrsh.; # *angusticollis* Reitt.¹⁾ Lipowica, Prałkowce.

Cryptorrhynchus lapathi L.

Acalles + *denticollis* Grm. Lipowica, Bykowy Garb, Pikulice, Brylińce (Wyk.: Carp.; Tenenbaum: Warszawskie); + *camelus* Fbr. Brylińce, Turnica (Tenenbaum: Zamojskie); + *pyrenaeus* Boh. (Wyk. Carp.); + *hypocrita* Boh. Turnica (Wyk.: Carp.); # *echinatus* Grm. Pikulice, Brylińce, Turnica.

Mononychus punctum-album Hrbst.

Coeliodes ruber Mrsh.; *erythroleucus* Gmel.; *dryados* Gmel.; *trifasciatus* Bach; *rubicundus* Hrbst.

Stenocarus cardui Hrbst.; *fuliginosus* Mrsh.

Craponius epilobii Payk.

¹⁾ W próchniejącym drewnie dębowem, najczęściej w maju i czerwcu.

Cidnoirhinus 4-maculatus L.; 4-m. a. *rimulosus* Grm.

Coeliastes lamii Fbr.

Allodactylus affinis Payk.

Scleropterus serratus Grm.

Homonosoma + validirostris Gyll.¹⁾ Winna Góra, Żurawica, Medyka, Szechynie (Smreczyński: Krakowskie; Tenenbaum: Warszawskie).

Rhytidosoma globulus Hrbst.; + *fallax* Otto, Pikulice, Brylińce (Wyk.: Carp.; Smreczyński: Kraków, Rytro).

Amalus haemorrhous Hrbst.

Rhinoncus castor Fbr.; *inconspectus* Hrbst.; *bruchoides* Hrbst.; br. a. *rufescens* Steph.; *pericarpinus* L.; *perpendicularis* Reich.; p. a. *rufofemoratus* Schultze.

Phytobius velaris Gyll.; *canaliculatus* Fahr.; *waltoni* Boh.; *comari* Hrbst.; *4-tuberculatus* Fbr.; *4-nodosus* Gyll.; *4-cornis* Gyll.; *leucogaster* Mrsh.; *velatus* Beck.

Marmoropus besseri Gyll. Lacka Wola, Starzawa.

Phrydiuchus topiarius Grm. Góra Zamkowa, Winna Góra (Wyk.: Cracovia; Kinel: Podole; Tenenbaum: Kielce).

Ceutorhynchidius horridus Pn z. Winna Góra, Żurawica, Bolestraszyce; + *barnevillei* Grm. częstszy od poprzedniego (Smreczyński: Dobrowlany); # *hassicus* Schultze z poprzednim; *troglodytes* Fbr.

Micrelus ericae Gyll. Zielonka-Pikulice.

Ceutorhynchus terminatus Hrbst.; *nigrinus* Mrsh.; *floralis* Payk.; *pyrorrhynchus* Mrsh.; *pulvinatus* Gyll.; + *hampei* Bris. częstszy w bliższej okolicy (Wyk.: Pos. Lith.; Smreczyński: Kraków, Gdynia, Białowieża, Podole); *posthumus* Grm.; + *melanarius* Steph.²⁾ Hurko, Medyka (Wyk.: Sil., Bor.; Smreczyński: Kraków, Tarnów; Tenenbaum: Warszawa, Zamość); + *viduatus* Gyll. Żurawica, Bolestraszyce, Szechynie, Lacka Wola (Wyk.: Sil.; Smreczyński: Kraków, Tarnów); *pubicollis* Gyll.; *signatus* Gyll.; *abbreviatus* Fbr. Medyka, Szechynie, Byków; *geographicus* Goeze,

¹⁾ Gatunek pontyjski niezbyt rzadki w okolicy pagórkowatej i na nizinie, w miejscach zacisznych, raczej cienistych, niezbyt wilgotnych, na niskich ziołach; zimę przebywa pod mchem.

²⁾ Znajdowałem go na roślinach nadwodnych, porastających namuliste brzegi starorzeczy Sanu.

Cisowa, Sierakośce; *crucifer* Ol. Winna Góra, Prałkowce, Turnica; *javeti* Bris. Prałkowce, Lacka Wola; + *trisignatus* Gyll. Winna Góra, Prałkowce, Starzawa, Turnica (Wyk.: Pod.; Tenenbaum: Zamojskie); *ornatus* Gyll. Winna Góra, Hurko, Sierakośce, Medyka; + *larvatus* Schultze, Winna Góra, Żurawica (Wyk.: Leop.; Smreczyński: Kołomyja; Tenenbaum: Truskawiec); *litura* Fbr.; *trimaculatus* Fbr.; + *pallidicornis* Bris. Medyka, Szechynie (Smreczyński: Kraków, Ojców, Podole); *albosignatus* Gyll.; + *euphorbiae* Bris. Winna Góra, Pikułice (Wyk.: Sil.; Smreczyński: Krakowskie; Tenenbaum: Zamojskie); + *venedicus* Wse, Winna Góra (Smreczyński: Otwock); *sympyti* Bed.; *suturalis* Fbr. Winna Góra, Łuczyce; *arquatus* Hrbst.; *campestris* Gyll.; *triangulum* Boh.; *rugulosus* Hrbst.; + *edentulus* Schultze, Żurawica (Smreczyński: Kraków, Podole, Wołyń); *melanostictus* Mrsh.; *denticulatus* Schrank. Starzawa; *marginatus* Payk.; *punctiger* Gyll.; # *inhumeralis* Schultze, Winna Góra, Żurawica, Szechynie; *pollinarius* Forst.; *pleurostigma* Mrsh.; *puncticollis* Boh.; *griseus* Bris.; *syrites* Germ.; + *inaffectatus* Gyll. Bolestraszyce, Żurawica (Wyk.: Sil.); *assimilis* Payk.; *constrictus* Mrsh.; *cochleariae* Gyll.; *parvulus* Bris.; *nanus* Gyll.; *atomus* Boh.; *consputus* Grm.; *4-dens* Pnż.; *pictitarsis* Gyll.; *sulcicollis* Payk.; *scapularis* Gyll.; + *ignitus* Grm. Bakończyce, Medyka (Wyk.: Sil.; Smreczyński: Kraków, Białowieża, Podole; Tenenbaum: Zamość); + *pervicax* Wse, Brylince, Rokszycze (Wyk.: Sil. Bor. or.); *barbareae* Suffr.; *erysimi* Fbr.; *er.* + *a. chloropterus* Steph. (Wyk.: Sil.); *contractus* Mrsh.; *hirtulus* Grm.; *aeneicollis* Grm.; *pectoralis* Wse, *chalybaeus* Grm.; + *sulcatus* Bris. Żurawica, Bolestraszyce (Smreczyński: Krakowskie).

Poophagus sisymbrii Fbr.

Tapinotus sellatus Fbr. Hurko, Medyka.

Orobitis cyaneus L.

Coryssomerus capucinus Boh.; *cap.* # *a. ardea* Boh.

Baris artemisiae Hrbst.; *analis* Ol. Lacka Wola; *laticollis* Mrsh.; *cuprirostris* Fbr. Szechynie; *lepidii* Grm.; *coeruleescens* Scop.

Limnobaris T-album L.; *T-a.* + *v. pusio* Boh. Starzawa (Tenenbaum: Zamojskie, Warszawskie); + *pilistriata* Steph. Lacka Wola, Starzawa (Wyk.: Sil.; Tenenbaum: Zamojskie, Warszawskie).

Sphenophorus + *striatopunctatus* Goeze, Żurawica (Wyk.: Sil. Bor.; Tenenbaum: Warszawskie, Podole).

Calandra granaria L.; *oryzae* L.

Balaninus pellitus Boh.; *p.* # *a. sericeus* Desbr. Lipowica; *venosus* Grav.; *villosus* Fbr.; *nucum* L.; *glandium* Mrsh.; *cerasorum* Hrbst.; *rubidus* Gyll.

Balanobius crux Fbr.; *salicivorus* Payk.; *pyrrhoceras* Mrsh.

Anthonomus varians Payk.; *v.* + *a. rufipennis* Gerh. (Tenenbaum: Warszawskie); *rubi* Hrbst.; *inversus* Bed.; *pedicularius* L.; *rufus* Gyll.; *pomorum* L.; *rectirostris* L.; *rect.* + *a. unicolor* Fst. (Tenenbaum: Warszawa).

Bradybatus # *elongatus* Boh. Pikulice; # *subfasciatus* Gerst. Prałkowce.

Brachonyx pineti Payk.

Acalyptus carpini Hrbst.; *c. a. sericeus* Gyll.

Elleschus scanicus Payk.; *sc. a. pallidisignatus* Gyll.; *bipunctatus* L.; *infirmus* Hrbst.

Tychius 5-punctatus L.; *5-p.* # *a. tauni* Frick.; *5-p.* # *a. connexus* Reitt.; *polylineatus* Grm.; + *crassirostris* Kirsch. (Wyk.: Sil.; Smreczyński: Kraków, Tarnów, Zaleszczyki, Kołomyja; Tenenbaum: Pieniny); + *medicaginis* Bris. (Wyk.: Sil.; Tenenbaum: Wielkopolska, Mazowsze, Białowieża, Pieniny, Podole); # *haematopus* Gyll.; *femoralis* Bris.; *junceus* Reich.; *meliloti* Steph.; *tomentosus* Hrbst.; *picrostris* Fbr.; *p. a. posticus* Gyll.

Sibinia signata Gyll.; + *phalerata* Stev. Winna Góra (Wyk.: Sil.; Smreczyński: Kraków, Pomorze); *cana* Hrbst.; *viscariae* L.; *potentillae* Grm.; *p. a. roclosi* Desbr.

Anoplus plantaris Naezen.; *roboris* Suff.; + *setulosus* Kirsch. (Wyk.: Sil.; Smreczyński: Żywiec, Gorce, Kołomyja; Tenenbaum: Pieniny).

Orchestes rufus Schrank.; *pilosus* Fbr.; *erythropus* Grm.; *jota* Fbr.; *fagi* L.; *testaceus* Müll.; *lonicerae* Hrbst.;

pratensis Grm.; *decoratus* Grm.; *salicis* L.; *stigma* Grm.; *populi* Fbr.; *foliorum* Müll.

Rhamphus pulicarius Hrbst.

Mecinus collaris Grm.; *pyrastes* Hrbst.

Gymnetron labile Hrbst.; *pascuorum* Gyll.; *pasc.* + a. *bicolor* Gyll. (Wyk.: Sil.; Tenenbaum: Warszawa); *rostellum* Hrbst.; *melanarium* Gyll.; *vilosulum* Gyll.; *beccabungae* L.; b. a. *veronicae* Grm.; # *squamicolle* Reitt. Żurawica; *asellus* Grav.; *as.* + a. *plagiatum* Gyll. częstszy od typowego (Wyk.: Sil.); *tetrum* Fbr.; *antirrhini* Payk.; + *collinum* Gyll. (Wyk.: Pos. Mas.; Smreczyński: Kłaj); *linariae* Pn z.

Miarus graminis Gyll.; *campanulae* L.

Cionus tuberculosus Scop.; *scrophulariae* L.; *hortulanus* Geoffr.; *thapsi* Fbr.; *olivieri* Ross.; *alauda* Hrbst.; *solanii* Fbr.

Nanophyes globulus Grm.; *marmoratus* Goeze; m. a. *epilobii* Chevr.; m. a. *angustipennis* Bach; m. a. *salicariae* Fbr.; m. + a. *ruficollis* Rey (Wyk.: Sil.).

Magdalisch. memnonia Gyll.; *violacea* L.; *frontalis* Gyll.; *duplicata* Grm.; *armigera* Geoffr.; *carbonaria* L.; *cerasi* L.; + *exarata* Bris. (Wyk.: Sil.; Smreczyński: Krakowskie; Tenenbaum: Warszawskie); *barbicornis* Latr.; *flavicornis* Gyll.

Apion sulcifrons Hrbst.; *stolidum* Grm.; # *austriacum* Wagn. Winna Góra; *carduorum* Kruby; *onopordi* Kruby; *penetrans* Grm.; *distans* Desbr. # a. *spathula* Desbr.; *fusciostre* Fbr.; + *corniculatum* Grm. (Smreczyński: Ojców, Zaleszczyki; Tenenbaum: Warszawskie, Zamojskie); + *elongatum* Desbr. (Smreczyński: Krakowskie; Tenenbaum: Warszawa, Białowieża); # *hungaricum* Desbr. (= *formaneki* H. Wagn.); *difticille* Hrbst.; *ochropus* Grm.; *pomonae* Fbr.; *craccae* L.; *cerdo* Gerst.; *subulatum* Kruby; *aeneum* Fbr.; aen. + a. *chalceum* Mrsh. (Wyk.: Sil.); *radiolus* Kruby; *ebeninum* Kruby; *laevigatum* Payk.; *hookeri* Kruby; *dispar* Grm.; *urticarium* Hrbst.; + *pallipes* Krbr. (Wyk.: Pos. Sil. Bor.; Smreczyński: Kłaj, Salówka); *pubescens* Kruby; *seniculus* Kruby; *viciatum* Kruby; *atomarium* Kruby; ser-

pyllicola Desbr.; *millum* Bach; *elongatum* Grm.; *rubens* Steph.; *sanguineum* Deg.; *frumentarium* Payk.; *miniatum* Grm.; *filirostre* Krby; *nigritarse* Krby; *flavipes* Payk.; *ononicola* Bach; *assimile* Krby; *apricans* Hrbst.; *varipes* Grm.; *aestivum* Grm.; *curtirostre* Grm.; *simum* Grm.; *sedi* Grm.; *brevirostre* Hrbst.; *affine* Krby; *marchicum* Hrbst.; *violaceum* Krby; *v. a. virescens* Schilsk.; *v. a. obscurum* Gerh.; *minimum* Hrbst.; *gyllenhali* Krby; *platalea* Grm.; *spencei* Krby; *vorax* Hrbst.; *viciae* Payk.; *pisi* Fbr.; *p. + a. amplipenne* Gyll. (Wyk.: Sil.); *punctigerum* Payk.; *aethiops* Hrbst.; *striatum* Krb.; *pavidum* Grm.; *ervi* Krby; *simile* Krby; *ononis* Krby; *virens* Hrbst.; *v. # a. coeleste* Schilsky; *v. # a. atratulum* Vitale; *astragali* Payk.; *astr. # a. erogenous* Becker; *tenue* Krby; *meliloti* Krby; *loti* Krby; *columbinum* Grm.; *reflexum* Gyll.; *# facetum* Gyll. Żurawica.

Auletes basilaris Gyll.

Rhynchites tristis Fbr. Brylińce, Turnica; *betulae* L.; *mannerheimi* Humm.; *nanus* Payk.; *tomentosus* Gyll.; *cavifrons* Gyll.; *germanicus* Hrbst.; *aeneovirens* Mrsch.; *aen. # a. minutus* Hrbst.; *+ interpunctatus* Steph. Winna Góra, Lipowica (Wyk.: Pod.; Smreczyński: Krakowskie); *pauxillus* Grm.; *aequatus* L.; *aeq. a. paykulli* Schilsk.; *cupreus* L., *coeruleus* Deg.; *+ pubescens* Fbr. Winna Góra, Luczyce (Wyk.: Pod.); *auratus* Scop.; *bacchus* L.

Byctiscus populi L.; *p. + a. cuprifer* Schilsk. (Wyk.: Sil.); *betulae* L.; *b. a. violaceus* Scop.; *b. + a. nitens* Mrsch. (Wyk.: Sil.).

Attelabus nitens Scop.; *n. # a. pulvinicollis* Jek.

Apoderus coryli Scop.; *c. a. collaris* Scop.; *c. a. denigratus* Gmel.; *erythropterus* Zschach.

Za uprzejmę przeglądnięcie większości zbioru, sprawdzenie licznych oznaczeń a zwłaszcza zdeterminowanie szczególniejszych gatunków, składam na tem miejscu Dr. St. Smreczyńskiemu serdeczne podziękowanie.

R é s u m é.

Im Vorliegenden werden die Rüsselkäfer der Umgebung von Przemyśl aufgezählt und einige Bemerkungen über die Lebensweise von *Otiorrhynchus kotulae* Smulikowski gegeben. Diese nämlich, laut bisherigen Angaben, endemische, mittelkleinpolnische Art (Przemyśl-Lwów) erscheint ausschliesslich in der Hügelgegend in Höhe von c. 300 m, Gebirge und Niederungen meidend, öfters auf einige Jahre alten Eichen (*Quercus robur* L.), ausserdem ist dieselbe nicht selten auf Haselnußsträuchern (*Corylus avellana* L.) und jungen Birken (*Betula verrucosa* Ehrb.), ausnahmsweise auf Salweiden (*Salix caprea* L.), in der Zeit von Mitte Mai bis Anfang Juli.