

93. Nowe stanowiska *Hydraecia ultima* HOLST (*Lepidoptera, Noctuidae*) na Wyżynie Lubelskiej

New records of *Hydraecia ultima* HOLST (*Lepidoptera, Noctuidae*) in Wyżyna Lubelska

Gatunek *Hydraecia ultima* wyodrębniony przez HOLSTA w 1965 roku z *Hydraecia micacea* (ESPER, 1789) został wykazany z Danii, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Austrii, Czechosłowacji i Rosji.

W Polsce obecność *H. ultima* stwierdził BIELEWICZ (1973: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 7: 1-169.) W Bieszczadach Zachodnich i na Pogórzu Przemyskim. W zbiorach muzealnych (SKALSKI i ŚLIWIŃSKI (1975: Pol. Pismo Ent., 45: 9-22.)) odnaleźli okazy *H. ultima* łowione na Górnym Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Jeden okaz pochodził z Lublina (21 VII 1939).

Hydraecia ultima HOLST, 1965

- Motyle odławiano do samolówki świetlnej z lampą kwarcowo-rtęciową (S-300 Oryginal Hanau).
- Lublin, UTM-FB08, ogrody działkowe, 13 VIII 1969, 1 ex (♂).
 - Lublin, Rolniczy Zakład Doświadczalny Felin, UTM-FB17, 4 VIII 1973, 2 exx. (♂ i ♀), det. A. SKALSKI, 9-31 VIII 1980; 5 exx. (♂ ♂), 20 VII 1981, 1 ex. (♂), 7-16 VIII 1981, 4 exx. (♂ ♂), 22-29 VII 1982, 3 exx. (♂ ♂), 2-27 VIII 1982, 9 exx. (♂ ♂) i 1 ex (♀).
 - Antopol, UTM-EB 88, stary park, 16 VIII 1971, 2 exx. (♂ i ♀), 26 VIII 1971, 1 ex (♂).

JOLANTA NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, Lublin

94. Nowe stanowisko *Oria musculosa* (HÜBNER, 1808) (*Lepidoptera, Noctuidae*) w Polsce

A new record of *Oria musculosa* (HÜBNER, 1808) (*Lepidoptera, Noctuidae*) in Poland

Oria musculosa (HBN.) jest gatunkiem, którego zasięg występowania rozpościera się od środkowej Azji po północną Afrykę i południową Europę. W Europie występuje od Hiszpanii po Rosję, a północna granica zasięgu przebiega przez środkową Francję, środkowe Niemcy, południową Polskę i środkową Ukrainę. Najdalej na północ zarejestrowany został w końcu XIX wieku w Danii. W środkowej Europie gatunek ten spotykany jest bardzo rzadko, występując pojedynczo na stanowiskach kserotermicznych o podłożu wapiennym. Nie występuje w rejonach górskich dlatego nie stwierdzono go dotychczas w Szwajcarii. Natomiast na obszarach stepowych centralnej Azji *O. musculosa* jest gatunkiem stanowiącym zagrożenie dla upraw roślin zbożowych.

W Polsce znany dotychczas jedynie z Sandomierza i Opatowa z początku XX wieku. Ostatnio wykazano omawiany gatunek z okolic Chełma:

- FB67 rezerwat „Stawska Góra”, 3 VIII 1994, 1 ex. leg. K. PAŁKA, odłowiony na światło lampy rtęciowej w środowisku murawy kserotermicznej na zboczu wzgórza o podłożu wapiennym.

JANUSZ NOWACKI, Poznań
KRZYSZTOF PAŁKA, Lublin