

161. Nowe dane o rozszedzeniu *Tinagma ocnerosomellum* (STT.) i *Klimeschia transversella* (ZELL.) (*Lepidoptera*, *Douglasiidae*)

New data on the distribution of *Tinagma ocnerosomellum* (STT.) and *Klimeschia transversella* (ZELL.) (*Lepidoptera*, *Douglasiidae*)

Informacje o występowaniu gatunków z rodziny *Douglasiidae* pojawiają się w piśmiennictwie niezbyt często. Imagines bardzo rzadko przylatują do pułapek świetlnych, aktywne są w godzinach popołudniowych i łatwo można je wówczas odławiać wyplaszając z roślin. W miejscach swego występowania zwykle są liczne.

*Tinagma ocnerosomellum* (STANTON, 1850) – gatunek znany tylko z kilku stanowisk na terenie Polski. Poza stanowiskiem w Lesie Piwnickim pozostałe doniesienia mają znaczenie tylko historyczne. Ostatnio stwierdzono występowanie tego gatunku w zbiorowiskach kserotermicznych nad Dolną Odrą.

– (UTM–DV46) Bielinek, 6 VI 1989, 1 ♂ podczas wyplaszania z traw.

*Klimeschia transversella* (ZELLER, 1994) – znany z kilku rozproszonych stanowisk w Polsce środkowej, północnej i południowej. Obserwowano bardzo liczny pojaw tego gatunku na zboczach kserotermicznych w okolicach Hrubieszowa i Sandomierza:

– (GB03) Gródek, 20–25 V 1994, 8 ♂ 4 ♀,

– (EB51) rezerwat Góry Pieprzowe, 29 V 1995, 4 ♂ 2 ♀, przy wyplaszaniu z roślinności w godzinach popołudniowych łowiono i obserwowano liczne imagines.

Znalezienie tego motyla nad Bugiem i w okolicach Sandomierza znacznie rozszerza jego znany zasięg występowania w Polsce.

EDWARD BARANIAK, Poznań  
KRZYSZTOF PAŁKA, Lublin

162. Nowe stanowisko *Euchalcia consona* (F.) (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) w Polsce

New record of *Euchalcia consona* (F.) (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) in Poland

*Euchalcia consona* (F.) jest gatunkiem o zasięgu europejsko-azjatyckim, występującym w południowej części Europy wschodniej oraz na Bałkanach, sięgając na północy po środkową Europę. W Polsce gatunek ten osiąga swoją północną granicę zasięgu, występując na kilku izolowanych stanowiskach w południowej części kraju.

Poniżej podano kolejne stanowisko występowania omawianego gatunku:

– Rez. „Panińska Góra” koło Sandomierza UTM–EB52, 4 VIII i 21 VIII 1987 po 1 ex., K. PAŁKA leg.

JANUSZ NOWACKI, Poznań  
KRZYSZTOF PAŁKA, Lublin