274. Nowe stanowiska *Gnorimus variabilis* (LINNAEUS, 1758) i *Bruchus brachialis* FAHRAEUS, 1839 (*Coleoptera*: *Cetoniidae*, *Bruchidae*) w Polsce

New localities of *Gnorimus variabilis* (LINNAEUS, 1758) and *Bruchus brachialis* FAHRAEUS, 1839 (*Coleoptera*: *Cetoniidae*, *Bruchidae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Cetoniidae*, *Gnorimus variabilis*, *Bruchidae*, *Bruchus brachialis*, new localities, NW Poland.

Gnorimus variabilis (L.)

Gatunek znany w Polsce z nielicznych stanowisk w 9 krainach, często na podstawie danych sprzed kilkudziesięciu lat (BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J., 1983: Kat. Fauny Polski, XXIII, **9**.). Nowe stanowiska stwierdziłem około 15 km na północ od Piły:

– Pojezierze Pomorskie: ad Czapla (XV00), 29 VI 1999, 1♀, w locie na skraju młodnika w lesie mieszanym;
– Pojezierze Pomorskie: leśnictwo Zabrodzie, rez. „Smolary" (XV10), 27 VI 2000, 1♂ 1♀, ubogi bór sosnowy, w próchnowisku w kilkudziesięcioletniej powalonej brzozie (*Betula* sp.) wraz z kilkoma larwami w różnym wieku i szczątkami martwych imagines.

Bruchus brachialis FAHR.

Gatunek do niedawna uznawany był w Polsce za rzadkość, w ciągu ostatnich lat odnaleziony został we Wrocławiu (BOROWIEC L. ,1994: Wiad. Entomol., **13**, 4: 257-258) oraz w okolicach Milicza (BOROWIEC L. ,2000: Wiad. Entomol., **18**, 4: 251-252). Podane niżej nowe stanowisko potwierdza szybką ekspansję tego gatunku i przesuwa jego północną granicę zasięgu:

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piła - Gładyszewo (XU19), 29 V 1998, 1♂ 1♀, 29 V 1999, 3♂♂, na łące porośniętej wyką *Vicia villosa*.

Okazy zbierane były przeze mnie i znajdują się w moim zbiorze.

Serdecznie dziękuję Panu Prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za weryfikację oznaczenia i informacje dotyczące *B. brachialis*.

Rafał RUTA, Piła

275. Nowe stanowiska kilku interesujących gatunków biegaczowatych (*Coleoptera*: *Carabidae*) w Polsce

New records of some interesting species of *Carabidae* (*Coleoptera*) from Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Carabidae*, *Trechus austriacus*, *Duvalius subterraneus*, *Lebia cyanocephala*, *Lebia cruxminor*, *Colliuris melanura*, *Drypta dentata*, *Brachinus crepitans*, new records, Poland.

Trechus (Trechus) austriacus DEJEAN, 1831

Środkowoeuropejski przedstawiciel rodzaju. W południowej części areału występowania zamieszkuje jaskinie, w północnej synantrop w piwnicach domów mieszkalnych.

– Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: rez. „Węże" (CB36) – jaskinia „Stalagmitowa", 15 V 1999, 1 ex., leg. R.JASKUŁA.