

304. *Leiodes (Leiodes) furva* (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) w Wielkopolsce

Leiodes (Leiodes) furva (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) in Wielkopolska region (W Poland)

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Leiodidae*, *Leiodes furva*, record, Wielkopolska Lowland, W Poland.

Leiodes furva (ERICHSON) występuje w całej Europie, wszędzie jest jednak rzadki i sporadycznie znajdowany. W Polsce jest jednym z najrzadszych przedstawicieli rodzaju *Leiodes* LATR. Do tej pory podawany był tylko z trzech stanowisk w dwóch krainach: na Pobrzeżu Bałtyku i Śląsku Górnym, przy czym dane te pochodzą z połowy XX wieku.

Ostatnio odkryłem nowe stanowisko tego gatunku:

- Puszcza Notecka, Obrzycko (XU04), 5–6 VI 2000, 1♂, złowiony do samolówki świetlnej, leg. M. PRZEWOŹNY.

Jest to zatem gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Dziękuję mgr Danielowi KUBISZOWI za weryfikację oznaczenia.

Marek PRZEWOŹNY, Poznań

305. Nowe dla Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej gatunki sprężkowatych (Coleoptera: Elateridae)

Click-beetle species (Coleoptera: Elateridae) new to the Lublin Uplands and Sandomierz Lowlands

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Elateridae*, new records, new locality, Lublin Upland and Sandomierz Lowland, SE Poland.

W doniesieniu podano nowe stanowiska sprężyków, nie wykazanych dotychczas z obszaru Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej, uzupełniając tym samym stan poznania rozmieszczenia *Elateridae* w południowo-wschodniej Polsce. Gatunki te stwierdzono m.in. w czasie badań nad sprężkowatymi Parku Krajobrazowego „Łasy Janowskie”.

Ampedus erythrogonus (Ph. W. MÜLLER, 1821)

- Wyżyna Lubelska: Szlakówka (EB71), 21 V 1998, 2 exx., otrząśnięte do parasola entomologicznego z brzozy omszonej (*Betula pubescens* EHRH.) na skraju boru sosnowego (*Leucobryo-Pinetum*).
- Nizina Sandomierska: Łązek Ordynacki (EB90), 22 IV 1998, 1 ex.; 10.VI.1999, 3 exx., otrząśnięte do parasola entomologicznego w niewielkim skrawku boru świeżego (*Leucobryo-Pinetum*), z brzozy omszonej i kruszyny.

Gatunek eurokaukaski szeroko rozpowszechniony w Polsce. Na terenach nizinnych występuje lokalnie. Częściej poławiany w górach i na pogórzach oraz w północno-wschodniej części kraju.

Ampedus nigroflavus (GOEZE, 1777)

- Nizina Sandomierska: Bania (EB81), 23 IV 1998, 1 ex. (imago), w borze wilgotnym (*Molinio-Pinetum*), w mocno spróchniałym, leżącym na ziemi pniu brzozy.

Gatunek euroazjatycki, w Polsce szeroko rozmieszczony ale poławiany dość rzadko i sporadycznie. Chrząszcz odbywa swój rozwój w zbutwiałym drewnie drzew, głównie liściastych.

Limoni minutus (LINNAEUS, 1758)

– Nizina Sandomierska: Łązek Ordynacki (EB90), 21 V 1998, 1 ex., otrząśnięty do parasola entomologicznego z niskich zadrzewień z kruszyną, olszą czarną, dębem szypułkowym i brzozą omszoną, porastających skraj boru świeżego (*Leucobryo-Pinetum*).

Gatunek euroazjatycki, w Polsce dość szeroko rozprzestrzeniony. Nie notowany z wysokich partii górskich. Zasiedla suche, nasłonecznione siedliska w lasach mieszanych i liściastych (zwłaszcza dąbrowach) oraz tereny przyleśne.

Autor składa serdeczne podziękowania Panom dr. Lechowi BUCHHOLZOWI i dr. hab. Dariuszowi TARNAWSKIEMU za sprawdzenie oznaczeń i uwagi wykorzystane w tekście niniejszego doniesienia.

Krzysztof PAWŁĘGA, Katedra Zoologii AR, Lublin

306. Nowe stanowiska *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) (*Lepidoptera: Sphingidae*) w Polsce

New records of *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) (*Lepidoptera: Sphingidae*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Sphingidae*, *Proserpinus proserpina*, new records, SE Poland.

W Polsce *Proserpinus proserpina* (PALL.) jest gatunkiem rzadkim, znanym z rozproszonych stanowisk, przeważnie w południowej części kraju.

W latach 1996–1997 stwierdzono występowanie *P. proserpina* w Lublinie i jego okolicach, gdzie dotychczas gatunek ten nie był notowany.

Gąsienice *P. proserpina* obserwowano na trzech stanowiskach, na których magistranci Katedry Entomologii AR w Lublinie zbierali entomofaunę zasiedlającą wiesiołek:

- Świdnik (UTM: FB17), w pobliżu toru kolejowego, na wiesiołku (*Oenothera* sp.), 26 VI 1996, 1 ex. (larva), leg. Anita KUŚPIT.
- Elizówka (FB08), w ogrodzie działkowym, na wiesiołku dwuletnim (*Oenothera biennis* L.) i dziwnym (*O. paradoxa* HUDZIOK), 11 VIII 1996, 5 exx. (larvae), leg. Anita KUŚPIT.
- Lublin (FB17), w Gospodarstwie Doświadczalnym Akademii Rolniczej, na plantacji wiesiołka dziwnego, 8 VII 1997, 1 ex. (larva), leg. Leszek URBAN.

Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie żerowania gąsienic *P. proserpina* na uprawach wiesiołka dwuletniego i dziwnego. Być może zwiększenie powierzchni uprawy tych roślin przyczyni się do powiększenia liczby stanowisk omawianego gatunku zawisaka.

Jolanta NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, Kat. Entomol. AR, Lublin