Metzneria metzneriella (STAINTON, 1851) (*GELECHIIDAE*)

– Tyczyn, 12 VI, 1♀; 10 VII 2001, 1♂ (leg., coll. T. BARAN).

W kraju wykazany jedynie z Puszczy Boreckiej, Puszczy Białowieskiej, rez. „Zawadówka" oraz historycznych stanowisk na Śląsku.

Syncopacma cinctella (CLERCK, 1759) (*GELECHIIDAE*)

– Tyczyn, 22 VI 2001, 1♂ (leg., coll. T. BARAN).

Znany z rozproszonych, historycznych stanowisk; po 1960 roku podawany tylko z rez. „Stawska Góra" i miejscowości Biała Góra.

Syncopacma taeniolella (ZELLER, 1839) (*GELECHIIDAE*)

– Tyczyn, 14 VII 2001, 2♀♀ 1♂ (leg., coll. T. BARAN).

W Polsce gatunek ten stwierdzono dotychczas w Dolinie Nidy, na Lubelszczyźnie, Śląsku oraz w Małopolsce.

Schreckensteinia festaliella (HÜBNER, 1819) (*SCHRECKENSTEINIIDAE*)

– Tyczyn, 27 VI 2001, 1♂ (leg., coll. T. BARAN).

Po 1960 podawany jedynie z Puszczy Boreckiej, Lubelszczyzny oraz Małopolski; starsze dane dotyczą Śląska i Pomorza.

Tomasz BARAN, Kat. Biosystemat. URz, Rzeszów

350. Nowe stanowisko *Cucullia balsamitae* BOISDUVAL, 1840 (*Lepidoptera*: *Noctuidae*) w Polsce

New locality of *Cucullia balsamitae* BOISDUVAL, 1840 (*Lepidoptera*: *Noctuidae*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Noctuidae*, *Cucullia balsamitae*, new locality, Poland.

Cucullia balsamitae BOISD. występuje w zachodniej Palearktyce. Gatunek ten spotykany jest lokalnie od stepowych rejonów zachodniej Azji, przez środkową Rosję, Ukrainę po Łotwę i Litwę oraz północno-wschodnią Polskę. Poza zwartym zasięgiem omawiany gatunek występuje także we wschodniej Austrii i na Węgrzech. W Polsce rozmieszczenie *C. balsamitae* nie jest wystarczająco poznane. Jedyne wcześniej podane stanowiska występowania omawianego gatunku to Rygol w Puszczy Augustowskiej, skąd wykazany był na podstawie jednego osobnika, oraz Ligota Dolna na Górnym Śląsku.

Kolejne stanowisko, na którym stwierdzono *C. balsamitae* znajduje się na Mierzei Wiślanej:

– Piaski ad Krynica Morska (UTM: DF03), 12 VI 1991, 1 ex. odłowiony na światło.

Przedstawione stanowisko jest najdalej na zachód wysuniętym w północnym areale występowania tego gatunku.

C. balsamitae występuje w środowiskach otwartych o charakterze stepowym, chętnie zasiedla także piaszczyste wydmy. Gąsienice rozwijają się od lipca do września, żerując na liściach i kwiatach roślin z rodziny *Compositae*, głównie na *Chondrilla juncea* L. i *Hieracium* sp. Motyle pojawiają się w jednym pokoleniu od końca maja do lipca.

Janusz NOWACKI, Kat. Entomol. AR, Poznań