351. Nowe dane o dwóch gatunkach zwójkówek (*Lepidoptera*:*Tortricidae*) w północnej Polsce *

New localities of two species of *Tortricidae* (*Lepidoptera*) in Northern Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Tortricidae*, *Gibberifera simplana*, *Phalonidia curvistrigana*, new localities, N Poland.

Z pośród wielu gatunków motyli z rodziny *Tortricidae*, które stwierdziłem na obszarze parku krajobrazowego „Dolina Słupi" (woj. Pomorskie) w latach 1998–2001, dwa w ostatnich latach nie były notowane w Polsce. Zasługują zatem na szczególną uwagę.

Gibberifera simplana (FISCHER V. ROSLERSTAMM,1839)
- Dębnica Kaszubska (UTM: XA42), las mieszany, gąsienice zebrane 4 VIII 1999, motyle ex larva, 7–27 IV 2000;
- Dębnica Kaszubska (XA42), skraj lasu, gąsienice zebrane 19–29 VIII 2000, motyle ex larva 25 V – 4VI 2001.

Larwy zbierałem na odrostach niskich krzewów *Populus tremulae* (L.). Żerowały w zespolonych świeżych liściach. Przeobrażały się w nadgryzionym i sprzędzonym skrawku liścia. Zimowały w stadium poczwarki.

Phalonidia curvistrigana (STAINTON, 1859)
- Dębnica Kaszubska (XA42), 21VII1999, 1 ex. do światła lampy żarortęciowej.

Za pomoc w oznaczeniu powyższych gatunków składam serdeczne podziękowanie Panu Prof. Jarosławowi BUSZKO.

Paweł DANLOWSKI, Dębnica Kaszubska

352. *Microlepidoptera* (*Depressaridae*, *Oecophoridae*) nowe dla województw: łódzkiego i dolnośląskiego

Species of *Microlepidoptera* (*Depressaridae*, *Oecophoridae*) new to the districts of Łódź and Lower Silesia

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Depressaridae*, *Oecophoridae*, faunistics, Łódź district, Lower Silesia, Poland.

Występowanie *Depressaridae* i *Oecophoridae* w województwie łódzkim i dolnośląskim jest słabo poznane. W województwie łódzkim wykazano dotychczas tylko 32 gatunki w tym 13 do 1960 r., natomiast na Dolnym Śląsku 78 gatunków w tym tylko dwa po 1960 r. (BUSZKO, NOWACKI 2000: The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. P. T. Ent. Poznań, Toruń. 178 ss.)

Doniesienie to jest uzupełnieniem stanu wiedzy o rozmieszczeniu trzech gatunków w środkowej i południowo zachodniej Polsce.

Agonopterix multiplicella (ERSCHOFF, 1877)
- województwo łódzkie: Wieluń (CB27), 30 VIII 2002 – 1 ex. zwabiony do światła w ogrodzie, leg. et coll. I. SZELĄG.

Gatunek o rozmieszczeniu palearktycznym. W Polsce znany z Torunia, Pojezierza Mazurskiego i Wyżyny Sandomierskiej. Gąsienica żeruje na *Artemisia vulgaris* L. (PAŁKA 1992: Wiad. Entomol., **11**: 63-64). Pojaw motyla: sierpień–maj.

* Druk pracy sfinansowany przez autora.