

465. Nowe stanowisko *Diastictus vulneratus* (STURM, 1805) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce

New locality of *Diastictus vulneratus* (STURM, 1805) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, *Diastictus vulneratus*, new locality, Sandomierz Lowland, SE Poland.

Obszar rozszedlenia *Diastictus vulneratus* (STURM) obejmuje Europę Wschodnią i Środkową, a także Zachodnią Syberię. Gatunek ten w Polsce znany jest z 8 krain (BURAKOWSKI i in. 1983: Kat. Fauny Pol, Warszawa, XXIII, 9: 1-294). Zamieszkuje głównie środowiska na glebach piaszczystych, z miejscami z podsiąkającą wodą gruntową, na nizinach i w niższych położeniach górskich.

Autorzy potwierdzili w swoich obserwacjach, że *Diastictus vulneratus* związany jest z martwą materią organiczną – w miejscach jego występowania chrząszcze spotyka się w wilgotnych, piaszczystych zagłębieniach, często tam, gdzie jesienią została nawiana przez wiatr cienka warstewka liści topoli osiki (*Populus tremula* L.) lub brzozy brodawkowatej (*Betula verrucosa* EHRH.). Autorzy stwierdzili występowanie tego gatunku w Tarnobrzegu, na terenie starej piaszownicy (eksploatowanej już tylko w nieznacznym stopniu przez okolicznych mieszkańców):

– Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg: osiedle Sobów (UTM:EB50), 20 IV 2004 – 1 ex., 15 V 2005 – 3 exx., stara piaszownia, w wilgotnym, piaszczystym zagłębieniu, leg. J. PERYT; 12 VI 2005 – 3 exx., leg. R. CIEŚLAK; det. et coll. R. CIEŚLAK.

Rafał CIEŚLAK, Świdnik
Jan PERYT, Tarnobrzeg

466. Nowe dla Gór Świętokrzyskich, interesujące żuki (Coleoptera: Scarabaeoidea)

New to the Świętokrzyskie Mts., interesting scarabaeoid beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea)

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, new records, Świętokrzyskie Mts., central Poland.

W trakcie badań w Górach Świętokrzyskich stwierdzono 5 nowych dla tej Krainy gatunków żuków (Scarabaeoidea). Z tej liczby *Trox scaber*, *Aphodius ictericus* a szczególnie *Aphodius conspurcatus* należą do gatunków rzadkich i wykazanych z niewielu stanowisk w Polsce. Obecnie liczba stwierdzonych tutaj gatunków chrząszczy z tej nadrodziny wynosi 87 (BIDAS 2003: Rocz. świętokrz., Ser. B, 29: 119-138).

Materiał został zebrany przez autora i znajduje się jego w zbiorach.

Trox scaber (LINNAEUS, 1767)

– Korzecko ad Chęciny (DB52) – 25.09.2004, 1 ex. – przy dziupli na dębie.
– Kielce: Malików (DB73), 1 VII 2005 – 1 ex. (martwy), w domu.

Copris lunaris (LINNAEUS, 1758)

– „Góra Rzepka” ad Chęciny (DB62), 10 VI 2004 – 1 ex.
– Gościńiec ad Chęciny (DB62), 7 VI 2006 – 2 exx.

Wszystkie osobniki w odchodach krowy.