

481. Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce

New localities of some rare rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, new localities, Poland.

Poznanie rozszedlenia kusaków (Staphylinidae) w Polsce było przedmiotem wielu wydanych w ostatnich latach publikacji. Zawierają one dane dotyczące występowania ponad 50 gatunków nowych dla Polski (KUBISZ, KUBASIK 2000: Wiad. entomol., **19**, 1: 37-50) oraz kilkuset gatunków rzadziej spotykanych w kraju. Podczas badań faunistycznych, prowadzonych w roku 2007 odkryłem szereg nowych, krajowych stanowisk czterech interesujących gatunków kusakowatych. Omawiam je szczegółowo poniżej.

Gabrius expectatus SMET.

- Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy, Łysica – północne zbocze (UTM: DB93), pod korą zmurszałych kłód jodły, 15 VI 2007 – 3 exx., leg. T. WOJAS;
- Pogórze Dynowskie: Przemyśl - Lipowica (FA32), 26 VI 2007 – 1 ex., dąbrowa, pod korą leżącej kłody dębu, leg. T. WOJAS.

Gatunek znany dotychczas z czterech regionów o charakterze górskim (Beskid Mały, Pasma Babiej Góry, Beskid Sądecki, Bieszczady). Nowo odkryte stanowiska są obecnie najdalej na północ wysuniętymi miejscami występowania tego gatunku w Polsce.

Tasgius morsitans (ROSSI) [= *Ocypus compressus* (MARSH.)]

- Pobrzeże Kaszubskie: Jastrzębia Góra (CF27), 10 VIII 2007 – 4 exx., kamienista plaża nadmorska, u podnóża pokrytego zaroślami wybrzeża klifowego, pod kamieniami, leg. T. WOJAS; Karwieńskie Błota (CF27), 11 VIII 2007 – 1 ex., na skraju lasu, pod kamieniem, leg. T. WOJAS.

Jeden z rzadziej spotykanych przedstawicieli rodzaju, znany w kraju z około 10 stanowisk, jednak wszędzie łowiony był pojedynczo. Dlatego też zwraca uwagę fakt relatywnie liczego występowania tego gatunku w Jastrzębiej Górze (kilku zaobserwowanych osobników nie odłowiono).

Bolitobius inclinans (GRAV.)

- Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy, obszar ochrony ścisłej „Czarny Las” (DB93), 15 VI 2007 – 1 ex., wilgotny bór mieszany, wysiany ze ściółki, leg. T. WOJAS.

Znany z kilkunastu stanowisk rozproszonych w całym kraju. Z Gór Świętokrzyskich dotychczas nie wykazywany.

Euryusa sinuata ER.

- Wyżyna Krakowsko-Częstochowska: Kraków, Park Jordana (DA24), wysiany z murszu z dziupli dębu szypułkowego, 17 V 2007 – 1 ex., leg. T. WOJAS.

Uważany za relikw lasów pierwotnych, związany ze starymi, dziuplastymi drzewami. Z Polski znany z około 10 stanowisk, przy czym większość danych o jego występowaniu pochodzi sprzed ponad 70 lat. Z Krakowa podany w II połowie XIX w. z Bielana, stanowiska odległego o około 8 km na zachód od opisanego wyżej miejsca występowania tego gatunku. Fakt znalezienia tego interesującego gatunku w parku, blisko centrum dużego miasta, wskazuje na istotną rolę starych drzew (zwłaszcza dziuplastych) jako ostoi dla przynajmniej niektórych relikwowych gatunków „puszczańskich”.

Wyrażam podziękowanie Panu dr Grzegorzowi PAŚNIKOWI z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie za sprawdzenie oznaczeń części publikowanego materiału. Okazy dowodowe są przechowywane w moim zbiorze.

Tadeusz WOJAS, Kat. Botan. Leśn. i Ochr. Przyr. UR, Kraków