

w styczniu w dziesiątkach egzemplarzy w starym pniu jodłowym wraz z *Cucujus*, *Ostoma*, *Melasia* i t. d.).

Résumé.

Es werden *Cicindlidae*, *Carabidae* und *Rhysodidae* von Przemyśl und Umgebung angegeben.

Nowe i mało znane formy motyli fauny Polski.

(Neue und wenig bekannte Lepidopteren aus Polen).

podał

F. SCHILLE (Podhorzec k. Stryja).

W ostatnich kilku latach zebrałem kilka nowych gatunków i odmian motyli w okolicy Podhorzec, które niżej podaję. Gwiazdka oznacza formy nowe dla fauny a liczba obok porządkowej jest liczbą katalogu Staudingera i Rebla.

*1. (836.) *Ochrostigma velitaris* Hufn. ab. *cinerea* ♂ m. ab. nov.

Nakreślenia skrzydeł zupełnie jak u formy typowej. Kolor skrzydeł przednich łupkowo szary (schiefergrau), przepaski podwójne na skrzydłach nie białe lecz szaro wypełnione, duża plama u nasady skrzydeł przed pierwszą przepaską jasno ochrowo żółta. Plama duża u wierzchołka skrzydeł szara. W miejscu plamki nerkowej i między przepaską drugą (postmediana) a brzegiem zewnętrznym przebiega, chociaż bardzo słabo, ton ochrowy. Skrzydła tylne ciemno szaro brunatne.

Strzałków ex l. 29. VI. 24, z dębów.

*2. (2475.) *Rivula sericealis* Sc. ab. *albolividalis* m. ab. nov.

Jasno żółto biała, bez wszelkich nakreśleń prócz plamki nerkowej, w której 2 czarne kropki; plamka bez ostrych brzegów, rozlana. Tylne skrzydła również rozjaśnione, prawie że białe, u formy typowej ciemno szare.

Strzałków 13. VI. 25, na łące koło mego mieszkania.

*3. (2767.) *Zanclognatha tarsicrinalis* Knoch. ab. *pallida* Spuler.

Smuga środkowa i nakreślenia skrzydeł przednich mało znaczne, prawie że zupełnie znikają.

Strzałków, las 9. VII. 20 i jeden okaz w domu 19. VI. 20. Gatunek typowy wcale nie rzadki od połowy czerwca do początku lipca.

Nogi przednie ♂♂ tego gatunku, mianowicie golenie wierzchem rzadko, zaś pod spodem gęsto owłosione; w owym owłosieniu środkiem goleni duży pęczek włosów ciemno-gniady długości prawie 2 mm (w Seitzu Tom III. tablica 72. d. niedobrze rysowany i za jasno kolorowany); na stopach szeroki, wachlarzowaty pęczek włosów jasno płowo szarych długości 4 mm.

*4. (3192.) *Babtria tibiale* Esp. ab. form. *kauckii* m. ab. nov.

Przy spo. obności oglądania zbioru motyli pana T. Kauckiego we Lwowie zauważyłem dwa okazy z gatunku *Babtria tibiale* Esp. z etykietą *eversmannaria* H. S., pod którą owe okazy absolutnie nie dadzą się umieścić, na co zwróciłem uwagę pana Kauckiego i tenże pozwolił mi formę tę dokładnie zbadać. Zasiągałem też opinii Dra Rebla w Wiedniu co do owej formy, posyłając mu fotografię i on zgodził się na moją uwagę, że formę tę uważać należy jako nową. Motyle tej nowej formy są znacznie większe od formy typowej *tibiale* i odmian jej jak *moeroraria*, *kindermannii* i *eversmannaria*, bo skrzydła przednie mierzą od tułowia do wierzchołka 17 mm, zaś formy typow. 14 mm. Skrzydła są czarne z szeroką wstęgą czysto białą. Wstęga biała mierzy na brzegu ramiennym 4 mm, biegnie na poprzek skrzydła w kierunku ku tornusowi, zwęża się w $\frac{2}{3}$ swej długości nagle w trójkąt, którego wierzchołek stoi w dorsum skrzydła w $\frac{2}{3}$ tegoż długości. W strzępinie tornusu skrzydeł przednich biała plamka. W skrzydłach tylnych nieco poza połową brzegu ramiennego tychże zaczyna się wstęga biała szerokości 1 mm, rozszerza się, biegnąc w poprzek skrzydła, do 3 mm w samej połowie skrzydła, odtąd zwęża się znowu do 1 mm szerokości i kończy się nieco poza połową brzegu dorsalnego. Strzępina skrzydeł przednich pstra, zaś skrzydeł tylnych czysto biała.

Samica nie różni się niczem od ♂, tylko wstęgi są nieco węższe, mianowicie w przednich 3 mm, zaś w tylnych 2 mm.

Motyle pochodzą z góry Rebrowacz koło Worochty w Karpatach wschodnich, mianowicie 1 okaz złowiony 11. VI., zaś drugi 13. VI. 1909.

5. (3344.) *Larentia fluctuata* L. v. (et ab.) *acutangulata* Chr. Strzałków 27. V. 24. okaz w domu złowiony, 19. VIII. 25. do lampy koło domu; ab. *costivata* Hau., Strzałków 28. VII. 25., w domu wzięty.

6. (3503.) *Pelurga (Larentia) comitata* L. ab. *moldavinata* Carad.

Mniejsza od formy typowej, więcej jednostajnie ubarwiona i skrzydła tylne zaciemnione. Strzałków 1 okaz 26. VII. 20.

7. (4126.) *Sarothripus revayana* Sc. ab. *glaucana* Lampa. Jeden okaz wylął się u mnie z dębiny dnia 15. IX. 23; ab. *fuscilana* Schmid., okaz złowiony w Strzałkowie dnia 10. VII. 23.

8. (4738.) *Hepialus lupulinus* L. ab. *unicolor* Spuler.

Okaz bez nakreśleń, jednostajnie brudno-szarowo-gniady. Strzałków 10. VII. 23.

*9. *Ancyloleomia palpella* Schiff. Nowy ten dla fauny Polski gatunek złapał u mnie do lampy acetylenowej dnia 20. VIII. 25. Prof. Dr. Niezabitowski.

*10. (3164.) *Psecadia lugubris* Stgr. (v. P. P. E., III. 1—2.).

Okaz złowiony przez ś.p. bar. Brunickiego na wspólnej wycieczce ze mną i panem inżynierem Romaniszynem dnia 17. VI. 23. w Łotatnikach na polanie leśnej. Dziś podaję dokładny opis tegoż.

Skrzydła przednie czarno szare z nieco jaśniejszą strzępiną i czterema czarnymi kropkami, z których ta na żyłce poprzecznej zamykającej komórkę śródskrzydłową największa, przed nią w komórce śródskrzydłowej w $\frac{1}{3}$ długości skrzydła jedna nieco mniejsza, zaś dwie w zmarszczce skrzydła. Skrzydła tylne ciemniejsze od przednich, prawie zupełnie czarne, strzępina ich również nieco jaśniejsza. Głowa, głaszczki, tułów i odwłok do połowy czarne, reszta odwłoka żółta, nogi przednie, środkowe i uda tylnych czarne, zaś golenie i stopy tychże żółte. Rozpiętość skrzydeł 25 do 26 mm.

Zusammenfassung.

Der Verfasser bespricht einige für die Fauna neue Arten und Abarten auch wenig bekannte Spezies und gibt deren Beschreibung, namentlich:

1. (836.) *Ochrostigma velitaris* Hufn. ab. *cinerea* ♂ n. Die Zeichnungen entsprechen vollkommen der typischen Form. Die Farbe der Vorderflügel ist schiefergrau, die Doppelstreifen nicht weiss sondern grau ausgefüllt, der grosse Fleck vor dem ersten Querstreifen licht ockergelb. Der grosse Spitzenfleck grau. An Stelle der Nierenmakel und zwischen Aussenrand und dem zweiten Querstreifen, schimmert etwas, aber sehr schwach ein ockergelber Ton. Die Hinterflügel dunkel grau braun. Strzałków ex l. 29. VI. 24 ex *Quercus*.

2. (2475.) *Rivula sericealis* Sc. ab. *albolividalis* n. Licht gelbweiss, ohne jede Zeichnung mit Ausnahme der Nierenmakel, in welcher 2 schwarze Punkte stehen; die Makel ohne scharfe Ränder, ausgegossen. Die Hinterflügel ebenfalls gelichtet fast weiss, bei der typ. Form dunkelgrau. Strzałków 13. VI. 25. auf der Wiese bei seiner Wohnung.

3. (2767.) *Zanclognatha tarsicrinata* Knoch ab. *pallida* Spul. Der Mittelschatten und die Zeichnungen der Vorderflügel sehr schwach, fast vollkommen verschwunden.

Strzałków Wald am 9. VII. 20 und ein Exemplar 19. VI. 20.

Die Stammart keinesfalls selten von Mitte Juni bis Anfang Juli. Die Füsse des ♂ dieser Art, namentlich die Schienen sind oberseits schwach, unterseits dicht behaart; in dieser Behaarung steht in der Mitte der Schiene ein grosser fleck dunkelbrauner Schuppen, die eine Länge von 2 mm erreichen, (Seitz, Band III. Taf. 72; d nicht gut gezeichnet und zu licht gefärbt); an den Tarsen steht ein fächerförmiges Bündel lichtgrauer 4 mm langer haarförmiger Schuppen.

4. (3192.) *Babtria tibiale* Esp. ab. form. *kauckii* n. Die Falter dieser neuen Aberration sind bedeutend grösser als *tibiale* und deren Aberrationen wie *moeroraria*, *kindermannii* und *eversmannaria*. Die Vorderflügel messen 17 mm, der Stammform 14 mm; sie sind schwarz mit breiter rein weisser Querbinde, diese misst am Vorderrande 4 mm, läuft quer über den Flügel gegen den Tornus, verengt sich bei $\frac{2}{3}$ ihrer Länge plötzlich zu einem Dreieck, dessen Gipfel am Dorsum des Flügels in $\frac{2}{3}$ dessen Länge steht. Die Franzen im Tornus des V. F. mit weissem Fleck. Im Hinterflügel und zwar etwas hinter der Mitte des Vorderrandes beginnt eine 1 mm breite rein weisse Binde, welche im weiteren Verlaufe in der Mitte bis 3 mm breit wird, von da ab sich

bis zu 1 mm verschmälert und am Dorsalrande etwas hinter seiner Mitte endet. Die Hinterflügel sind ebenfalls schwarz. Die Franzen sind in den V. F. gescheckt, die der H. F. rein weiss. Das ♀ unterscheidet nichts vom ♂, nur sind die Querbinden etwas enger (in den V. F. 3 mm, in der H. F. 2 mm). Die Falter wurden vom Herrn K a u c k i in den Ostkarpathen, namentlich am Berge Rebrowacz bei Worochta gesammelt, 1 St. am 11. VI., das zweite am 13. VI. 09.

5. (3344.) *Larentia fluctuata* v. (et ab.) *acutangulata* Chr. und ab. *costovata* Haw.

6. (3503.) *Peluga (Larentia) comitata* L. ab. *moldavinata* Carad. Kleiner als die typ. Form, mehr einfarbig, auch die H. F. verdunkelt. Strzałków, 1 St. 26. VI. 20.

7. (4126.) *Sarrothripus revayana* Sc. ab. *glaucana* Lampa. Ein Stück ex l. am 15. IX. 23 ex *Quercus*; ab. *fuscilana* Schmid., ein Stück, Strzałków 10. VII. 23.

8. (4738.) *Hepialus lupulinus* L. ab. *unicolor* Spuler. Das Exemplar ist zeichnungslos, schmutzig grau braun. Strzałków 10. VII. 23.

9. *Ancylolomia palpella* Schiff. Der für die Fauna Polens neue Falter wurde beim Verfasser zu Lampe am 20. VIII. 25. von Prof. Dr. Niezabitowski gefangen.

10. (3164.) *Psecadia lugubris* Stgr. Der für die Fauna Polens neue Falter wurde vom seligen Baron Brunicki am 17. VI. 23 in Łotatniki auf einer Waldwiese erbeutet. Die V. F. sind schwarz grau mit etwas lichterem Franzen und 4 schwarzen Punkten, von welchen der an der Querader der grösste ist, vor diesem in der Mittelzelle in $\frac{1}{3}$ der Flügellänge ein etwas kleinerer und schliesslich 2 Punkte in der Falte. Die H. F. dunkler als die V. F., fast einfarbig schwarz, die Franzen ebenfalls etwas heller. Der Kopf, die Palpen, der Thorax und das Abdomen zur Hälfte schwarz, der Rest des Abdomens gelb, die Vorder-, und Mittelbeine und die Hüften der Hinterbeine schwarz, die Schienen und Tarsen derselben gelb. Flügelspannung 25—26 mm.
