

*33. (4337) *Z. achilleae* Esp. ab. *confluens* Diurz. Jeden okaz posiadam z Janowa, a drugi złowiłem na kwiatach mokrych łąk w Zawadowie; obydwu w lipcu.

PSYCHIDAE.

34. (4483) *Psyche viciella* Schiff. Kilka koszyczków znalazłem na różnych niskich roślinach w czerwcu. Motyle wylęgały się w pierwszej połowie lipca.

35. (4513) *Epichnopteryx pulla* Esp. Jednego ♂ złapałem na kwiecistej skarpie kolej. 27 maja. Motyl bardzo rzadki.

*36. (4217) *Psychidea bombycella* Schiff. ab. *rotundella* Brd. Tę rzadkość złapałem na mokrej łące 10 czerwca. Dotychczas wykazana z Brodów patrz Sprawozd. Kom. Fizjograf. Akad. Umiej. w Krakowie. T. 46. Dział II.

37. (4527) *Fumea casta* Pall. Na kilka koszyczków, znalezionych przygodnie z pokrewnymi, wylął mi się tylko jeden ♂. Zwycie legną się ♀♀ i te są pospolite. ♂♂ są bardzo rzadkie.

RÉSUMÉ.

Dans la spécification l'auteur nous présente les papillons nouveaux, plus rares, ou peu connus, trouvées par lui aux environs de Lwów. Cette spécification est le premier supplément de la monographie: „Motyle większe z okolic Lwowa“ (Macrolépidoptères des environs de Lwów) — publiée par J. Hirschler et J. Romaniszyn dans les: Sprawozd. Kom. Fiz. Akad. Um. w Krakowie T. 43. 1909.

NOWE STANOWISKO

GRAMMOPTERA INGRICA Baeckm. W POLSCE.

[EIN NEUER FUNDORT VON *GR. INGR.* Baeckm. IN POLEN]

PODAL

S. KÉLER.

W lecie roku 1922 zebrałem w Puszczy Białowieskiej jeden okaz tego pięknego gatunku kózki, opisanej w roku 1902 przez Baeckmanna, na podstawie dwóch okazów samczych. Baeckmann zebrał swoje dwa okazy pod Petersburgiem, mianowicie jeden

19. VI. 1900 „Auf unserem Gute Ploskoje im Luga'schen Kreise des St. Petersburger Gouvernements, ... Am offenen Fenster unseres Landhauses“, drugi 6. VI. 1902, tamże, ale „an einem Grashalm auf einer vom Oredesch überschwemmten Wiese“.

Trzeci z rzędu okaz zebrany został przez A. M. Łomnickiego w okolicy Stanisławowa i oznaczony jako *Grammoptera haliciensis* n. sp. Jak pisze Kinel w swej notatce (Ein Weibchen von *Gr. ingrlica* Baeckm. Bull. de l'Ac. d. Sc. d. Cracovie. Cl. M. N. S. B. 1917) nazwa ta może pochodzić najpóźniej z roku 1880, zatem mniej więcej w tym czasie egzemplarz ten poraz pierwszy zebrany został. Kinel zidentyfikował *G. haliciensis* Łomn. z *G. ingrlica* Baeckm., uważając stanisławowską formę za samicę tego gatunku. Różni się ona od opisu Baeckm. tylko wielkością i równoległymi pokrywami, a to są zwyczajne drugorzędne cechy płciowe kózek.

Mój egzemplarz ♂, złowiony 14. VI. 1922 w nadleśnictwie hajnowskim w Puszczy Białowieskiej (Zwierzyniec) na kwiatkach w prześwietlonej, brzożami poroślej partyjce lasu.

Okaz ten zgadza się z opisem Baeckmanna dla zidentyfikowania zupełnie wystarczająco. Różnica polega tylko na tem, że nietylko przedni brzeg wargi górnej i narządy pyszczkowe, ale cała warga górna z wyjątkiem środkowej plamki czarnej oraz przedni brzeg nadpyszcza (clypeus) są czerwonawo-żółte. Bródka środkowa na głowie zaczyna się nie od samego nadpyszcza, lecz od gładkiego, błyszczącego, półksiężycowatego, poprzecznie do płaszczyzny strzałkowej ciała ustawionego wzniesienia, między czołem a nasadą nadpyszcza. Zresztą wszystkie cechy zgodne z opisem.

Długość mojego okazu 6·50 mm, szerokość (największa w barkach) 1·75 mm — u Baeckmanna 5·75 mm, wzgl. 1·75—2·00 mm. Jest to zatem czwarty okaz tego gatunku wogóle, trzeci okaz samca wogóle, a drugi okaz w Polsce.

Samica zebrana przez A. M. Łomnickiego, znajduje się w zbiorach Muz. im. Dzieduszyckich we Lwowie, samiec zaś przemennie złowiony w zbiorach Muzeum Krajowego Szkoły Głównej Gosp. Wiejskiego — w Skierniewicach.

RÉSUMÉ.

Im Sommer 1922 fand ich das vierte bisher bekannte Exemplar von *Grammoptera ingrlica* Baeckm., ♂. Zwei Männchen dieser

Art fand Baeckmann 1900 u. 1902 bei Petersburg, dann wurde das ♀ von *Gramm. haliciensis* Lomn., (gefunden gegen 1880 bei Stanisławów in Polen) von Kinel mit *Gr. ingriva* Baeckm. identifiziert und endlich ich fand den 14. VI. 1922 im Białowieża-Urwalde ein Männchen, also das dritte Männchen, das vierte Exemplar überhaupt, welches sich in den Sammlungen des Museums der Hauptschule für Landwirtschaft in Skierniewice befindet.

O MASOWYM POJAWIE SÓWKI SOSNÓWKI *PANOLIS GRISEOVARIEGATA* Goeze

W LEŚNICTWIE RUDA NADLEŚNICTWA L. P. GRAJEWÓ.

[MASSENHAFTES AUFTRETEN VON *PANOLIS GRISEOVARIEGATA* Goeze]

PODAŁ

S. KÉLER.

W lipcu r. 1922 a mianowicie 14 i 15 odbyłem z polecenia Dep. Leśn. Min. Roln. i Dóbr Państw. ekspertyzę w lasach państw. nadleśnictwa Grajewo okręgu Siedlce. Chodziło o zbadanie i udzielenie porady w sprawie szkodnika, który zniszczył drągowinę sosnową wieku 30 lat, na obszarze ok. 12 ha w kwartale 23 leśnictwa Ruda (uroczysko Żebry).

W uroczysku tem stwierdziłem masowe wystąpienie motyla *Panolis griseovariegata* Goeze (sówka sosnówka). Brzeżny, o pow. 12 ha pas drągowiny sosnowej w kwartale 23 zniszczony został doszczętnie przez gąsienice, które ogołociły korony ze szpilek tegorocznych i starych. Motyla zastałem już w stadium poczwarki, w wierzchniej warstwie piaszczystej gleby pod cienkim pokładem ściółki. Obok poczwarek, które stanowiły gros całej ilości szkodnika, była spora ilość (jakich 25%) gąsienic, z których jedne już się zagrzebały celem przepoczwarczenia, inne żerowały jeszcze w koronach. Pojedynczo spotykałem gąsienice sówki wędrujące po strzałach ku górze; zapewne przedwcześnie strącone, wracały dla dokończenia okresu żerowania.

Oczywiście, że dla tej sośniny należało raczej wezwać księdza niż lekarza-entomologa lub należało entomologa wezwać