

KRÓTKIE DONIESIENIA

52. Nowe stanowisko *Orchesia luteipalpis* MULSANT et GUILLEBEAU, 1857 (*Coleoptera, Melandryidae*) w Polsce

A new record of *Orchesia luteipalpis* MULSANT et GUILLEBEAU, 1857 (*Coleoptera, Melandryidae*) from Poland

Orchesia luteipalpis MULS. et GUILL. rozsielony jest w Europie od Francji i północnych Włoch do południowej Skandynawii i wschodnich krajów bałtyckich. Wszędzie spotykany jest rzadko i sporadycznie. Z terenu Polski wykazany był z jednego tylko stanowiska na Pojezierzu Pomorskim przed przeszło stu laty. Nowe stanowisko, potwierdzające występowanie tego gatunku w Polsce odkryto także na Pojezierzu Pomorskim:

– okolice jeziora Świdwie (UTM – VV64), 14 exx. wyhodowanych z larw zebranych 17 I 1992 oraz 19 V 1992, leg. Sz. CZERWIŃSKI.

Larwy żerowały w grzybach porastających suchy pień wierzby, razem z larwami pokrewnego gatunku *O. micans* PANZER i stanowiły około 30% ogólnej liczby larw. Dorosłe chrząszcze *O. luteipalpis* opuszczały kolebki poczwarkowe 14–20 dni wcześniej od *O. micans*, kiedy te przekształcały się dopiero w poczwarki.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.

SZYMON CZERWIŃSKI, Koło;
TOMASZ MAJEWSKI, Koło

53. Nowe stanowisko *Eucinetus hopffgarteni* REITTER, 1885 (*Coleoptera, Eucinetidae*) w Polsce

A new record of *Eucinetus hopffgarteni* REITTER, 1885 (*Coleoptera, Eucinetidae*) from Poland

Eucinetus hopffgarteni REITT. to bardzo rzadki gatunek południowy, ostatnio wykazany również z Polski, z dwóch stanowisk w Bieszczadach (BURAKOWSKI B., 1991: Wiad. Entomol., 10, 3: 147–151.). Są to najdalej na północ wysunięte stanowiska tego gatunku, Poniższe dane wskazują na szersze rozsielenie *E. hopffgarteni* w polskich górach:

– Beskid Sądecki, Pasma Jaworzyny Krynickiej, 15 IX 1992, 1 ex., leg. A. MELKE.

Chrząszcz odłowiony został w czepak, z niskiej roślinności na obrzeżu leśnej polany. Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji autora.

TOMASZ MAJEWSKI, Koło