

13. *Carabus irregularis* FABR. i *Carabus scheidleri excellens* FABR. (Coleoptera, Carabidae) nowe dla fauny Roztocza

Carabus irregularis FABR. and *Carabus scheidleri excellens* FABR. (Coleoptera, Carabidae) new to the fauna of Roztocze (south-eastern Poland)

Na ogólną liczbę 41 występujących w Polsce gatunków z rodzaju *Carabus* L. z terenu Roztocza wykazano dotąd 16, w tym *C. besseri* FISCH., którego występowanie w kraju wymaga jeszcze potwierdzenia. Poniżej podano stanowiska dwóch kolejnych gatunków biegaczy:

Carabus (Pseudocechenus) irregularis FABR.

– Roztoczański Park Narodowy, oddział 155 (ad Lasowe), UTM – FB 40, 28 IX 1989, 1 ♂ pod luźną korą murszejącego, leżącego buka, leg. P. SZWAŁKO.

Gatunek środkowoeuropejski, rozprzestrzeniony w Polsce wzdłuż łuku Sudetów i Karpat; element górski w faunie Roztocza.

Carabus (Morphocarabus) scheidleri excellens FABR.

– Korhynie, FA 88, 10 VI 1983, 1 ♀ na suchym pastwisku, leg. P. SZWAŁKO.

Podgatunek znany w Polsce jedynie z kilku stanowisk w trzech krainach południowo-wschodnich, głównie na podstawie danych sprzed kilkudziesięciu lat.

PRZEMYSŁAW SZWAŁKO, Kraków

14. Nowe stanowiska *Cyphonidae* (Coleoptera) w południowej Polsce

New localities of *Cyphonidae* (Coleoptera) in southern Poland

Rodzina *Cyphonidae* należy do mniej zbadanych w faunie Polski, a dane dotyczące wielu jej przedstawicieli pochodzą często z początków naszego wieku. Celem częściowego chociaż uzupełnienia tych danych poniżej podano nowe stanowiska pięciu gatunków z tej rodziny, odłowionych przez autora na południu Polski.

Cyphon coarctatus PAYK.

– Kraków-Przegorzały (UTM – DA 14), 27 V 1990, 1 ♂ odłowiony czerpakiem nad Wisłą.

Gatunek notowany w Polsce z nielicznych stanowisk; z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej podawany jedynie przez LGOCKIEGO w 1908 r. z okolic Częstochowy.

Cyphon palustris THOMS.

– Kraków-Przegorzały, 27 V 1990, 1 ♂ czerpakiem nad Wisłą.

Większość danych o występowaniu w Polsce tego gatunku pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.