

486. Dwa nowe stanowiska *Nemosoma caucasicum* MÉNÉTR. (Coleoptera: Trogossitidae) w Polsce

Two new localities of *Nemosoma caucasicum* MÉNÉTR. (Coleoptera: Trogossitidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Trogossitidae, *Nemosoma caucasicum*, new records, Poland.

Gatunek bardzo rzadko w Europie poławiany, po raz pierwszy odłowiony w Polsce przed trzema laty na Nizinie Mazowieckiej (HILSZCZAŃSKI 2006: Wiad. entomol., **25**, 1: 29-32). Poza Polską w Europie wykazany ze Słowacji, a niedawno stwierdzony w Austrii: Vorarlberg (KAPP, BRANDSTETTER 2006: Koleopt. Rundschau, **76**: 437-440). Ponieważ najbliższe względem Polski stanowiska tego gatunku znajdują się w Słowacji, można było oczekiwać znalezienia go w południowej części naszego kraju. Autorzy odłowili imagines *N. caucasicum* na następujących stanowiskach:

- Wyżyna Małopolska: Radom, Las Kapturski (UTM: EB09), 13 V 2007 – 1 ♀, w locie obok sągu drewna, leg. M. MIŁKOWSKI;
- Wyżyna Krakowsko-Częstochowska: Kraków - Stare Miasto – część NW (DA24), 12 V 2008 – 1 ♂, w locie na chodniku przy ul. Łobzowskiej, leg. T. WOJAS.

Druga z wymienionych lokalizacji może się wydawać przypadkowa, lecz w odległości około 100 metrów od miejsca zebrania okazy znajduje się pas miejskiej zieleni (tzw. „Planty”) z licznymi egzemplarzami starych drzew liściastych, m.in. wiązów *Ulmus laevis* POLL.

Marek MIŁKOWSKI, Radom

Tadeusz WOJAS, Kat. Bot. Leśnej i Ochr. Przyr. UR, Kraków

487. Nowe stanowisko *Laena reitteri* WEISE, 1877 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) w Polsce

New locality of *Laena reitteri* WEISE, 1877 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Tenebrionidae, Lagriinae, *Laena reitteri*, new locality, Poland.

Laena reitteri WEISE, 1877 występuje w Karpatach (Polska, Słowacja, Czechy, Rumunia), górach Mecsek (Węgry), Alpach (Austria) i Bałkanach (Bułgaria), a także na górzystych terenach Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji. W Polsce, w oparciu o znaleziska pochodzące sprzed ponad 50 lat, chrząszcz ten znany jest tylko z okolic Rytra w Beskidzie Zachodnim oraz Przemyśla w Beskidzie Wschodnim (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat. Fauny Pol., XXIII, **14**: 1-309).

Poniższe stanowisko wskazuje na szerszy areal występowania tego gatunku w Polsce i potwierdza silny związek *Laena reitteri* ze środowiskiem leśnym i terenami górkimi.

- Bieszczady: Bukowiec ad Baligród (UTM: FV06), 460 m n.p.m., 15 IX 1968 – 2 exx., grabina, ściółka, leg. A. SZUJECKI.

Bionomia tego gatunku jest słabo poznana. Chrząszcze spotykane są pod odstającą korą i w dziuplach starych drzew liściastych oraz w ich sąsiedztwie, wśród mchów i opadłych liści.

Adam BYK, Kat. Ochr. Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa