

*Trichosirocalus horridus* (PANZER)

– Śląsk Dolny: Wrocław-Świniary, 29 IX 1992, 11 exx., zebranych w czerpak w środowisku ruderalnym, leg. L. BOROWIEC et J. KANIA.

JAROSŁAW KANIA, Wrocław

51. Nowe stanowiska *Chrysis rutilans* OLIVIER, 1790 i *Ch. longula* ABEILLE DE PERRIN, 1879 (*Hymenoptera, Chrysididae*) w Polsce\*

New records of *Chrysis rutilans* OLIVIER, 1790 and *Ch. longula* ABEILLE DE PERRIN, 1879 (*Hymenoptera, Chrysididae*) from Poland

*Chrysis rutilans* OLIV. (synonim: *Chrysis splendidula* DAHLBOM (nec ROSSI), 1845) jest gatunkiem palearktycznym, zasiedlającym jednak tylko cieplejsze tereny (Fauna ČSR, t. 3, 1954). Z Polski w obecnych granicach, znanych jest kilka jego okazów złowionych na początku bieżącego stulecia w okolicy Nakła nad Notecią, Mieściska (dawny powiat Wągrowiecki) i Bydgoszczy oraz dwa okazy złowione w 1935 i 36 r. pod Poznaniem (Wielkopolski Park Narodowy) (Katalog Fauny Polski, cz. XXVI, t. 3, 1980). Częściej podawano go z przydniestrzańskich rejonów zachodniego Podola, na zachód do linii Zaleszczyki – Bilcze (Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, t. 5–6, ss. 191–232, 1922).

*Ch. rutilans* zaobserwowałem niedawno w pobliżu administracyjnej granicy Warszawy (gmina Wola, UTM: DC99, 30 VII 1992, 1 ♀). Złotolotka oblatywała przymiotno kanadyjskie, *Erigeron canadensis* L. (*Compositae*) w fitocenozie ze związku *Sisymbrium* (*Chenopodietea*), wkraczającej na piaszczysto-gliniaste hałdy. Spośród innych *Chrysididae* nierzadko pojawiało się *Hedychrum gerstaeckeri* CHEVR., a także *Hedychridium ardens* (COQ.) i *Omalus pusillus* (FABR.). Zwraçała również uwagę obecność pasożytniczej pszczoły *Coelioxys conoidea* (ILL.) (*Megachilidae*).

W kontekście rozważań nad pochodzeniem tego stanowiska, godnym uwagi wydaje się istnienie w jego bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pontyjskiego tarczycy *Cassida pannonica* SUFFR. (*Coleoptera, Chrysomelidae*).

Ponadto należy wspomnieć o występowaniu na łąkach w niezbyt odległym kompleksie leśnym (siedlisko boru mieszanego, *Pino-Quercetum*) *Chrysis longula* ABEILLE DE PERRIN (UTM: DC99, 8 VIII 1992, 2 ♀♀) na goryszu pagórkowym, *Peucedanum oreoselinum* (L.) MOENCH (*Umbelliferae*). Gatunek ten jest rozprzestrzeniony w Europie i Azji Mniejszej. W Polsce notowany dotąd w dziewięciu krainach, nie znany m.in. z Pomorza, Mazur i Podlasia. Podobnie jak *Ch. rutilans*, nowy dla fauny Mazowsza.

PRZEMYSŁAW SZAFRAŃSKI, Warszawa

\* Druk pracy w 100% sfinansowany przez autora.