

151. Nowe stanowiska trzech gatunków miernikowców (*Lepidoptera, Geometridae*) w Polsce

New records of three species of *Geometridae* (*Lepidoptera*) in Poland

Scopula incanata (LINNAEUS, 1758)

– Pogórze Kaczawskie: UTM – WS75, Myślibórz, 2 VI 1995, 1 ex. w środowisku roślin zaroślowych.

Gatunek lokalny, znany z wielu stanowisk, głównie z południowej i południowo-wschodniej części kraju. Nowy dla Pogórza Kaczawskiego.

Anticlea derivata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

– Pogórze Kaczawskie: WS75, Myślibórz, 31 V 1995, 1 ex. w środowisku roślin leśno-zaroślowych.

Gatunek lokalny i rzadki, wykazany z nielicznych rozproszonych stanowisk, głównie z południowej części kraju. Nowy dla Pogórza Kaczawskiego.

Chariaspilates formosaria (EVERSMANN, 1837)

– Kotlina Sandomierska: EB62, Antoniów, 28 VI 1994, 1 ex. w środowisku torfowiska niskiego.

Gatunek był notowany w pierwszej połowie naszego stulecia z Pomorza Zachodniego. W ostatnich latach wykazany z rezerwatu „Bagno Bubnów” i miejscowości Macoszyn na Polesiu Lubelskim.

ANDRZEJ DEDYŃSKI, Wrocław

152. Nowe stanowiska *Dyscia fagaria* (THUNBERG, 1784) (*Lepidoptera, Geometridae*) w Polsce

New records of *Dyscia fagaria* (THUNBERG, 1784) (*Lepidoptera, Geometridae*) in Poland

Dyscia fagaria (THUNBERG) ma dwa obszary występowania. Pierwszym z nich jest rejon Środkowej Azji, Azji Mniejszej oraz południowo-wschodniej Europy, a drugi to północno-zachodnia Europa. Roślinami pokarmowymi gąsienic są *Calluna* SALISB. i *Erica* L.

W Polsce omawiany gatunek wykazany został dotychczas z okolic Zawiercia, gdzie był odłowiony przez MASŁOWSKICH na wrzosowiskach w Lasach Rokickich oraz z Pomorza Zachodniego, na czterech stanowiskach od Szczecina do Rowów. Występowanie *D. fagaria* na wspomnianych stanowiskach w ostatnim pięćdziesięcioleciu nie zostało potwierdzone.

Ostatnio stwierdzono występowanie tego motyla na dwóch stanowiskach:

– Żagań, UTM-WT21, 26 V 1995, 1 ♂ odłowiony do światła w borze świeżym z dużym udziałem *Calluna vulgaris* L.

– Leszno Górne (okolice), WT40, 5 VI 1995, 1 ♀ odłowiona w locie o zmierzchu na wrzosowisku.

Odłowione okazy należą do rasy *fleischmanni* (RBL.), charakteryzującej się ciemnobrązowym ubarwieniem.

JANUSZ SOSIŃSKI, Poznań