

189. Nowe stanowiska *Synanthedon stomoxyformis* (HÜBNER, 1790) (*Lepidoptera: Sesiidae*) w Polsce

New records of *Synanthedon stomoxyformis* (HÜBNER, 1790) (*Lepidoptera: Sesiidae*) from Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Sesiidae*, Poland, faunistics, new records.

Synanthedon stomoxyformis (HÜBNER) został stwierdzony na początku XX wieku w Gdańsku i Pilawie koło Warszawy. W okresie ostatnich pięćdziesięciu lat odnotowano ten gatunek z pojedynczych stanowisk z Małopolski, Pienin, rezerwatu „Góry Pieprzowe” koło Sandomierza oraz z rezerwatu „Szarpa Dobrska” koło Kazimierza nad Wisłą. Wszystkie dotychczasowe informacje o występowaniu *S.stomoxyformis* w Polsce, opierają się na pojedynczo odłowionych imagines. Z pewnością jest to związane z tym, że biologia tego gatunku do tej pory była poznana niewystarczająco. Niżej podano kolejne stanowiska omawianego gatunku:

- Kraków - Podgórci (UTM: DA14), 28 V 1950, 1♂, leg. A. GAJ, coll. A. KOCHANOWSKI;
- Kików (DA98), 21 V 1996, 12 opuszczonych żerowisk, 5 żerowisk z poczwarkami z których wyhodowano 1 ex. 1 VI 1996, wszystkie żerowiska na szakłaku *Rhamnus cathartica* L., leg. M. BĄKOWSKI et T. OSTAFIN; 18 VI 1996, 1♂ przyleciał w południe do torby z syntetycznymi feromonami płciowymi *Sesiidae*. Dalsza obserwacja wystawionych feromonów tego samego dnia od godziny 12 do 16 nie przyniosła żadnego rezultatu;
- Chęciny (DB61), 29 VIII 1996, 10 żerowisk na *R. cathartica*, leg. M. BĄKOWSKI.

Gąsienice *S. stomoxyformis* żerują na korzeniach *R. cathartica* oraz *Frangula alnus* MILL. Jesienią gąsienice przygotowują długi oprzęd sporządzony z trocin oraz ziaren ziemi, w którym na wiosnę następuje przepoczwarczenie. Oprzędy te są łatwe do znalezienia, gdyż ich części szczytowe wystają ponad ziemię i ich wyszukiwanie stanowi najłatwiejszą metodę znalezienia tego przeziernika.

Marek BĄKOWSKI, Poznań

190. Nowe dane o występowaniu *Scythrididae* (*Lepidoptera*) we wschodniej Polsce

On the occurrence of some *Scythrididae* (*Lepidoptera*) in eastern Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Scythrididae*, faunistics, E Poland

Scythrididae są jedną ze słabiej poznanych rodzin motyli w Polsce. Charakteryzują się małymi wymiarami, dziennym, a jednocześnie stosunkowo skrytym, trybem życia. Powoduje to, że są bardzo rzadko zbierane przy użyciu najczęściej stosowanych metod. W trakcie wieloletnich badań nad lokalnymi faunami odławiane są przeważnie przypadkowo, w niewielkiej liczbie okazów. W dodatku są motylami dość trudnymi do oznaczania, co również nie sprzyja gromadzeniu informacji faunistycznych o nich. Większość z nielicznych polskich danych jest już przestarzała i odnosi się głównie do południowej części kraju. Z północno-wschodniej Polski *Scythrididae*, jak dotąd, nie były w ogóle wykazywane.

Scythris potentilella (ZELLER, 1847)

- FE01, Gugny, 18 VI 1996, 2 exx.