

192. Uwagi o interesujących gatunkach *Depressariidae* (*Lepidoptera*) złowionych w Wielkopolskim Parku Narodowym

Notes on some rare, interesting moth species of the family *Depressariidae* (*Lepidoptera*) collected in the Wielkopolski National Park

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Depressariidae*, faunistics, new records, Wielkopolski National Park, Poland.

Dane dotyczące rozmieszczenia przedstawicieli rodziny *Depressariidae* są rozproszone w wielu przeważnie trudno dostępnych czasopismach pochodzących z ubiegłego wieku. Informacje te ze względu na duże podobieństwo morfologiczne wielu gatunków, różniących się w sposób wyraźny tylko budową narządów genitalnych nie mogą być obecnie uznane za w pełni wiarygodne.

Podczas prowadzenia w ostatnich latach uzupełniających obserwacji w Wielkopolskim Parku Narodowym, przy zastosowaniu generatora spalinowego „Yamaha” umożliwiającego penetrowanie miejsc wcześniej niedostępnych, stwierdzono występowanie kilku interesujących gatunków.

Agonopterix selini (HEINEMAN, 1870)

– XT29 Łódź, 1 ♀, 7 VIII 1994, do światła lampy rtęciowej.

Gatunek znany z niewielu stanowisk z okolic Wrocławia są to jednak dane pochodzące sprzed około 100 lat. Jedyne pewne stanowisko znajduje się w okolicy Rogoźna. Stanowisko w Wielkopolskim Parku Narodowym to drugie stanowisko w Polsce. Gatunek znany z Europy środkowej i południowej oraz Szwecji i Finlandii.

Agonopterix subpropinquella (STANTON, 1849)

– XT29 Łódź, 1 ♂, 26 IV 1995, znaleziono jeden okaz podczas przeszukiwania roślin po zapadnięciu zmroku przy użyciu latarki w pobliżu światła lampy rtęciowej.

Gatunek znany jedynie z niewielu stanowisk w okolicach Wrocławia i Rytra są to jednak dane pochodzące z ubiegłego wieku. Znalezienie tego gatunku w Wielkopolsce znacznie rozszerza jego uznawany dotychczas zasięg. Termin znalezienia jest potwierdzeniem hibernowania dojrzałych osobników. Poza Polską znany z Europy środkowej i północnej.

Agonopterix scopariella (HEINEMANN, 1870)

– XT29 Górka, 1 ♂, 25 VII 1981, do światła lampy rtęciowej.

W Polsce wykazywany współcześnie z Pienin, Beskidu Niskiego i Ustrońskiego, w czasach historycznych podany z okolic Wrocławia. Znany z Europy środkowej i północnej oraz Krymu.

Depressaria douglasella STANTON, 1849

– XT29 Łódź, 2 ♀, 7 VIII 1994, podczas wypłazania z roślinności po zapadnięciu zmroku.

W Polsce współcześnie znaleziony w Beskidzie Ustrońskim oraz rezerwacie „Las Piwnicki” koło Torunia, historyczne stanowiska znane są z okolic Wrocławia i Rytra. Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, znany również z Maroka.

Depressaria pulcherrimella STANTON, 1849

– XT29 Górka, 1 ♂, 22 IV 1994, znaleziony podczas wypłazania z roślin po zapadnięciu zmroku w pobliżu lampy rtęciowej.

Jest to drugie stanowisko tego gatunku w Polsce a termin złowienia potwierdza możliwość hibernowania stadiów imaginalnych. Dane historyczne pochodzące z ubiegłego wieku z powodu niewielkich różnic morfologicznych należy uznać za wątpliwe; dotychczas jedynym pewnym miejscem występowania tego gatunku był rezerwat „Las Piwnicki” koło Torunia.

Edward BARANIAK, Poznań