

214. Nowe dane o rozmieszczeniu *Eucarte virgo* (TREITSCHKE, 1835) (*Lepidoptera: Noctuidae*) w Polsce

New data on the distribution of *Eucarte virgo* (TREITSCHKE, 1835) (*Lepidoptera: Noctuidae*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Noctuidae*, *Eucarte virgo*, new locality, W Poland.

W ostatnich latach odnotowuje się zwiększenie zasięgu występowania *Eucarte virgo* (TREITSCHKE) w Polsce. Nowe stanowisko tego gatunku stwierdzone zostało w środkowej części Wielkopolski:

– Poznań - Jeżyce, UTM – XU20, 7 VII 1997, 1 ex., K. WOLFF leg.

Ze środkowej części Wielkopolski *E. virgo* nie był dotychczas wykazywany. Powyższe stanowisko jest w Europie najbardziej wysuniętym w kierunku północno-zachodnim, stanowiskiem omawianego gatunku.

Krystian WOLFF, Poznań

215. Nowe stanowiska *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883) (*Lepidoptera: Sesiidae*) w Polsce

New records of *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883) (*Lepidoptera: Sesiidae*) from Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Sesiidae*, *Synanthedon flaviventris*, new localities, SE Poland.

Po ukazaniu się pracy o *Sesiidae* południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego (BAKOWSKI, HOŁOWIŃSKI, 1997: Wiad. entomol., 16, 2: 107-114) stwierdzono z tej części kraju kolejny gatunek przeziernika, *Synanthedon flaviventris* (STGR.), który jest 17 gatunkiem *Sesiidae* wykazany z wspomnianego obszaru.

– Macoszyn (UTM: FB79), 6 VI 1997, 1 żerowisko na *Salix cinerea* L. na skraju lasu przy drodze, kilka dni później gąsienica się przepoczwarzyła ale niebawem poczwarka zamarła; XI 1997 – I 1998, kilkanaście żerowisk na *Salix* sp. Jedno z żerowisk rozłupano i znaleziono w nim gąsienicę.

– Hańsk (FB69), XI 1997 – I 1998, kilka żerowisk na *S. cinerea* przy gminnym wysypisku śmieci. W jednym żerowisku stwierdzono gąsienicę.

– Szczęśniki (FC60), kilka opuszczonych żerowisk, w jednym stwierdzono zmumifikowaną gąsienicę przerośniętą grzybnią.

Wszystkie żerowiska *S. flaviventris* stwierdzano na Polesiu na wierzbach rosnących na podłożu piaszczystym, w miejscach dobrze nasłonecznionych.

S. flaviventris był dotychczas notowany z Polski z pojedynczych stanowisk na zachodzie i południu kraju. Większość dotychczasowych informacji o stwierdzeniu omawianego gatunku w Polsce, pochodzi z początku XX wieku i opiera się głównie na odłowionych imagines.

Tak jak w przypadku wszystkich *Sesiidae*, tak i w przypadku *S. flaviventris*, najlepszą metodą stwierdzenia w terenie jego obecności, jest zbieranie żerowisk. Żerowanie *S. flaviventris* w łodydze wierzb, w szczególności *Salix cinerea*, *S. caprea* L. oraz *S. aurita* L., powoduje po-

wstanie w tym miejscu gruszkowatego zgrubienia. Wszelkie tego typu zgrubienia czy wyrośla są widoczne zimą lub wczesną wiosną gdy wierzby są pozbawione liści. W tym czasie wyszukujemy a następnie znakujemy wszystkie napotkane żerowiska i wycinamy je dopiero w czerwcu.

Marek BĄKOWSKI, Poznań
Marek HOŁOWIŃSKI, Macoszyn

216. Interesujące gatunki miernikowców (*Lepidoptera: Geometridae*) z południowej Polski

Interesting species of geometrid moths (*Lepidoptera: Geometridae*) from southern Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera*, *Geometridae*, new records, S Poland.

Badania motyli ciepłych rejonów południowej Polski wykazały obecność trzech rzadko spotykanych gatunków miernikowców (*Geometridae*) na nowych stanowiskach. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów, kolekcji Romualda SZPORA w Dzierżoniowie i Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Isturgia limbaria (FABRICIUS, 1775)

- Zyndranowa, UTM: EV57, 26 V 1995, 1 ex., 12 VIII 1997, 2 exx. (leg. W. KUBASIK);
- Płaza ad Chrzanów, CA85, 7 VIII 1993, 1 ex. (leg. J. MASŁOWSKI);
- Książnica ad Dzierżoniów, XS13, 1 V 1961, 21 V 1966, 30 IV 1994, 9 V 1994, ok. 10 exx. (leg. R. SZPOR)

Gatunek spotykany bardzo rzadko na kilku kserotermicznych stanowiskach w południowej Polsce. Występuje tam w dwóch formach ubarwienia, uznawanych tradycyjnie przez niektórych autorów za odrębne gatunki: *I. limbaria* (F.) oraz *I. roraria* (F.) (MÜLLER, 1996: [W:] KARSHOLD, RAZOWSKI (ed.): *The Lepidoptera of Europe*. Apollo Books.). Terminy polowu na powyższych stanowiskach wskazują na dwupokoleniowość gatunku w Polsce. W krajach sąsiednich motyl ten zaliczany jest do wymierających.

Perizoma minorata TREITSCHKE, 1828

- Zyndranowa, EV57, 12–14 VIII 1997, 2 exx. (leg. W. KUBASIK)

Górski gatunek, znany w Polsce z Sudetów, Wyżyny Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidu Śląskiego i Sądeckiego, Tatr, Pienin i Bieszczadów. Wszędzie spotykany lokalnie, w środowiskach kserotermicznych.

Crocallis tusciaria (BORKHAUSEN, 1793)

- Biecz, EA10, 20 VII 1961, 2 exx., (leg. anonim, coll. M. BIELEWICZ)

Cieplolubny gatunek związany ze zbiorowiskami krzewiastymi, notowany dwukrotnie w Wielkopolsce na początku XX w. Jego występowanie w Polsce ma prawdopodobnie charakter periodycznych, nieregularnych pojawów.

Adam MALKIEWICZ, Wrocław
Wojciech KUBASIK, Poznań