

### 304. *Leiodes (Leiodes) furva* (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) w Wielkopolsce

*Leiodes (Leiodes) furva* (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) in Wielkopolska region (W Poland)

KEY WORDS: Coleoptera, Leiodidae, *Leiodes furva*, record, Wielkopolska Lowland, W Poland.

*Leiodes furva* (ERICHSON) występuje w całej Europie, wszędzie jest jednak rzadki i sporadycznie znajdowany. W Polsce jest jednym z najrzadszych przedstawicieli rodzaju *Leiodes* LATR. Do tej pory podawany był tylko z trzech stanowisk w dwóch krainach: na Pobrzeżu Bałtyku i Śląsku Górnym, przy czym dane te pochodzą z połowy XX wieku.

Ostatnio odkryłem nowe stanowisko tego gatunku:

- Puszcza Notecka, Obrzycko (XU04), 5–6 VI 2000, 1♂, złowiony do samolówki świetlnej, leg. M. PRZEWOŹNY.

Jest to zatem gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Dziękuję mgr Danielowi KUBISZOWI za weryfikację oznaczenia.

Marek PRZEWOŹNY, Poznań

### 305. Nowe dla Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej gatunki sprężkowatych (Coleoptera: Elateridae)

Click-beetle species (Coleoptera: Elateridae) new to the Lublin Uplands and Sandomierz Lowlands

KEY WORDS: Coleoptera, Elateridae, new records, new locality, Lublin Upland and Sandomierz Lowland, SE Poland.

W doniesieniu podano nowe stanowiska sprężyków, nie wykazanych dotychczas z obszaru Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej, uzupełniając tym samym stan poznania rozmieszczenia *Elateridae* w południowo-wschodniej Polsce. Gatunki te stwierdzono m.in. w czasie badań nad sprężkowatymi Parku Krajobrazowego „Łasy Janowskie”.

*Ampedus erythrogonus* ( Ph. W. MÜLLER, 1821)

- Wyżyna Lubelska: Szlakówka (EB71), 21 V 1998, 2 exx., otrząśnięte do parasola entomologicznego z brzozy omszonej (*Betula pubescens* EHRH.) na skraju boru sosnowego (*Leucobryo-Pinetum*).
- Nizina Sandomierska: Łązek Ordynacki (EB90), 22 IV 1998, 1 ex.; 10.VI.1999, 3 exx., otrząśnięte do parasola entomologicznego w niewielkim skrawku boru świeżego (*Leucobryo-Pinetum*), z brzozy omszonej i kruszyny.

Gatunek eurokaukaski szeroko rozpowszechniony w Polsce. Na terenach nizinnych występuje lokalnie. Częściej poławiany w górach i na pogórzach oraz w północno-wschodniej części kraju.

*Ampedus nigroflavus* (GOEZE, 1777)

- Nizina Sandomierska: Bania (EB81), 23 IV 1998, 1 ex. (imago), w borze wilgotnym (*Molinio-Pinetum*), w mocno spróchniałym, leżącym na ziemi pniu brzozy.

Gatunek euroazjatycki, w Polsce szeroko rozmieszczony ale poławiany dość rzadko i sporadycznie. Chrząszcz odbywa swój rozwój w zbutwiałym drewnie drzew, głównie liściastych.