

Cephalcia lariciphila (WACHTL, 1898)

– Rezerwat „Żmudź” (FB85); 2 exx., 30 i 31 V 1998, złowiono w pułapkę Moericke’go w wyżynnym lesie mieszanym z udziałem modrzewia, leg. H. KUCHARCZYK.

Gatunek eurosyberyjski, w Polsce znany z kilku stanowisk. Preferuje drzewostany z udziałem modrzewia.

Dziękuję Panu Tomaszowi HUFLEJTOWI za weryfikację oznaczeń.

Wiesław PIOTROWSKI, Poleski PN, Urszulin

319. Nowe stanowisko *Telmatogeton japonicus* TOKUNAGA, 1933 (Diptera: Chironomidae) w Polsce

New locality of *Telmatogeton japonicus* TOKUNAGA, 1933 (Diptera: Chironomidae) in Poland

KEY WORDS: Diptera, Chironomidae, Telmatogetoninae, *Telmatogeton japonicus*, new locality, Poland.

Telmatogeton japonicus TOKUNAGA, 1933 [= *T. remanei* REMMERT, 1963; = *T. gedanensis* SZADZIEWSKI, 1977] jest gatunkiem zaliczanym do wysoce wyspecjalizowanej podrodziny ochotkowatych – *Telmatogetoninae*. Występowanie większości tych muchówek ograniczone jest do strefy supralitoralnej plaż morskich, a gatunki zaliczane do rodzaju *Telmatogeton* SCHINER notowane są w głównej mierze na wybrzeżach Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego półkuli południowej (SZADZIEWSKI 1977: Pol. Pismo Entomol., 47: 175-184). W Europie *Telmatogeton japonicus* notowany był do tej pory jedynie na dwóch stanowiskach. Pierwsze z nich to okolice Kolonii (Niemcy) (REMMERT 1963: Zool. Anz., 171: 165-178), a drugie obejmuje tereny plaż w Gdyni - Orłowie (SZADZIEWSKI 1977).

Obecnie w trakcie badań nad muchówkami Bałtyku i słonawisk nadmorskich w Polsce, *Telmatogeton japonicus* został znaleziony także na stanowisku:

– Gdańsk - Górki Wschodnie (UTM: CF52): 13 VIII 2000 – 6♂♂, 2♀♀; 15 V 2001 – 3♂♂, 1♀; 29 VII 2001 – 1♂; 19 VIII 2001 – 1♂, 2♀♀; wszystkie osobniki zebrano metodą koszenia siatką entomologiczną, leg. et coll. E. KACZOROWSKA.

Wspomniany teren jest zaliczany do słonawisk nadmorskich i leży u ujścia Wisły Śmiałej. Część materiału złowiono na plaży, w strefie supralitoralnej, a pozostałe okazy – na grobli ciągnącej się wzdłuż Wisły Śmiałej, która ze względu na niski prąd wody cechuje się stosunkowo wysokim zasoleniem. W obu przypadkach *Telmatogeton japonicus* był poławiany w typowych dla siebie siedliskach, czyli na kamieniach częściowo zanurzonych i opryskiwanych przez wodę oraz porośniętych glonami z rodzajów *Enteromorpha* i *Cladophora*. Na odsłoniętej w kierunku wody powierzchni przebywają larwy oraz poczwarki, podczas gdy postaci dorosłe skaczą po całej powierzchni głazów (SZADZIEWSKI 1977).

Rozszerzenie zasięgu tego gatunku potwierdza tezę REMMERTA (1963) o migrującym charakterze *T. japonicus*.

Elżbieta KACZOROWSKA, Kat. Zool. Bezkręg. UG, Gdynia