

Udea hamalis (THUNBERG, 1788)

- Witowo (FD73), Puszcza Białowieska, woj. podlaskie, 3 VI 1998 – 1 ex., (leg. D. WASILUK).
Znany z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.

Eurrhysis pollinalis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

- Mielnik (FC49), woj. podlaskie, 25 V 1997 – 1 ex., 12 VI 1997 – 1 ex., 8 V 1999 – 1 ex., 26 V 2001 – 1 ex., (leg. D. WASILUK).

Znany z kilku stanowisk w centralnej, południowo-wschodniej i wschodniej części kraju, w województwach: mazowieckim, łódzkim, podlaskim, lubelskim i małopolskim.

Anania funebris (Ström, 1768)

- Mielnik (FC49), woj. podlaskie, 25 V 1997 – 3 exx., 12 VII 1998 – 1 ex., 3 V 1999 – 1 ex., 23 VI 2000 – 1 ex., (leg. D. WASILUK).

Znany z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Materiały dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.

Artur BARANOWSKI, Inst. Biol. i Ochr. Środ. UMK, Toruń
Dariusz WASILUK, Woźniki

393. Nowe stanowiska *Nemophora congruella* (ZELLER, 1839) i *Nemophora ochsenheimerella* (HÜBNER, 1813) (*Lepidoptera: Adelidae*) w Polsce

New localities of *Nemophora congruella* (ZELLER, 1839) and *Nemophora ochsenheimerella* (HÜBNER, 1813) (*Lepidoptera: Adelidae*) in Poland

KEY WORDS: *Lepidoptera, Adelidae, Nemophora congruella, Nemophora ochsenheimerella*, new localities, Poland.

W trakcie badań faunistycznych, prowadzonych w rezerwacie „Jata” (UTM: EC85) w środowisku boru jodłowego (*Abietum-Polonicum*), odnotowano występowanie dwóch, rzadkich gatunków motyli z rodziny *Adelidae*:

Nemophora congruella (ZELLER, 1839)

- 27 V 2003, 2♂♂, 1♀. Gatunek środkowoeuropejski. W Polsce znany z regla dolnego Tatr oraz Puszczy Białowieskiej; ponadto dane historyczne odnoszą się również do woj. śląskiego i woj. dolnośląskiego.

Nemophora ochsenheimerella (HÜBNER, 1813)

- 27 V 2003, 1♂. Gatunek o zasięgu europejskim. W Polsce w ostatnich latach wykazany został z woj. lubelskiego: rez. Międzyrzeki – 16 VI 1991 (FA39) (leg. J. BUSZKO) oraz z woj. małopolskiego: Krościenko nad Dunajcem – 24 V 1989 (DV57) (leg. J. BUSZKO). Przed rokiem 1960, gatunek ten notowany był także w woj. dolnośląskim i woj. śląskim.

Autorzy składają podziękowania Prof. Jarosławi BUSZKO za udostępnienie swoich danych faunistycznych.

Artur BARANOWSKI, Inst. Biol. i Ochr. Środ. UMK, Toruń
Tomasz BARAN, Kat. Biosystemat. URz, Rzeszów