

– *Quercus robur*, od czerwca do września. Wcześniej, *D. chrysolina* nie była podawana z Pomorza, a *D. flavicornis* wykazana była ogólnikowo, bez podania konkretnej miejscowości (BURAKOWSKI i in. 1986: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 11: 1-243).

NITIDULIDAE

Rhizophagus parallelocollis (GYLL.) – semisyntropijny gatunek, w terenach leśnych dość rzadko poławiany. Jeden okaz tego gatunku odłowiono 18 IX, przy dziupli lipy drobnolistnej – *Tilia cordata* MILL. Z Pomorza notowany wcześniej z miejscowości Kruszycza–Sicko (BURAKOWSKI i in. 1986: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 12: 1-266).

TENEBRIONIDAE

Pentaphyllus testaceus (HELLW.) – ze względu na skryty tryb życia, jest gatunkiem rzadko poławianym, na Pomorzu znanym z Wejherowa (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 14: 1-309). Występuje w drewnie rozkładanym przez grzyba pasożytniczego, żółciaka siarkowego – *Laetioporus sulphureus*. Jeden okaz tego gatunku odłowiono 12 VIII, na dębie szypułkowym – *Quercus robur*.

Jerzy BOROWSKI, Adam BYK, Dariusz ŁĘGOWSKI
Kat. Ochr. Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa

400. *Lathridius pseudominutus* (STRAND) – chrząszcz nowy dla fauny Polski oraz inne interesujące chrząszcze (*Coleoptera*), odłowione w okolicach Kwisna na Pojezierzu Pomorskim

Lathridius pseudominutus (Strand) – a new beetle for Poland and other interesting beetles (*Coleoptera*) collected near Kwisno in the Pomeranian Lakelands

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Scaphidiidae*, *Elateridae*, *Cryptophagidae*, *Lathridiidae*, *Colydiidae*, *Ciidae*, *Cerambycidae*, *Lathridius pseudominutus*, faunistics, Kwisno, Pomeranian Lakelands.

Na terenie nadleśnictwa Niedźwiady, w okolicy Kwisna (UTM: XV39), od początku maja do końca września 2003 r. przeprowadzono odłowy chrząszczy, związanych ze starymi, zahubionymi bukami. 100 letnia buczyna, o wystawie południowo-wschodniej, położona jest na stromej skarpie, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wieprzy. Odłowu dokonano przy pomocy 15 pułapek typu „Fomes” (SZUJECKI 2001: [W:] Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wyd. SGGW, Warszawa: 7-31), zawieszonych na hubiaku pospolitym *Fomes fomentarius* (L.: FR.) FR. oraz pniarku obrzeżonym *Fomitopsis pinicola* (Sw.: FR.) P. KARST. Poniżej przedstawiamy wykaz rzadziej spotykanych gatunków chrząszczy, odłowionych na badanych drzewach.

SCAPHIDIIDAE

Scaphisoma boreale (LUNDL.) – gatunek znany tylko z Puszczy Białowieskiej. Jeden okaz tego gatunku odłowiono 20 VI, na hubiaku pospolitym. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Scaphisoma inopinatum (LÖBL) – ogólnikowo wykazany z Pomorza (LÖBL 1970: Rev. Suisse Zool., 77: 727-799). Jeden okaz tego gatunku odłowiono 20 VI, na pniarku obrzeżonym.

ELATERIDAE

Crepidophorus mutilatus (ROSENH.) – rzadko poławiany gatunek, związany przede wszystkim z białymi zgniliznami drewna. Jeden okaz tego gatunku odłowiono 20 VI, na drzewie z licznymi owocnikami hubiaka pospolitego. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Elater ferrugineus L. – rzadko poławiany gatunek, związany z drzewami, w których żerują larwy *Scarabaeidae* i *Lucanidae*. Dwa okazy tego gatunku odłowiono 13 VIII, na drzewie z owocnikami hubiaka pospolitego.

CRYPTOPHAGIDAE

Pteryngium crenatum (FABR.) – rzadko poławiany gatunek, związany z lasami o charakterze naturalnym. Jeden okaz tego gatunku odłowiono 20 VI, na owocniku hubiaka pospolitego. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

LATHRIDIIDAE

Lathridius pseudominutus (STRAND) – gatunek o niedostatecznie poznany rozmieszczeniu, wynikającym z trudności oznaczania tego gatunku i mylenia go z *L. anthracinus* MANN. i synantropijnym *L. minutus* (L.). Opisany ze Skandynawii, ponadto notowany z Karpat. Liczne okazy tego gatunku odławiano od czerwca do września, na drzewach z owocnikami hubiaka pospolitego i pniarka obrzeżonego. Nowy dla fauny Polski.

Enicmus testaceus (Steph.) – rzadko spotykany gatunek, odławiany zwykle na starych, za-grzybionych drzewach. Jeden okaz tego gatunku odłowiono 20 VI, na drzewie z licznymi owocnikami hubiaka pospolitego. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

COLYDIIDAE

Cicones variegatus (HELL.) – rzadko poławiany gatunek, znany głównie z zachodniej i południowej części kraju. 9 okazów tego gatunku odłowiono od czerwca do sierpnia, na drzewach z hubiakim pospolitym i pniarkiem obrzeżonym.

CIIDAE

Cis punctulatus GYLL. – bardzo rzadko poławiany gatunek, znany z Puszczy Białowieskiej, Roztocza, Górnego Śląska i Babiej Góry. Jeden okaz tego gatunku odłowiono 20 VI, na owocniku hubiaka pospolitego. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Cis lineatocribratus MELL. – Rzadko, zwykle pojedynczo poławiany gatunek. Notowany głównie z południowej części kraju. 7 okazów tego gatunku odłowiono od czerwca do sierpnia, na drzewach z hubiakim pospolitym i pniarkiem obrzeżonym. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

CERAMBYCIDAE

Corymbia scutellata (F.) – gatunek występujący przede wszystkim na obszarze zwartego zasięgu buka, ale liczniej spotykany jedynie w okolicach górskich i podgórszych. Dwa okazy tego gatunku odłowiono 13 VIII, na bukach porośniętych owocnikami hubiaka pospolitego.

CURCULIONIDAE

Phloeophagus thomsoni (GRILL) – dość rzadko poławiany gatunek, znajdujący głównie w południowej części kraju. Jeden okaz tego gatunku odłowiono 13 VIII, na buku porośniętym licznymi owocnikami hubiaka pospolitego. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Jerzy BOROWSKI, Adam BYK, Dariusz ŁĘGOWSKI
Kat. Ochr. Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa