

450. Nowe stanowisko *Cis lucasi* (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (*Coleoptera: Ciidae*) w Polsce

A new locality of *Cis lucasi* (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (*Coleoptera: Ciidae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Ciidae*, *Cis lucasi*, new locality, Poland.

Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN) to gatunek zamieszkujący południową i zachodnią część Europy oraz południową część Europy środkowej, wykazywany ponadto z Algierii, Kaukazu i Syberii (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 14: 1-309). W Polsce wykazany niedawno z: Puszczy Białowieskiej, Niziny Mazowieckiej, Beskidu Zachodniego i Bieszczadów (KRÓLIK 2003: Acta ent. sil., 9–10: 67-68).

W trakcie przeglądu zagrzybiałych pni topoli (*Populus* sp.) i wierzby (*Salix* sp.) stwierdziłem nowe stanowisko tego gatunku:

– Nizina Sandomierska: Dębica (UTM: EA34), II 2004, 3exx.

Wraz z omawianym gatunkiem zebrałem m.in.: *Sulcacis bidentulus* (ROSENHAUER, 1847), *Sulcacis affinis* (GYLLENHAL, 1827), o których informacje zostały opublikowane wcześniej (KRÓLIK i in. 2005: Wiad. entomol., 24, 4: 227-233).

Dziękuję Panu Romanowi KRÓLIKOWI za oznaczenie chrząszczy oraz udostępnienie materiałów dotyczących chrząszczy z rodziny *Ciidae*.

Andrzej TRZECIAK, Nadleśnictwo Dębica

451. Nowe stanowisko *Triplax collaris* (SCHALLER) (*Coleoptera: Erotylidae*) w Polsce

A new record of *Triplax collaris* (SCHALLER) (*Coleoptera: Erotylidae*) in Poland

KEY WORDS: *Erotylidae*, *Triplax collaris*, new record, W Poland.

Triplax collaris (SCHALLER, 1783) po raz pierwszy został podany z Polski przez HORIONA w 1960 r. (BURAKOWSKI i in. 1986: Kat. Fauny Pol., XXIII, 13: 1-278). Informację tę powtórzył MAZUR (1983: Klucze oznacz. Owad. Pol., XIX, 74–75: 1-31); jednak obydwaj autorzy wyrazili wątpliwości co do rzeczywistego występowania tego gatunku w naszym kraju. Do tej pory jedynym pewnym stanowiskiem, na którym w Polsce odławiano *T. collaris*, była Puszcza Białowieska (BURAKOWSKI i in. 1986: ibid.; KUBISZ 2001: [W:] Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: 172; obserwacje własne – P. WĘGRZYNOWICZ). Poniżej podajemy pierwsze stanowisko tego rzadkiego chrząszcza na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej: – Puszczykowo ad Poznań (UTM: XT29), 14 V 2005, 1 ex., na liściu buka w nasłonecznionej buczynie, leg. et coll. P. JAŁOSZYŃSKI.

W tym samym dniu w podobnych warunkach złowiono też dwa osobniki pospolitego przedstawiciela *Erotylidae* – *Tritoma bipustulata* FABR., również siedzące w miejscach nasłonecznionych na liściach buków.

Triplax collaris jest łatwy do odróżnienia od wszystkich krajowych gatunków tego rodzaju na podstawie czarno ubarwionej głowy. Gatunek ten jest rozmieszczony w środkowej i południowej Europie, jednak wszędzie spotykany sporadycznie, a wszelkie doniesienia są niezwykle rzadkie. Na temat jego bionomii też niewiele wiadomo; pewne informacje zebrał BU-