

204. Nowe stanowiska niektórych rzadkich gatunków motyli (*Lepidoptera*) w Wielkopolsce

New localities of some rare *Lepidoptera* species in the Wielkopolska region

KEY WORDS: *Lepidoptera*, new localities, Wielkopolska, W Poland.

Zygaena carniolica (SCOP.) (*Zygaenidae*)

- Poznań - Miłostowo (UTM: XU31);
- Poznań - Kobylepole (UTM: XU30).

Pojedyncze egzemplarze spotykano w trzeciej dekadzie lipca.

Gatunek występuje lokalnie, zwłaszcza w południowej części Polski, na murawach ksero-termicznych. Z Wielkopolski wykazany jedynie z Wielkopolskiego Parku Narodowego (okoliczność Mosiny).

Hemistola chrysoprasaria (ESP.) (*Geometridae*)

- Kórnik (UTM: XT49), 1 ex., 20 VII 1986, J. SOSIŃSKI leg.
- Puszczykowo (UTM: XT29), 3 exx., 26 VII 1993, J. SOSIŃSKI leg.

Gatunek wykazany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Niewątpliwie zajmuje nowe obszary wraz z rozprzestrzenianiem się rośliny żywicielskiej *Clematis vitalba* L. Nowy dla Wielkopolski.

Orthonoma obstipata (FABR.) (*Geometridae*)

- Bolechowo (UTM: XU32), 1 ex., 19 VI 1983, J. SOSIŃSKI leg; 6 IX 1983, 1 ex., W. ŚLIWA leg.;
- Łaski ad Kępno (UTM: BB07), 1 ex., 17 X 1996, J. SOSIŃSKI leg.

Gatunek uważany za zalatujący, spotykany pojedynczo, zwłaszcza w południowej części kraju. Dotychczas nie wykazywany z Wielkopolski.

Anticlea derivata (DEN. et SCHIFF.) (*Geometridae*)

- Bolechowo (UTM: XU32), pojedyncze egzemplarze odławiane do światła od drugiej połowy kwietnia do końca maja.

Gatunek nowy dla Wielkopolski, dotychczas wykazany z kilku stanowisk, głównie w południowej części kraju.

Eustroma reticulata (DEN. et SCHIFF.) (*Geometridae*)

- Bolechowo (UTM: XU32), odłowiony do światła 10 VI 1984, W. ŚLIWA leg.

Gatunek znany w Polsce z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Nowy dla Wielkopolski.

Eupithecia haworthiata (DBLD.) (*Geometridae*)

- Gorzyń ad Międzychód (UTM: WU63), 1 ex. odłowiony do światła 10 VII 1995, J. SOSIŃSKI leg.

Gatunek znany z zaledwie kilku stanowisk w Polsce, wykazany dotychczas między innymi z Poznania i z Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Eupithecia egenaria H. -S. (*Geometridae*)

- Gorzyń ad Międzychód (UTM: WU63), 1 ex., 18 VI 1995, J. SOSIŃSKI leg.;
- Łaski ad Kępno (UTM: BB07), 2 exx., 18 VI 1996, J. SOSIŃSKI leg.;
- Bolechowo (UTM: XU32), 1 ex., 5 VI 1976, W. ŚLIWA leg.;

Odłowione do światła.

Gatunek bardzo lokalny w kraju, nowy dla Wielkopolski.

Asthenan anseraria (H. -S.) (*Geometridae*)

- Poznań - Marcelin (UTM: XU21);
- Poznań - Kobylepole (UTM: XU30), J. SOSIŃSKI leg., liczne egzemplarze wyplaszane z krzewów *Cornus sanguinea* L.; na roślinie tej znajdowane były również gąsienice.
Gatunek nowy dla Wielkopolski. W kraju znany z nielicznych stanowisk.

Nothocasis sertata (HBN.) (*Geometridae*)

- Gorzyń ad Międzychód (UTM: WU63), 2 exx., 2 X 1996, J. SOSIŃSKI leg.;
- Bolechowo (UTM: XU32), 1 ex., 19 IX 1978, W. ŚLIWA leg.
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, podgórskiej części Polski, bardzo lokalnie występujący na terenach nizinnych. Nowy dla Wielkopolski.

Proserpinus proserpina PALL. (*Sphingidae*)

- Poznań - Kobylepole (UTM: XU30), dwa egzemplarze obserwowane były 31 V 1996.
Gatunek znany z pojedynczych stanowisk w środkowej i południowej części kraju. W Wielkopolsce stwierdzony dotychczas tylko w Rawiczu. Podane wyżej miejsca występowania, jest najbardziej wysuniętym na północ stanowiskiem tego gatunku w Polsce.

Eucarte virgo (TR.) (*Noctuidae*)

- Łaski ad Kępno (UTM: BB07), 1 ex. złowiony do światła 18 VI 1996, J. SOSIŃSKI leg.
Gatunek w Polsce dotychczas wykazany z Bieszczadów, oraz w 1992 roku z Dwikoz koło Sandomierza. Rozprzestrzenia się w kierunku zachodnim.

Lasionycta proxima (HBN.) (*Noctuidae*)

- Łaski ad Kępno (UTM: BB07), 2 exx. złowione do światła 6 VII 1994, J. SOSIŃSKI leg.
Gatunek znany z rozproszonych stanowisk na terenie całego kraju, głównie z części wschodniej i gór. Złowiony przed około 90 laty w Poznaniu, lecz później w Wielkopolsce nie stwierdzany.

Janusz SOSIŃSKI, Poznań
Wojciech ŚLIWA, Rakownia