

## 266. Interesujące chrząszcze (*Coleoptera*) odłowione w okolicach Hrubieszowa

Interesting beetles (*Coleoptera*) caught near Hrubieszów

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Rhysodidae*, *Histeridae*, *Buprestidae*, *Cryptophagidae*, *Erotylidae*, *Alleculidae*, *Cerambycidae*, *Curculionidae*, records, SE Poland.

Podczas badań prowadzonych przez studentów Sekcji Entomologicznej Koła Naukowego Leśników SGGW w okolicach Hrubieszowa w dniach 20 VI – 5 VII 1997 roku, odłowiono szereg rzadkich gatunków chrząszczy. W pracach brali udział Grzegorz BISTUŁA-PRÓSZYŃSKI, Marek CZAPOR, Daniel DOKTÓR, Janusz POROWSKI i Adam BYK.

– Strzelce ad Hrubieszów (FB94)

*Rhysodidae*: *Rhysodes sulcatus* (FABR.) – 1 ex.; *Cryptophagidae*: *Atomaria procerula* ER. – 2 exx.; *Cerambycidae*: *Anoplodera sexguttata* (FABR.) – 1 ex., *Agapanthia violacea* (FABR.) – 1 ex., *Phytoecia affinis* (HARRER) – 5 exx.; *Curculionidae*: *Larinus turbinatus* GYLL. – 1 ex.

– Gliniska ad Hrubieszów (FB83)

*Histeridae*: *Chalcionellus decemstriatus* (ROSSI) – 4 exx.

– Dubienka ad Hrubieszów (GB05)

*Buprestidae*: *Agilus alutaceus* OBENB. – 11 exx.; *Curculionidae*: *Chromoderus fasciatus* (O. F. MÜLL.) – 1 ex., *Cyphocleonus dealbatus* (GMEL.) – 1 ex., *Sphenophorus striatopunctatus* (GOEZE) – 1 ex.

– Tyszowce ad Hrubieszów (FB80)

*Erotylidae*: *Combocerus glaber* (SCHALL.) – 1 ex.

– Gródek ad Hrubieszów (GB03)

*Alleculidae*: *Hymenalia rufipes* (FABR.) – 2 exx.

Chrząszcze z rodzin *Buprestidae* i *Cryptophagidae* oznaczył Jerzy BOROWSKI, *Curculionidae* oznaczył Tomasz MOKRZYCKI, którym autor dziękuje.

Adam BYK, Warszawa

## 267. Nowe dane o dwóch gatunkach kusakowatych (*Coleoptera*: *Staphylinidae*) w Wielkopolsce

New records of two species of *Staphylinidae* (*Coleoptera*) from the Wielkopolska region

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Staphylinidae*, *Gyrohypnus fracticornis*, *Ocypus compressus*, Poland, Wielkopolska region, faunistic records.

W trakcie badań entomologicznych w rezerwacie „Dębina”, leżącym w okolicach Wągrowca i obejmującym fragmenty świetlistych dąbrów, znaleziono wśród licznie odłowionych chrząszczy dwa rzadkie gatunki kusaków. Należą do nich:

*Gyrohypnus fracticornis* (O. F. MÜLLER, 1776)

– XU45 rezerwat „Dębina” ad Wągrowiec, IX 1995, 1 ex., leg. J. LUBAWA.

Gatunek z podrodziny *Xantholininae* o słabo poznanym rozmieszczeniu w kraju, wykazany jak dotąd z Pojezierza Pomorskiego, Puszczy Piskiej, Puszczy Człuchowskiej, Niziny Mazowieckiej, Dolnego i Górnego Śląska, Babiej Góry i Karkonoszy. Jednego samca znaleź-