

321. Nowe stanowisko *Asiorestia motschulskii* KONSTANTINOV, 1991 (*Coleoptera: Chrysomelidae*) w Polsce

New locality of *Asiorestia motschulskii* KONSTANTINOV, 1991 (*Coleoptera: Chrysomelidae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera, Chrysomelidae, Asiorestia motschulskii*, faunistics, Wielkopolska-Kujawy Lowlands, W Poland.

Rozdzielenie kompleksu gatunków, na który składają się *Asiorestia interpunctata* (MOTSCH.), *A. sublaevis* MOTSCH. oraz *A. motschulskii* KONST. nastąpiło bardzo niedawno i spowodowało pewne zamieszanie w dotychczasowych danych o rozmieszczeniu należących do niego taksonów. Znajduje to również odzwierciedlenie w polskiej literaturze, w której informacje o występowaniu *A. motschulskii* KONST. mogą się ukrywać pod nazwami *A. sublaevis* MOTSCH. (WARCHAŁOWSKI 1978: Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX, 94c: 1-157) oraz *A. brevicollis* (DANIEL) (BURAKOWSKI i in. 1991: Kat. Fauny Polski, XXIII, 17: 1-227), ponieważ tak właśnie były oznaczane okazy znajdujące na terenie naszego kraju. Spośród wymienionych wyżej gatunków, na terenie Polski za pewne można uznać występowanie tylko *A. motschulskii* KONST., nie można jednak całkowicie wykluczyć obecności *A. interpunctata* (MOTSCH.) na Pobrzeżu Bałtyku (WARCHAŁOWSKI 1998: Fauna Polski, 20: 1-292). *A. sublaevis* MOTSCH. jest gatunkiem wschodniopalearktycznym, natomiast *A. brevicollis* (DANIEL) występuje na Półwyspie Apenińskim oraz w Alpach od zachodniej Francji po Styrię.

Nie wszystkie stanowiska dotyczące omawianego gatunku podane w „Katalogu fauny Polski” można uznać za całkowicie pewne (WARCHAŁOWSKI, in litteris), zestawione poniżej dane zoogeograficzne zaczerpnięto więc z cytowanej wyżej monografii WARCHAŁOWSKIEGO.

*A. motschulskii* KONST. jest gatunkiem subborealno-alpejskim o zwartym areale występowania obejmującym część Fenoskandii mniej więcej do kręgu polarnego, Holandię, północne części Niemiec i Polski, kraje nadbałtyckie oraz Białoruś. W pozostałej części Europy gatunek ten wykazano z niewielkiej liczby małych, wyspowych stanowisk znajdujących się w górach i na torfowiskach. W Polsce *A. motschulskii* podana była (z uwagami przedstawionymi powyżej) z pojedynczych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku, w Puszczy Augustowskiej, Puszczy Białowieskiej (stanowiska traktowane jako należące do obszaru rozsiedlenia zwartego) oraz z okolic Krakowa, z Gródka koło Hrubieszowa, Beskidu Zachodniego i okolic Zamościa (BOROWIEC 1996: Wiad. entomol., 15, 1: 57; BURAKOWSKI i in. 1991: Kat. Fauny Polski, XXIII, 17: 1-227). Nowe, interesujące stanowisko tego gatunku stwierdzono na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, z której *A. motschulskii* nie była dotąd podana:

– Drzewce ad Torzym (WT08), 2 VII 2001, torfowisko niskie, 3 exx., leg. Sz. KONWERSKI.

Składamy serdeczne podziękowania Prof. dr hab. Andrzejowi WARCHAŁOWSKIEMU za cenne uwagi dotyczące rozsiedlenia gatunków diskutowanych w niniejszej pracy. Okazy dowodowe znajdują się w naszych kolekcjach.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Włocławek

Szymon KONWERSKI, Zakł. Zool. Syst. UAM, Poznań