Crepidodera plutus (LATREILLE, 1804)
– Stare Miasto ad Leżajsk (FA07), 29 IV 2000, 6 exx., łąki i zarośla nad Sanem, leg. T. HUFLEJT.

W Polsce gatunek rzadko spotykany. Żeruje głównie na wierzbach wąskolistnych, zwłaszcza wierzbie purpurowej – *Salix purpurea* L. i wierzbie wiciowej – *S. viminalis* L.

Chaetocnema semicoerulea (KOCH, 1803)
– Nadl. Rudnik (oddz. 116), leśn. Czarny Las (EA88), 2 V 1997, 1♂, szkółka zespolona, leg. T. HUFLEJT.

W Polsce gatunek znany z nielicznych stanowisk. Przez środkowe dzielnice kraju przebiega północna granica jego zasięgu. Żeruje na wierzbach – *Salix* spp. (jako rośliny żywicielskie podawano także sity – *Juncus* spp.). Larwy być może rozwijają się na korzeniach traw z rodzajów trzcinnik – *Calamagrostis* ADANS. i mozga – *Phalaris* L.

Cassida lineola CREUTZER, 1799
– Kopcie (EA67), 22 VI 2000, 2 exx., ziołorośla nad brzegiem rzeki Przywry, leg. T. HUFLEJT.

Gatunek w Polsce napotykany sporadycznie i dość rzadko; przez środkowe dzielnice kraju przebiega jego północna granica zasięgu w Europie. Jako rośliny żywicielskie podawane są różne gatunki bylic – *Artemisia* spp.

Monika WĄSOWSKA, Muz. i Inst. Zool. PAN, Warszawa

326. Nowe dane o występowaniu *Zeugophora turneri* POWER, 1863 (*Coleoptera*: *Chrysomelidae*) w Polsce

New data on occurrence of *Zeugophora turneri* POWER, 1863 (*Coleoptera*: *Chrysomelidae*) in Poland

KEY WORDS: *Coleoptera*, *Chrysomelidae*, *Zeugophora turneri*, faunistics, Poland.

Zeugophora turneri POWER to północno-zachodnioeuropejski gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu. Dotychczas wykazywany z Wielkiej Brytanii, południowych części Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz z Litwy i Pomorza aż po zachodnią część Niziny Europejskiej. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach północno-zachodnich na podstawie danych sprzed przeszło 100 lat, stąd jego występowanie wymagało potwierdzenia nowymi materiałami (BURAKOWSKI i in.1990: Kat. Fauny Polski, XXIII, **16**: 1-279).

Omawiany gatunek stwierdzony został podczas badań terenowych w Beskidzie Żywieckim. Podane niżej stanowisko jest obecnie najdalej na południe wysuniętym miejscem występowania *Zeugophora turneri*.
– Beskid Zachodni: Węgierska Górka (UTM: CV69) 15 V 2001, 1 ex., leg. et coll. P. POCHEĆ. Chrząszcz został zebrany czerpakiem po zmierzchu na przydrożu z wierzbami.

Poprawność oznaczenia potwierdził prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI.

Paweł POCHEĆ, Zakł. Entomol. UJ, Kraków