

482. *Aphodius (Copriformorphus) scrutator* (HERBST, 1789) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Bieszczadach

*Aphodius (Copriformorphus) scrutator* (HERBST, 1789) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in the Bieszczady Mountains

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeidae, *Aphodius scrutator*, first record, the Bieszczady Mts., Poland.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje o nowych stanowiskach *Aphodius scrutator* (HERBST) na południu Polski. Dotychczas stwierdzano ten gatunek w Sudetach Wschodnich i Beskidzie Wyspowym (BURAKOWSKI i in. 1983: Kat. Fauny Pol., XXIII, 9, 1-294), Beskidzie Wschodnim (BUNALSKI, SZWAŁKO 1989: Przegł. zool., 33, 2: 55-60), Wyżynie Małopolskiej (BIDAS 2004: Wiad. entomol., 23, 4: 245-246). Ostatnio dane uzupełniono o nowo odkryte stanowiska w Beskidzie Wschodnim (Tylawa) i Beskidzie Zachodnim (Wojkowa) (BIDAS, CIEŚLAK 2006: Wiad. entomol., 25, 3:183).

*Aphodius scrutator* to gatunek łowiony w odchodach bydłęcych, preferujący ciepłe stanowiska. Stanowi on istotny składnik koprofauny Europy Południowej. W Polsce obserwowany jest sporadycznie. Obserwacje dotyczące jego występowania dowodzą, że ogranicza się ono do stanowisk rozlokowanych wzdłuż południowych granic Polski.

Autorzy w jednym przypadku obserwowali, a w drugim odłowili okazy *A. scrutator* na terenie Bieszczadów. Nowe stanowiska stanowią uzupełnienie wiedzy o areale jego występowania. W obu przypadkach chrząszcza obserwowano na odchodach bydłęcych (*Bos taurus* L.).

– Bieszczadzki Park Narodowy, Przełęcz pod Brzegami Górnymi ad Wetlina (UTM: FV04), 4 VIII 2007, teren wypasu bydła; zaobserwowano około 10 exx. (wykonano jedynie dokumentację fotograficzną).

– Żubracze ad Cisna (EV95), 5 VIII 2007 – 13 exx., miejsce wypasu bydła, leg. P. ZIĘBA et M. DWORAKOWSKI.

Okazy dowodowe oraz dokumentacja fotograficzna znajduje się w zbiorach autorów.

Przemysław ZIĘBA, Lublin

Mateusz DWORAKOWSKI, Białowieża

483. Potwierdzenie występowania *Heteroceris parallelus* GEBLER, 1829 (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce

Confirmation of the occurrence of *Heteroceris parallelus* GEBLER, 1829 (Coleoptera: Heteroceridae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Heteroceridae, *Heteroceris parallelus*, records, saline habitats, halobiont, Beskid Zachodni Mts., Wielkopolska-Kujawy Lowland, Poland.

Spośród około 300 opisanych dotąd gatunków skupionych w rodzinie różnorożkowych (Coleoptera: Heteroceridae) z Europy wykazano 34, a z Polski 11. Ich rozmieszczenie na terenie kraju nie jest dobrze poznane – obecność przynajmniej dwóch z nich wymaga potwierdzenia nowymi danymi (BURAKOWSKI i in. 1983: Kat. fauny Polski, XXIII, 9: 1-294). Niedawno ukazał się obszerny artykuł z nowymi stanowiskami sześciu gatunków z tej rodziny (PRZEWOŻNY i in. 2006: Wiad. entomol., 25 (2): 79-87). Poniżej podajemy dwa kolejne stanowiska, potwierdzające współczesne występowanie w Polsce *Heteroceris parallelus* GEBLER, 1829: