

522. Rzadkie w faunie Polski gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) odłowione w Pieninach i Beskidzie Zachodnim

Species of the leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) rare in the Polish fauna collected in the Pieniny and Western Beskid Mountains

KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, rare species, faunistic data, the Pieniny Mts., the Western Beskid Mts., S Poland.

Podczas pilotażowych, kilkudniowych odłowów owadów przeprowadzonych na obszarze Pienin i Góry Wdżar – zaliczanej do Beskidu Zachodniego – stwierdzono obecność trzech rzadkich w skali kraju gatunków chrząszczy stonkowatych. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące lokalizacji stanowisk i bionomii tych gatunków.

Longitarsus callidus WARCHAŁOWSKI, 1967

– Beskid Zachodni: Góra Wdżar ad Kluszkowice (UTM: DV57; 49°27'N, 20°19'E), 3 VII 2008 – 1 ♀, murawa kserotermiczna na zboczu, odłów czerpakiem.

Gatunek prawdopodobnie o rozsiedleniu zbliżonym do południowo-eurosyberyjskiego, dotychczas znany z południowej części Europy, sięgający dalej na wschód na obszar Iranu i Azerbejdżanu. Dotychczas jedynym znanym miejscem jego występowania w Polsce był teren wilgotnych łąk w Wojnowie (dzielnica Wrocławia), gdzie gatunek ten od roku 1976 dość regularnie, choć z przerwami, obserwowano i zbierano (BOROWIEC 1983: Przegl. zool., 27, 2: 197-199). Odłowienie gatunku w środowisku kserotemicznym nie potwierdza dotychczasowych informacji o zasiedlaniu przez niego siedlisk o wyższej wilgotności oraz obserwacjami nad jego roślinami żywicielskimi. Być może posiada on szersze spektrum ekologiczne w stosunku do siedliska, czy też żeruje na większej grupie roślin niż dotychczas sądzono, na co pośrednio może wskazywać zasięg jego rozsiedlenia.

Jest to drugie znane stanowisko występowania tej długostopki w Polsce.

Psylliodes isatidis HEIKERTINGER, 1912

– Pieniny: Sromowce Niżne (DV57; 49°24'18"N, 20°24'53"E), 3 VII 2008 – 2 ♀ ♀, ziołorośla nadrzeczne w zbiorowisku łęgowym (*Salicetum pentandro-cinereae*) nad Dunajcem, odłów czerpakiem.

Gatunek spotykany w centralnej Europie, arealem swego występowania sięgający na północ do południowej Szwecji i Finlandii, na zachód zaś do Azji Mniejszej i Kaukazu. Przez długi okres czasu traktowany i opisywany jako błękitna odmiana barwna pospolitego *Psylliodes cupreus* (KOCH). Jak podaje WARCHAŁOWSKI (1995: Fauna Polski, 17: 1-360) jest to prawdopodobnie gatunek monofagiczny związany z rodzajem urzet – *Isatis* L.

Jest to pierwsze jednoznaczne stwierdzenie tego chrząszcza w kraju. Jeżeli analiza zbiorów muzealnych nie wykaże jego wcześniejszego występowania (na co zwrócił również uwagę wymieniony powyżej autor) informację niniejszą będzie można traktować jako informację o nowym dla fauny Polski gatunku.

Cassida subreticulata SUFFRIAN, 1844

– Pieniny: Pieniński Park Narodowy, Czorsztyn - Zamek (DV57; 49°26'08"N, 20°18'46"E), 3 VII 2008 – 1 ex., kserotermiczna murawa naskalna, odłów czerpakiem.

Gatunek tarczka odławiany pojedynczo tylko w kilku krainach w Polsce, w tym także w Pieninach. Według WARCHAŁOWSKIEGO (2000: Fauna Polski, 22: 1-359) w naszym kraju należy do rzadkości, a w oparciu o dane z XX wieku znany jest tylko z kilku stanowisk w Polsce.

Autor składa serdeczne podziękowanie Panu prof. Lechowi BOROWCOWI za sprawdzenie lub korektę oznaczeń oraz Stanisławowi SZAFRANCOWI za wydatną pomoc w terenie przy odławianiu chrząszczy.

Radosław ŚCIBIOR, Uniw. Przyrodn., Lublin