

Mazowieckiej, Pojezierzu Pomorskim, Dolnym Śląsku i Wzgórzach Trzebnickich (BURAKOWSKI i in. 1986: *ibid.*; GRZYWOCZ, SZOŁTYŚ 1996: *Acta entomol. siles.*, 4, 1–2: 14-18). Poniżej podajemy nowe stanowisko tego gatunku:

– Śląsk Górny: Pokój vic., „Jagienieckie Łąki” (UTM: YS04), 7 VII 2007 – 1 ex., pomnikowy dąb szypułkowy, leg. et coll. M. A. MAZUR, det. M. PRZEWOŹNY.

Gatunek stwierdzono na pomnikowym dębie szypułkowym na terenie użytku ekologicznego „Jagienieckie Łąki” koło miejscowości Pokój na Opolszczyźnie, leżącego na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Jest to teren łąk śródleśnych otoczonych drzewostanami sosnowymi z niewielkim udziałem gatunków liściastych. W pobliżu łąk po obu stronach dojazdowej drogi leśnej, na odcinku około 150 metrów znajduje się aleja starych dębów.

Gatunek ten ma wciąż stosunkowo słabo poznaną biologię. Zarówno larwy jak i imago są drapieżne i rozwijają się w wierzchołkowych częściach usychających gałęzi dębów. *O. pallidus* nie jest gatunkiem chronionym, ale znajduje się w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” w kategorii EN – zagrożony (KONWERSKI 2004: [W:] GŁOWACIŃSKI, NOWACKI (red.): IOP PAN, AR Poznań, Kraków–Poznań: 128-129). Jest to jeden z wielu rzadkich gatunków chrząszczy związanych ze starymi drzewami liściastymi, które jak najczęściej powinny być otaczane odpowiednią, indywidualną ochroną w celu zachowania związanej z nimi, unikalnej fauny.

Miłosz A. MAZUR, Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością UO, Opole
Marek PRZEWOŹNY, Wydz. Biologii UAM, Zakł. Zool. Systemat., Poznań

541. Nowe stanowisko *Leiopus linnei* WALLIN, NYLANDER et KVAMME, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae) w Bieszczadach

New record of *Leiopus linnei* WALLIN, NYLANDER et KVAMME, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae) from Bieszczady Mountains

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, *Leiopus linnei*, new record, Bieszczady Mts., SE Poland.

Podczas przeglądania zbiorów Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW znaleziono okaz *Leiopus linnei* WALLIN, NYLANDER et KVAMME zebrany w Bieszczadach, z której to krainy gatunek ten nie był dotychczas wykazywany:

– Bieszczady: Hulskie (UTM: FV15), 29 VI 1992 – 1 ex., leg. A. SAWICKI, det. B.KOZAK.

Gatunek opisany w 2009 roku (WALLIN i in. 2009: *Zootaxa*, 2010: 31-45). Dotychczas wykazany z terenów środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej Europy. W Polsce występuje w różnych częściach kraju, przy czym jest częściej i liczniej obserwowany niż *Leiopus nebulosus* (LINNAEUS, 1758), z którego to gatunku został wydzielony. Rozwój larwalny *Leiopus linnei* odbywa się na różnych gatunkach drzew liściastych, przy czym preferowane są dęby. Bardzo sporadycznie rozwija się także na drzewach iglastych (GUTOWSKI i in. 2010: *Pol. J. Ent.*, 79: 271-282).

Bartosz KOZAK, Kat. Ochrony Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa