107. O występowaniu *Orgyia antiquoides* (HÜBNER, 1822) w okolicach Zamościa (*Lepidoptera, Lymantriidae*)

On the occurrence of *Orgyia antiquoides* (HÜBNER, 1822) in Zamość vicinity (*Lepidoptera, Lymantriidae*)

Podczas badań lepidopterologicznych prowadzonych w dniach 21–22 VI 1993 w rezerwacie Wieprzec koło Zamościa (UTM FB51) znalazłem gąsienice motyli z rodzaju *Orgyia* OCHS. żerujące na *Genista tinctoria* L. W wyniku hodowli otrzymałem imagines 7 ♂♂ i 14 ♀♀, które po zbadaniu budowy aparatów kopulacyjnych oznaczyłem jako *O. antiquoides* (HBN.) (= *O. ericae* GERM.).

Gatunek ten ma w Europie dwa obszary występowania przedzielone dysjunkcją. Północny obszar występowania obejmuje kraje położone wokół Morza Bałtyckiego, natomiast obszar południowy rozciąga się od południowej części Europy Środkowej (dolina Dunaju) przez Mołdawię, Ukrainę po północne stoki Kaukazu. Poza Europą gatunek spotykany jest w Zachodniej Syberii, na Zabajkalu i w północnych Chinach. W Polsce znany był dotąd z Pomorza Zachodniego i okolic Grudziądza (Nadleśnictwo Jamy).

Motyle z okolic Zamościa w porównaniu do okazów z Pomorza Zachodniego są nieco większe, mają wyraźniejsze przepaski, a ponadto brak jest u nich śladów białofioletowej plamy kostalnej. Można stąd wnioskować, że reprezentują one populację wywodzącą się z południowego obszaru występowania. Inne są także środowiska, w których występują motyle oraz ich rośliny pokarmowe. Na północy motyle spotykane są najczęściej na torfowiskach wysokich typu atlantyckiego i na wrzosowiskach, a gąsienice żerują przeważnie na *Erica tetralix* L., *Calluna vulgaris* (L.), *Andromeda polifolia* L. i *Myrica gale* L. Koło Zamościa gatunek ten występuje na zmeliorowanym torfowisku niskim typu węglanowego, a gąsienice żerują na liściach i kwiatach *Genista tinctoria* L. Ubarwienie gąsienic jest szafranowożółte z rysunkiem w formie czarnych, podłużnych linii. Przepoczwarczenie następuje w żółtym, jajowatym kokonie. Wylęg motyli obserwowano w okresie od 23 VII do 4 VIII 1993. Samica tylko częściowo wydostaje się z osłonki poczwarkowej, a kokonu nie opuszcza w ogóle. Jaja składane są wewnątrz kokonu.

Na podstawie jednego znaleziska trudno jest wnioskować, czy występowanie *O. antiquoides* (HBN.) w okolicach Zamościa ma charakter reliktowy, czy też jest wynikiem niedawnej kolonizacji.

JAROSŁAW BUSZKO, Toruń

108. Obserwacja *Daphnis nerii* (L.) na terenie Bieszczadów (*Lepidoptera, Sphingidae*)

Obserwation *Daphnis nerii* (L.) on the Bieszczady Mts. (*Lepidoptera, Sphingidae*)

Daphnis nerii (L.) należy do największych i najpiękniej ubarwionych przedstawicieli *Sphingidae* Palearktyki. Jest on gatunkiem strefy podzwrotnikowej występującym w Afryce i zachodniej Azji, charakteryzującym się corocznymi migracjami w kierunku północnym. Niejednokrotnie docierając do Wysp Brytyjskich i Skandynawii. W Polsce migrujące osobniki *D. nerii* spotykane były nadzwyczaj rzadko między innymi w: Gdańsku, Lesznie, Poznaniu, Rawiczu, Toruniu i Warszawie.