

Aphodius contaminatus (HERBST, 1783)

- Pobrzeże Bałtyku: Smołdziński Las ad Smoldzino (XA46), 20 IX 2003 – 15 exx., w odchodach koni i krów, leg. A. BYK (coll. AB).
- Pojezierze Pomorskie: Stara Brda Pilska ad Miastko (XV47), 1–31 X 1999 – 3 exx., w pułpkę z przynętą z odchodów krowy, leg. A. BYK (coll. AB).
- Wyżyna Małopolska: Rogów ad Koluszki (DC24), 28 IX 2011 – 1 ex., w odchodach konia, leg. J. BOROWSKI (coll. JB).

Aphodius immundus CREUTZER, 1799

- Wyżyna Lubelska: Andrzejów ad Chełm (FB86), 23 V 2004 – 1 ex., w odchodach konia, leg. A. BYK (coll. AB).

Aphodius luridus (Fabricius, 1775)

- Pojezierze Mazurskie: Kamionek Wielki ad Elbląg (DF01), 29 IV 2008 – 8 exx., w odchodach owiec, leg. B. BUJNIK (coll. BB).
- Puszcza Białowieńska: Białowieża ad Hajnówka (FD94), 6 VI 2000 – 12 exx., 22 V 2002 – 9 exx., w odchodach owiec, leg. A. BYK (coll. AB).

Aphodius merdarius (FABRICIUS, 1775)

- Pojezierze Mazurskie: Pozezdrze ad Węgorzewo (EE59), 7 V 2003 – 6 exx., w odchodach koni, leg. D. DOKTÓR (coll. DD).
- *Nizina Mazowiecka: Niebrzegów ad Dęblin (EC61), 27 IV 2008 – 2 exx., 1 V 2009 – 12 exx., w odchodach koni, leg. A. BYK (coll. AB).

Aphodius plagiatus (LINNAEUS, 1767)

- Pojezierze Mazurskie: Węgorzewo (EF40), 2 VI 2002 – 1 ex., w napływkach nad rzeką Węgorapa, leg. D. DOKTÓR (coll. DD).
- Podlasie: Mień ad Brańsk (FD14), 30 V 1993 – 2 exx., w napływkach nad rzeką Nurzec, leg. T. MOKRZYCKI (coll. TM); Drohiczyn (FD10), 17 V 2009 – 11 exx., w napływkach nad rzeką Bug, leg. A. BYK (coll. AB).

Chaetopteroptia segetum segetum (HERBST, 1783)

- Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 10 V 2009 – 12 exx., na kłosach zbóż, leg. A. BYK (coll. AB).

Diastictus vulneratus (STURM, 1805)

- Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 14 V 2004 – 3 exx., 8 VI 2009 – 7 exx., w piaszczystym dołku z butwiejącymi liśćmi topoli osiki, leg. A. BYK (coll. AB).

Gnorimus variabilis (LINNAEUS, 1758)

- Pojezierze Mazurskie: Sztynort ad Węgorzewo (EE49), 1–30 VI 2007 – 2 exx., 1–31 VII 2007 – 4 exx., w pułpki typu „Netocia” powieszono przed dziuplami na dębach, leg. A. BYK (coll. AB).
- *Nizina Mazowiecka: Ościstowo ad Ciechanów (DD65), 20 VII 2007 – 3 exx., na pniu ściętego klonu jesionolistnego ze zgnilizną brunatną, leg. M. POTYRAŁA (coll. AB).

Hoplia philanthus philanthus (FUESSLY, 1775)

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogalin ad Poznań (XT38), 1–8 VII 2007 – 12 exx., na kłosach zbóż, leg. A. BYK (coll. AB).
- *Nizina Mazowiecka: Puszcza Kozienicka: Przejazd ad Pionki (EC20), 2 VII 2006 – 1 ex., leg. M. BIDAS et M. MIŁKOWSKI (coll. MB).

- *Góry Świętokrzyskie: Podgórze ad Bodzentyn (DB94), 1–4 VII 2006 – 1 ex., na paprociach, leg. A. BYK (coll. AB).

Hoplia praticola DUFTSCHMID, 1805

- *Góry Świętokrzyskie: Podgórze ad Bodzentyn (DB94), 28 V 2006 – 1 ex., na kwiatach głogu, leg. J. BOROWSKI (coll. JB).

Omaloplia nigromarginata (HERBST, 1786)

- Wyżyna Małopolska: Pińczów ad Busko Zdrój (DA69), 25–30 VI 2011 – 29 exx., leg. T. MOKRZYCKI (coll. AB).
- Nizina Sandomierska: Rezerwat „Góry Pieprzowe” ad Sandomierz (EB51), 3 VII 2003 – dziesiątki osobników przysiadających na trawach, obs. A. BYK.

Onthophagus semicornis (PANZER, 1798)

- *Pojezierze Mazurskie: Zielony Ostrów ad Węgorzowo (EF31), 10 VII 2007 – 6 exx., na silnie nasłonecznionej murawie przy skraju lasu w odchodach zajęcy, leg. D. DOKTÓR (coll. DD, coll. AB).
- Wyżyna Lubelska: Kolonia Widniówka ad Krasnystaw (FB44), 4–5 IV 2007 – 10 exx., przy norach chomików, leg. P. KUCZYŃSKI (coll. AB).

Psammodytes asper (FABRICIUS, 1775)

- Pojezierze Mazurskie: Gładysze ad Młynary (DF20), 21–23 V 2009 – 7 exx., w starej piaskowni, w piaszczystym dołku z butwiejącymi liśćmi topoli osiki, leg. M. BYK, 23 VIII 2009 – 6 exx., leg. A. BYK (coll. AB).
- *Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 8 VI 2009 – 1 ex., w piaszczystym dołku z butwiejącymi liśćmi topoli osiki, leg. A. BYK (coll. AB).

Adam BYK, Katedra Ochr. Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa

582. Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodzin: Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae (Coleoptera)

New Polish records of some beetle species from the families: Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae (Coleoptera)

KEY WORDS: Scarabaeoidea, Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae, faunistic records, Poland.

Poniższe gatunki i stanowiska wyszczególnione zostały w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorze autora (AB) i kolekcjach: Jerzego BOROWSKIEGO (JB), Rafała CIEŚLAKA (RC), Daniela DOKTÓRA (DD). Wymienionym osobom za udostępnienie kolekcji autor serdecznie dziękuje. Nazwy krain, z których poszczególne gatunki nie były wcześniej wykazywane wyróżniono gwiazdką [*].

TROGIDAE

Trox cadaverinus ILLIGER, 1801

- *Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 11 X 2008 – 1 ex., w starej piaskowni, pod padliną, leg. J. BOROWSKI (coll. JB), 10 X 2010 – 2 exx., w starej piaskowni, w pułapkę ziemną z przynętą z wątroby wieprzowej, leg. J. BOROWSKI et A. BYK (coll. AB).

- *Podlasie: Budy Kupientyńskie ad Sokołów Podlaski (ED81), 26–29 V 2007 – 1 ex., leg. A. ŚLUSARCZUK (coll. JB); Mielnik ad Siemiatycze (FC39) 15–19 VII 2007 – 1 ex., nocą, na światło, leg. A. BYK (coll. AB).

Trox hispidus (PONTOPPIDAN, 1763)

- *Wyżyna Małopolska: Gutkowice ad Rawa Mazowiecka (DC33), 10 V 2009 – 2 exx., w starej piaskowni, pod padliną, leg. A. BYK (coll. AB).

Trox scaber (LINNAEUS, 1767)

- Pojezierze Mazurskie: Czarne ad Orzysz (EE66), 1–31 V 2001 – 1 ex., w pułapkę typu „Netocia” powieszoną przed dziuplą na dębie, leg. D. DOKTÓR (coll. DD); Gładysze ad Młynary (DF20), 1–31 VII 2003 – 1 ex., w pułapkę typu „Netocia” powieszoną przed dziuplą na dębie, leg. S. BYK (coll. AB); Sztynort ad Węgorzewo (EE49), 2 VII 2007 – 1 ex., przy dziupli dębowej, leg. D. DOKTÓR (coll. AB); Godkowo ad Pasłek (DE29), 28–29 VII 2009 – 2 exx., w starej piaskowni, pod padliną, leg. M. BYK (coll. AB).

GEOTRUPIDAE

Geotrupes mutator (MARSHAM, 1802)

- Pojezierze Mazurskie: Majdan ad Ruciane Nida (EE34), 21 VIII 2002 – 4 exx., w odchodach koni, leg. D. DOKTÓR (coll. DD); Kałki ad Węgorzewo (EF31), 1–2 VII 2007 – 2 exx., w odchodach krów, leg. D. DOKTÓR (coll. DD).
- Nizina Mazowiecka: Niebrzegów ad Dęblin (EC61), 1 V 2009 – 6 exx., w odchodach koni, leg. A. BYK (coll. AB).
- Puszcza Białowieża: Białowieża ad Hajnówka (FD94), 25 V 2002 – 2 exx., w odchodach koni, leg. A. BYK (coll. AB).
- Wyżyna Lubelska: Białka ad Milejów (FB37), 16 X 2005 – 7 exx., w odchodach krów, leg. R. CIEŚLAK (coll. RC).

OCHODAEIDAE

Ochodaeus chrysoloides (SCHRANK, 1781)

- *Podlasie: Mielnik ad Siemiatycze (FC39), 15–19 VII 2007 – 2 exx., nocą, na światło, obs. A. BYK.

Adam BYK, Katedra Ochr. Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa

583. Nowe stanowisko *Reesa vespulae* (MILLIRON, 1939) (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce

New locality of *Reesa vespulae* (MILLIRON, 1939) (Coleoptera: Dermestidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Dermestidae, *Reesa vespulae*, S Poland.

Reesa vespulae (MILL.), to gatunek chrząszcza z rodziny skórnikowatych, obecnie szeroko rozprzestrzeniony na świecie wskutek zawlekania z muzealnymi materiałami biologicznymi i produktami rolnymi. W Europie pojawił się prawdopodobnie pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W Polsce stwierdzony po raz pierwszy w Poznaniu, w roku 2006 (BUNALSKI, PRZEWOŻNY 2009: Pol. Journ. Ent., **78**: 341-345), a w latach 2008–2010 wyka-