

OBJAŚNIENIA DO TABL. II. i III.  
[ERKLÄRUNGEN ZU DEN TAB. II. u. III.]

Tabl. II.

Wielkość naturalna. Natürliche Grösse.

1 var. *tuberculatus* Dej. (Lwów). 2 forma podolska przejściowa do ras pontyjskich. — Podolische Übergangsform zur pontischen Rassengruppe (Zaleszczyki). 3 var. *gracilis* Kolbe (Łańcut). 4 var. *pseudoscythicus* Lap. (Czarnohora). 5 var. *ungensis* Csiki (Turze). 6 var. *wankae* Sok. (Sucha ad Żywiec). 7 var. *laticus* Kolbe (Zakopane). Zdjęcia wykonał dr. F. Stroński.

Tabl. III.

Rozmieszczenie geograficzne ras w Polsce. Znaczenie liczb jak w tab. II.  
Geographische Verbreitung der Rassen in Polen. Bedeutung der Zahlen, wie in Tab. II.

DWIE RZADKIE ABERACJE MOTYLI Z RODZAJU  
*ARGYNNIS* F.

[ZWEI SELTENE ABERRATIONEN AUS DER GATTUNG *ARGYNNIS* F.]

PODAL

A. STÖCKL

Odnosnie do mojej notatki w Polskiem Piśmie Entomologicznem (T. I. z. 2, poz. 23), w której wspomniałem bez nadawania nazwy o aberacji *Argynnis paphia* L., złapanej w Brzuchowicach przy stacji kolejowej w połowie lipca, dodać tu muszę, że aberacja ta, jak przekonałem się z świeżo otrzymanej pracy: L. v. Aigner Abafi — Schmetterlings-Aberrationen aus der Sammlung des Ungarischen National-Museums (Annales Musei Nationalis Hungarici IV. 1906), ma nazwę ab. *nigricans* Cosm. Muzeum to posiada kilka okazów tej aberacji — samców i samic, u których skrzydła w mniejszym lub większym stopniu są zaciemnione. Mój okaz jest najpodobniejszy do egzemplarza trzeciego, w pow. pracy opisanego (l. c. pag. 511); różni się od niego tem, że brunatne plamy brzeżne na wierzchu skrzydeł nie są trójkątne lecz owalne i szczególnie na tylnych skrzydłach wyraźne; na spodzie skrzydeł tylnych brak zupełnie smugi srebrzystej środkowej; na samym brzegu ciemniejsza przepaska; zresztą brzeg szarosrebrzysty z domieszką barwy fioletowawej.