

Fizjograficznej Akademji Umiejęt. jako członek tejże Komisji pod tytułem: „Spis motyli zebranych w powiecie Stryjskim“ Tom 42 (1908)

To samo część	II	Tom 44	(1910)
”	”	III	” 45 (1911)
”	”	IV	” 46 (1912)
”	”	V	” 47 (1913)

W roku 1913 odkrywa nowy, dotąd nieznan gatunek rodzaju *Xystophora* nazwany na Jego cześć *Brunickii* Rbl.; również noszą inne jeszcze motyle nazwisko Jego, jak *Satyrus dryas* ab. *Brunickii* Schille, *Plusia zosimi* ab. *Brunickii* Klem.

Również gruntownie jak nad fauną motyli, pracował nad fauną ptaków okolic Stryja i rezultaty złożył również w Sprawozdaniach Komisji Fizjograficznej Akad. Umiejęt. w Krakowie, opisując w Tom. 23 w r. 1889 „Ptaki spostrzegane w okolicy Stryja“.

Polska nauka traci w nim badacza i znawcę wytrawnego, sumiennego i nieustrudzonego pracownika.

Niech mu ziemia będzie lekka.

F. Sch.

Rzadkie i aberatywne motyle mego zbioru

[Seltene und aberrative Lepidopteren meiner Sammlung]

Podał

FRYDERYK SCHILLE, Podhorce obok Stryja.

Wojna światowa pozbawiła mnie już w jej początkach a mianowicie w roku 1914 i 1915 mego z ogromnym wysiłkiem pracy z różnych okolic Małopolski zestawionego zbioru motyli a, że uważałem okolicę Strzałkowa, w której i przed wojną przebywałem, za niedość zbadaną, wziąłem się, wróciwszy w r. 1916 po ucieczce na swoją siedzibę, na nowo do pracy kolektorskiej i doszedłem dziś już, nie żałując natężenia tak duchowego jak i fizycznego, do dość już okazałego nowego zbioru, z którego dziś podaje tylko motyle rzadkie i aberacje różnych gatunków.

Co do kolekcjonowania samego używałem w szczególności lampy acetylenowej, korzystając z każdego możliwie sprzyjającego wieczoru, brałem śmy na przynętę z jabłek preparowanych i energicznie oddałem się hodowli gąsienic, co też doskonale dało rezultaty.

Dla orientacji nadmieniam:

Liczby przed gatunkami motyli umieszczone, są to liczby katalogu Staudingera i Rebla; gwiazdka oznacza gatunek dla fauny Polski nowy, daty są oznaczone liczbami, to jest dniami arabskimi, miesiące rzymskimi; za nimi liczby stojące oznaczają rok połowu, np. 6. VII. 17 znaczy 6 lipca 1917 r.

Motyle tu podane pochodzą w przeważnej części z okolic Strzałkowa, Podhorzec, Żotatnik i Bereźnicy, nieco ze starego mego zbioru ze Sołotwiny, Rytra i Żurawna.

MACROLEPIDOPTERA.

38. *Aporia crataegi* L. trans. ab. *alepica* Cosmov. Żotatniki, u osobnika tego tylko skrzydła przednie zupełnie przezroczyste, gdy właściwa ab. ma przednie i tylne skrzydła przezroczyste.
45. *Pieris brassicae* L. gen. vern. *chariclea* Stph. Strzałków, 22. IV. 18 ex l.; 21. V. 18, 2 okazy; 1. V. 18, 1 okaz; 18. IV. 18 ex p.
48. *Pieris rapae* L. ab. *flavescens* Röber, Strzałków, 25. III. 29 ex l.; 29. VII., 18. VIII. Japane.
52. *Pieris napi* L. gen. aest. *napacae* Esp. Nowy Targ 23. VII.; ab. *impunctata* Röber. Nowy Targ 29. IV.; Strzałków 19. IV. ex p., 20. IV. 20, 19. IV. 18, 2 okazy.
- * 131. *Apatura iris* L. ab. *romaniszyni* Schille ab. nov. Strzałków 3. VII. 12. Aberację tę opisałem w „Entomologische Zeitschrift Frankfurt a/M. Nr. 49 z 7. III. 1914. nie nazwawszy jej wówczas, co czynię dziś ku czci znanego i zasłużonego lepidopterologa pana Jana Romaniszyna. Aberacja ta jest co do nakreśleń zupełnie normalna; plamy i wstęgi na skrzydłach są białe; lecz wygląd jej jest od wyglądu osobników typowych zgoła różny, gdyż skrzydła we wszystkich możliwych pozycjach przepięknie fioletowo-niebiesko się połyskują. Co do ubarwienia samego to skrzydła przednie odpowiadają ubarwieniu osobników typowych, zaś na skrzydłach tylnych przechodzi owo fioletowo-niebieskie ubarwienie przez oczko skrzydła aż do kąta tylnego i sięga od żeberka II aż do IV₂ do brzegu zewnętrznego. Ów czarnobrunatny ton zasadniczego ubarwienia osobników typowych, który widzimy wtedy, kiedy jedna strona skrzydeł niebiesko się lśni, jest wtedy tylko widzialny, kiedy patrzymy na tego motyla pod bardzo ostrym kątem, i tu jeszcze ton niebieski przoduje.

131. *Apatura iris* ab. *jole* Schiff. Strzałków 10. VII. 23. ex l. gąsienica na iwic (*Salix capraea*).
132. *Apatura ilia* Schiff. ab. (et. v.) *clytie* Schiff. Od końca VI. do VII. w całej okolicy nierzadki; — ab. (et. v.) *eos* Ross. 1 okaz. Łotatniki w lipcu — odmiana rzadko spotykana.
136. *Limenitis populi* v. *bucowinensis* Horms. ♀ Strzałków las 12. VI. 20, znana też z Poznańskiego (Vide Dr. K. F. Wize, Zapiski Muzealne zeszyt II. i III. 1917 i 1918 Poznań); — ab. *diluta* Spuler. ♂ Łotatniki 14. VI. 23.
152. *Pyrameis atalanta* L. ab. *fracta* Tutt. Strzałków 24. VI. 16; 14. IX. 19; 30. VI. 20; 9. VII. 20. ex l.
156. *Vanessa jo* L. ab. *dyophtalmica* Garb. Strzałków 4. X. 20. 1 okaz złapany; 19. VIII. 17. 4 okazy ex l.; — trans. ad ab. *fischeri* Stfs. Strzałków 19. VIII. 17. 1 okaz ex l.

Sztucznie wyhodowane, poczwarki mrożone:

- Vanessa jo* L. ab. *exoculata* Weym. Strzałków 5. i 6. VII. 1920, ex l.; — ab. *jocaste* Urich. Strzałków 6. VII. 1920 ex l.; — ab. *belisaria* Oberth. Strzałków 5. i 6. VII. 1920 kilka okazów.
160. *Vanessa xanthomelas* Esp. Łotatniki ex p. 7. VII. 23. gatunek bardzo rzadki.
169. *Araschnia levana* ab. *porima* O. Strzałków ex l. w VII. kilka okazów; — ab. *intermedia* Stich. Strzałków ex l. w VII.; — gen. aest. *prorsa* L. Strzałków ex l. w VII.; — ab. *obscura* Fentor. 15., 19. i 20. VII. łapane; — ab. *schantzi* Pfitzner, Strzałków ex l. w VII.
180. *Melitaea phoebe* Knoch. ab. *minor* Frey. Łotatniki 9. VII., 2. VI. 17.
- * 191. *M. athalia* Rott. ab. *latefasciata* Fixs. Strzałków 21. VI. 22. Aberacja z przepaską na skrzydłach tylnych ze spodu, znacznie rozszerzoną, białawą; ubarwienie to przebija na wierzch skrzydła, rozjaśnia go przy brzegu tylnym prawie na całą szerokość. Osobniki do grupy *latefasciata* należące są według opisu Seitz'a największe z gatunku *athalia*, co o mej ab. powiedzieć nie można, gdyż okaz jest dość mały, jednak z całego wyglądu bezsprzecznie do grupy *latefasciata* należy.
- * 202. *Argynnis aphaepe* Hb. ab. *tricularis* Hb. 6. VI. 17. w lesie Strzałkowskim. Forma opisana w Seitz'u z okolic Nikolaewska ze wsch. Syberji; mój okaz tak dokładnie zgadza

- się z opisem, że nie waham się formę moją pod tą nazwą podać.
210. *Argynnis pales* Schiff. ab. *arsilache* Esp. Janów koło Lwowa 25. VI. 13. 2 okazy.
230. *A. aglaja* L. ab. *suffusa* Tutt. Strzałków 25. VII. 17.
246. *Melanagria galathea* L. ab. *electra* Meig. Łotatniki 28. VII. 16.; 25. VII.
- * 402. *Epinephele jurtina* ab. *testacea* Schille, złapana 26. VII. 18. Strzałków. Opisałem w „Zeitschrift des österreich. Entomol. Vereines. 7. Jahrgang N. 5/6. S. 19.“ Wien 1/X. 1922. Skrzydła w rozpiętości 41 mm., a więc znacznie mniejsze niż u okazów typowych; ubarwienie skrzydeł przednich czekoladowo gniade, w górnej części koło komórki discoidalnej ku oczku, które prawie niewidoczne, są skrzydła białe żółto (schalgelb) rozjaśnione; rozjaśnienie przechodzi ku brzegowi tylnemu w barwę zasadniczą skrzydła, łącząc się z takową; plama czarnogniada tu się znajdująca, tak zwana Duffleck przesłicznie na tem tle odbija. Spód skrzydeł przednich brudno ochrowy z szerokim szarogniadem obramieniem; oczka dobrze zaznaczone jasno centrowane. Z ubarwienia zasadniczego skrzydeł tylnych pozostała tylko szeroka obwódka, skrzydła są jaśniejsze od skrzydeł przednich i rozjaśnienie to rozchodzi się po całym skrzydle, tak że użytkowanie doskonale widać, żeberka z wyjątkiem III₂ są zgrubiałe, gniado ubarwione, spód tychże szarobiały, a w środku między żeberkiem IV₁ i IV₂ ciemno gniady punkt, ochrowo-żółto obramiony. Do grupy ab. *cinerascens* Fuchs nie można mojej aberacji zaliczać, gdyż na niej nic popielato szarego niema.
427. *Coenonympha iphis* Schiff. v. *carpathica* Hormus. Łotatniki 26. VI.
446. *C. tiphon* Rott. trans. ad ab. *philoxenus* Esp. Bereźnica 18. VII.
464. *Thecla ilicis* Esp. ab. *cerri* Hb. Żurawno 3. VIII. 2 okazy.
476. *Callophrys rubi* L. ab. *bipunctata* Tutt. Łotatniki.
512. *Chrysophanus phlaeas* L. ab. *coeruleopunctata* Stgr. Łotatniki 11. VIII.; Bereźnica 29. VII.; Strzałków 10. VI.
513. *Ch. dorilis* Hufn. forma *brantsi* ♀ Ter Haar, Strzałków 10. VIII. 22. las.

514. *Ch. amphidamas* Esp. gen. aest. *obscura* Rühl. Strzałków na łąkach podmokłych 26. VII. 18. nie rzadki.
563. *Lycæna optilete* Knoch, forma *cyparissus* Hb. Rzęsna Polska 30. VI. 18.
604. *L. icarus* Rott. ab. *coerulescens* Wheel. Łotatniki 4. VI. 20.; Strzałków 9. VI.; Bereźnica 31. VII. — *L. ic.* ab. *fusca-coerulescens* Gillm. Wheel. Łotatniki 14. VI. 22. nazwa złożona, gdyż w odmianie tej cechy dwóch aberacji się połączyły. *L. ic.* ab. *amethystina* Gillm. Żurawno 15. VI.
650. *Cyaniris argiolus* L. Strzałków las 10. V. 19.; Łotatniki 1. VI. *C. arg.* ab. *argalus* Brgstr. Łotatniki 26. VI. — *C. arg.* ab. *thersanon* Brgstr. Strzałków 9. VI.
775. *Smerinthus populi* L. ab. *griseo-diluta* Gillm. Strzałków 2. VI. 19. Łotatniki 2 okazy. — *Sm. p.* ab. *rufo-diluta* Gillm. Rytro ex l. 4. II.
730. *Dilina liliae* L. ab. *transversa-brunescens* Tutt. Rytro ex l. 30. V. *D. t.* ab. *transversa-pallida* Tutt. Rytro. 6. III. 92. ex l.; 4. II. 89. ex l., Nowy Targ łąpany. — *D. t.* ab. *bipuncta-pallida* Clark. Tutt. Rytro. 25. II. 91. ex o.; 2. VII. 88. ex l.
765. *Pterogon proserpina* Pall. Rytro na kwitnących goździkach: *Lychnis viscaria* w zmroku i na kwitnącej *Syringa* kilka okazów 4. i 6. VI. 02. i 05: lokalny i rzadki.
771. *Hemaris fuciformis* L. Rytro. 29. VI. 05; 1. VI. 05.; forma rzadka.
774. *H. scabiosae* Z. (*tilyus* L., *bombyliformis* Esp.) Rytro. 11. VI. 94.; również forma bardzo rzadka.
835. *Leucodonta bicoloria* Schiff. Strzałków 2. VI. 17.; 27. VI. 21.; rzadka, lokalna.
837. *Ochrostigma melagona* Bkh. Łotatniki; bardzo rzadka.
839. *Odontosia sieversi* Men. Bereźnica, 7. IV. 17. 5 okazów z brzoź strzepanych; Strzałków ex o. 27. II. i 28. II. 18.; gatunek rzadki.
866. *Orgyia antiqua* L. ab. *dilutior* Schultz. Rytro. 5. VIII. 03; *O. a.* ab. *infernalis* Rbl. Strzałków ex l. 24. i 27. IX. 23.; gąsienice na dębie.
908. *Dasychira pudibunda* L. ab. *juglandis* Hb. ♂ Strzałków ex o. w maju 1923. r. Kilkanaście okazów. Aberacja wybitnie różniąca się od gatunku typowego; opis vide Seitz tom II. p. 114.

913. *Euproctis chrysoorrhoea* L. ab. *punctella* Strand. Strzałków 15. VII. 18; lampa acetylenowa.
919. *Porthesia similis* Fuessl. ab. *auriflua* Hb. Strzałków lampa, 25. VII. 17.
931. *Lymantria monacha* L. trans. ad ab. *eremita*. Strzałków lampa 26. VII. 13.
970. *Lasiocampa quercus* L. ab. *basipuncta* Tutt. Rytro ex l. *L. q.* trans. ad ab. *sparti* Hb. Rytro ex l. det. Rebel.
990. *Cosmotriche potatoria* L. ab. *berolinensis* Heyne. Strzałków, 22. VII. 17. lampa.
999. *Gastropacha populifolia* Esp. Strzałków lampa 18. VII. 17.; gatunek rzadki. ♀
1014. *Endromis versicolora* L. ab. *clara* Tutt. Strzałków, 8. IV. 22.; z brzoź trzepana.
1020. *Lemonia dumi* L. Strzałków ogród, 15. X. 18, forma ta bardzo rzadka.
1091. *Acronycta cuspis* Hb. Strzałków ex l. 13. VI. 19, jedna z najrzadszych Acronyctów.
1127. *Agrotis fimbria* L. ab. *virescens* Tutt. Strzałków ex l. 25. VI. 20.
- *1136. *Agrotis augur* F. ab. *conjuncta* Schille ab. n. Strzałków do lampy, 15. VII. 18. Plamka krążkowa z pierwszą przepaską połączona, podługowata, od brzegu ramiennego równo ścięta, gniado centrownie wypełniona, plamka nerkowa ciemno gniado wypełniona; z jej środka wychodzi równobieżnie z brzegiem ramiennym gruba czarna kresa, która dosięga drugiej przepaski i w miejscu największej wypukłości teje z nią się łączy. Wszystko inne jak u formy typowej.
1152. *Agrotis pronuba* L. ab. *brunnea* Tutt. Strzałków 2. VIII.
1203. *Agrotis dahlii* Hb. Łotatniki 4. VIII. 18., ćma bardzo rzadka.
1400. *A. segetum* Schiff. ab. *nigricornis* Vill. Strzałków przynęta 18. IX. 17. — *A. s.* ab. *leucostigma* Esp. Strzałków 19. VII. 17. i 24. VII. 18. — *A. s.* ab. *subatratus* Haw. Strzałków przynęta 29. VIII. 18, licznie.
1438. *Chareas graminis* L. ab. *tricuspis* Esp. i ab. *albipuncta* Lampa, 9. II. i 13. VIII. 17; Strzałków lampa.
1439. *Epineuronia popularis* F. v. (et ab.) *hilaris* Stgr. Strzałków lampa 24. VIII. 17., 29. VIII. 18, 2 okazy.

1467. *Mamestra dissimilis* Knoch. ab. *laeta* Reuter. Strzałków przynęta w sierpniu 1917, 7 okazów.
1487. *Mamestra dentina* Esp. ab. *ochrea* Tutt. Strzałków przynęta 9. VIII. 17. — *M. d.* ab. *hilaris* Zett. Strzałków 13. VI. i 13. VIII. 17.
1547. *Dianthoecia nana* Rott. ab. *fasciata* Tutt. Strzałków lampa, 12. VI. 17.
1580. *Bryophila fraudatricula* Hb. Strzałków 4. VII. 18. lampa.
1706. *Hadena rurea* F. ab. *alopecurus* Esp. Strzałków 19. VI. 17.
1709. *H. scolopacina* Esp. ab. *hammoniensis* Sauber. Strzałków lampa, 15. VII. 23, 20. VII. 23.
1715. *H. secalis* L. ab. *oculea* Guen. Strzałków przynęta, 14. VIII. 22., Łotatniki 24. VIII. 18. — *H. s.* ab. *nictitans* Esp. Strzałków 19. VII. 17., 8. VI. 17., 13. VIII. 18., lampa. — *H. s.* ab. *reticulata* Tutt. Strzałków 7. VI. 17.
1870. *Mania maura* L. ab. *striata* Tutt. Rytro przynęta. 15. VII. 2 okazy.
1876. *Helotropha leucostigma* Hb. ab. *lunina* Hw. i ab. *albipuncta* Tutt. Strzałków 8. i 13. VIII. po kilka okazów do lampy. Gatunek lokalny i rzadki.
1877. *Hydroecia nictitans* Bkh. ab. *erythrostroma* Stw. Strzałków lampa, 25. VII. 17. 2 okazy.
1893. *Nonagria sparganii* Esp. Strzałków 22. VII. 17., 8. VIII. 17., 29. VIII. 18, lampa, ćma rzadka.
1894. *Nonagria typhae* Thnbg. Strzałków, 24. VIII. 17. lampa, również ćma bardzo rzadka.
- *1928. *Calamia lutosa* Hb. ab. *rufovenosa* Schille. Strzałków, 19. IX. 17., lampa, 6 okazów, odmianę tę opisałem w „Zeitschrift für wissenschaftliche Insekten-Biologie 1918. p. 120.
- *2034. *Petillampa arcuosa* Hw. Strzałków lampa 8. VIII. 17., rzadkość pierwszorzędną, ćma znana dotychczas tylko z Brytanii, Danji, Francji, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
2035. *Acosmetia caliginosa* Hb. Łotatniki 2. VI. 17., Żurawno 1. VI. 08, również rzadkość pierwszorzędną.
2067. *Taeniocampa populi* F. ab. *atropunctata* Geest. Bereźnica, 14. IV. 17. z dębów trzepana. Vide Berge-Rebel p. 238.
2070. *T. incerta* Hufn. ab. *fusca* Haw. Strzałków do lampy w domu, 22. IV. 20.

2087. *Calymnia pyralina* View. ab. *corusca* Esp. Strzałków 1. VI. 20. ex l.
2098. *C. trapezina* L. ab. *rufa* Tutt. Strzałków, 7. VII. ex l. — *C. t.* ab. *ochrea* Tutt. Strzałków, 30. VI. ex l., 20. VI. ex l.; gąsienice na iwic (*Salix caprea*) i *Evonymus*.
2124. *Orthosia circellaris* Hufn. ab. *ferruginea* Esp. Strzałków, 17. X. 20.
2143. *Xanthia citrago* L. ab. *aurantiago* Tutt. Strzałków, 25. VIII. 21.
2164. *Orrhodia vaccini* L. ab. *mixta* Stgr. Strzałków przynęta, 11. X. 17.
2173. *Xylina furcifera* Hufn. Strzałków, 4. X. 18. bardzo rzadka.
2174. *Xylina ingrca* HS. Bereźnica, 7. IV. również rzadka.
2358. *Pyrrhia umbra* Hufn. ab. *marginata* F. Strzałków, 18. VII. 17.
- *2453. *Erastria argentula* Hb. ab. *nowickii* Schille. Strzałków, 2. VII. 23. Opisana w „Polskiem Piśmie Etnomologicznem T II. Zeszyt 3. 1923.
2464. *E. fasciana* L. ab. *albilinea* Haw. Strzałków 25. VI. 17. lampa.
2512. *Telesilla amethystina* Hb. Strzałków, lampa 20. VI. 17., rzadkość pierwszorzędna.
2531. *Plusia modesta* Hb. Strzałków, lampa 11. VIII. 17, rzadka.
2539. *Plusia chrysitis* L. ab. *juncta* Tutt. Strzałków w VII. i VIII., dość częsta. — *P. chr.* ab. *scintillans* Schultz. Strzałków do lampy, w VIII.
2586. *Euclidia mi* L. ab. *illuminata* Warren. Strzałków 16. V., Łotatniki 1. VI.
2667. *Catocala fraxini* L. ab. *moerens* Fuchs. Sołotwina, przynęta 3. IX. 1884. r.
2682. *C. sponsa* L. ab. *fasciata* Spuler. Strzałków 2. VIII. 22. i 24. VII. 22.
2756. *Epizeuxis calvaria* F. Sołotwina na przynętę 7. VI, óma bardzo rzadka.
2795. *Herminia cribrumalis* Hb. Strzałków, lampa 25. VI. 17., rzadka óma.
2819. *Hypena rostralis* L. ab. *radiatalis* Hb. Strzałków 21. X. 23. w domu. — *H. r.* ab. *unicolor* Tutt. 8. IX. i 21. X. Strzałków w domu.
2854. *Brephos parthenias* L. ab. *indigena* Lambill. Strzałków 28. III. 16., z brzóz trzepana.

2856. *B. notha* Hb. Strzałków 8. IV. 22.; Bereźnica 7. IV. 16. i 21. III. 22.; gatunek od *parthenias* daleko rzadszy.
2860. *Pseudoterpna pruinata* Hufn. ab. (et v.) *agrestaria* Dup. Łotatniki rzadka.
3020. *Acidalia herbariata* F. ab. *aestiva* Fuchs. Stryj 2. X. 20.
3115. *Ephyra punctaria* L. ab. *naevata* Bastlbg. Strzałków ex l. 24. IV. 21., 13. VII. 21., 2. VIII. 20.; pojawia się w dwóch pokoleniach.
3147. *Lythria purpuraria* L. ab. *conjunctiva* Prout. Żurawno 28. VIII. 08., Łotatniki 19. VI. 11.
3183. *Minoa murinata* Sc. ab. *cineraria* Stgr. Strzałków 4. V. 18. *M. m.* ab. *amylaria* Lah. Strzałków, 23. VIII. 18.
3241. *Lobophora carpinata* Bkh. ab. *fasciata* Prout. Nowy Targ 7. IV., 2 okazy. — *L. c.* ab. *unifasciata* Rbl. Strzałków 21. IV. 17.
3243. *L. halterata* Hufn. ab. *zonata* Thnbg. Podhorce 20. IV. 16.
3246. *L. viretata* Hb. Strzałków 15. i 24. V. 22, las; rzadkość pierwszorzędna, lokalna w Europie środkowej.
3291. *Lygris prunata* L. ab. *constricta* Strand. Podhorce 25. VII. 1911 r.
3300. *Larentia dotata* L. ab. *deleta* Strand. Strzałków 12. VII. 17.
3305. *L. bicolorata* Hufn. ab. *parvula* Ratz. Strzałków 11. VII.
3306. *Larentia variata* Schiff. ab. *nigrofasciata* Gmpbg. Bereźnica, 31. V. 18.
3363. *L. montanata* Schiff. v. (et ab.) *fuscomarginata* Stgr. Bereźnica 31. V. 17. — *L. m.* ab. *degenerata* Prout. Strzałków w V. i VI., do VII. Bereźnica.
3380. *L. dilutata* Sc. ab. *obscurata* Stgr. Strzałków, 16. X. 20., z brzoź trzepana.
3449. *L. tristata* L. ab. *interrupta* Rbl. Strzałków 7. V. i 30. V. 21.
3455. *L. affinitata* Stph. v. (et ab.) *turbaria* Stph. Strzałków, 26. V. 22.
3465. *L. albulata* Schiff. ab. *hebodium* Weier. Strzałków lampa, 12. VI. 16.
3481. *L. bilineata* L. ab. *infuscata* Gmpbg. Strzałków, Podhorce, Bereźnica, Łotatniki, w VI. i VII. nie rzadka.
3485. *L. sordidata* F. ab. *fusco-undata* Don. Strzałków ex l. 20—27. VI. 17. — *L. s.* ab. (et v.) *infuscata* Stgr. Strzałków ex l. 9. i 25. VI. 17.
3489. *L. silaceata* Hb. ab. *insulata* Hw. Strzałków 12. VI. 17.
3491. *L. corylata* Thnbg. ab. *ruptata* Hb. Strzałków 14. VI. 17.

3535. *Tephroclystia pusillata* F. ab. *piceata* Prout. Bereźnica, 12., 17., 27. V. 22.
- * 3591. *T. veratraria* HS. ab. *prüfferi* Schille. Mniejsza od formy typowej, zupełnie bez nakreśleń, jednakże z czarnym punktem dyskalknym; w kącie tylnym skrzydeł przednich ledwo dostrzegalna biała plamka; ubarwienie skrzydeł formy typowej jasno oliwkowo-szare. Ex l. 19. VI. 22. z *Veratrum album*; ku czci pana Dra Jana Prüffera prof. Uniwersytetu w Wilnie nazwana.
3595. *T. satyrata* Hb. ab. *transversata* Dietz. Strzałków ex l. 12. V. 21, i 14. V. 22.
3660. *Chloroclystis rectangulata* L. ab. *nigrosericeata* Haw. Strzałków ex l. 20. V. 20. ex *Prunus padus* i 7. VI. 21. łapana.
3700. *Abraxas marginata* L. ab. *pollutaria* Hb. Strzałków i Bereźnica w V., VI. i VII.
3726. *Ennomos quercinaria* Hufn. ab. *carpinaria* Hb. Strzałków ex p. 10. IX. 18.
3728. *E. fuscantaria* Hw. Rytro. 25. II. 05., bardzo rzadka.
3730. *E. erosaria* Hb. ab. *unicoloria* Esp. Rytro 2. IX. 88. i 1. VII. 89.
3733. *Selenia bilunaria* Esp. gen. aest. *juliaria* Hw. Rytro ex l. 20. VII. 91. — *S. b.* ab. *deumbraria* Klem. Rytro ex l. 16. I. 89.
3734. *S. lunaria* Schiff. ab. *delunaria* Hb. Rytro przynęta 30. VII. 86., ex l. 12. VII. 89. i 28. VII. 91., Strzałków lampa 20. VII. 17., Łotatniki.
3735. *S. tetralunaria* Hufn. gen. aest. *aestiva* Stgr. Rytro i Strzałków w VII. ex l. i do lampy.
- * 3743. *Gonodontis bidentata* Cl. ab. *edentula* Krulik. Rytro 22. V. 95. — *G. b.* ab. *nigra* Prout. Strzałków 25. VI. 17. lampa. — *G. b.* ab. *trapezoides* Schille. ab. nov. Skrzydła jednostajnie gniadoszare, ciemniejsze niż u for. typowej; przepaski bardzo słabo znaczone, białawo obrzeżone na brzegu tylnym, daleko od siebie oddalone, pierwsza na żeberku środkowym mocno złamana i odtąd z drugą przepaską równolegle ku brzegowi tylnemu bieżąca; u formy typowej mocno zbieżnie idące (convergierend).
- * 3749. *Crocallis elinguaris* L. ab. *trapezaria* B. Gen. Rytro 24. VII. ex l., Nowy Targ 23. VII. — *Cr. e.* ab. *juncta* Schille. Łotatniki 18. VII. 17.; opisana przezemnie w „Zeitschrift für wissenschaft. Insekten-Biologie“ 1918 p. 121.

3754. *Angerona prunaria* L. ab. *sordata* Fuessl. Rytro i Strzałków ex l. VI i VII często.
3765. *Epione advenaria* Hb. ab. *fulva* Gilmer. Rytro 9. VI. 93.
3769. *Hypoplectis adpersaria* Hb. ab. *pallidaria* Lambill. Strzałków ex o. 10. IV. 18. — *H. a.* ab. *irroraria* Prout. Strzałków ex o. 1, 14, 29. IV. — *H. a.* ab. *sylvania* HS. Strzałków 14. VII. ex l., 22. VII. 27.
3771. *Caustoloma flavicaria* Hb. Żurawno 5. VIII. 07 rzadkość pierwszorzędna, lokalna w Europie połudn.
3802. *Hybernia defoliaria* Cl. ab. *obscura* Helfer. Strzałków ex l. 19. X. — *H. d.* ab. *brunescens* Rbl. Strzałków ex l. 26. X. *H. d.* ab. *holmgreni* Lampa. Rytro ex l. 23. X.
3807. *Anisopteryx aceraria* Schiff. Strzałków 15. IV. 22 i 10. XI. 17 z jaworów strzepany, bardzo rzadki.
3814. *Biston hispidaria* F. Bercznica 17. IV. 16 bardzo rzadki.
3825. *B. hirtaria* Cl. ab. *congeneraria* Hb. (*duplicaria* Stgr.) Bercznica 7. IV i 10. IV. 17, z brzoź strzepany.
3891. *Boarmia repandata* L. ab (et v.) *conversaria* Hb. Rytro lampa 19. VII. 03. — *B. maculata* Stgr. (K. N. 3891 b) var. *bastelbergeri* Hirschke, Rytro w VII i VIII. ex l. i do lampy kilka okazów; gąsienica na paklonie *Acer campestre* w VI.
3894. *Boarmia roboraria* Schiff. ab. et v. *infusata* Stgr. Rytro, Strzałków ex l. i do lampy dość często, ex o. VI, VII i VIII.
3903. *B. crepuscularia* Hb. ab. *defessaria* Frr. Rytro, Strzałków w III i VII.
3904. *B. bistortata* Goeze ab. *fasciata* Petersen. Strzałków 12. VII.
3908. *B. luridata* Bkh. ab. *cornelseni* Hoffm. Strzałków 27. VI. 21 bardzo rzadka.
4000. *Ematurga atomaria* L. ab. *ustaria* Fuchs. Rytro 8. VIII. 99 i 21. V. 1900. — *E. a.* ab. *unicoloraria* Stgr. Żurawno 28 i 29 VII. 08.
4018. *Thamnonoma brunneata* Thnbg. Rytro 31. VII. na górze Radziejowej 1200 m; rzadkość.
4037. *Eubolia arenaccaria* Hb. Rytro 15. VI. 93; rzadkość pierwszorzędna.
4126. *Sarrothrips revayana* Sc. ab. *degenerana* Hb. Rytro, 12. VIII. 99. — *S. r.* ab. *ilicana* F. Rytro, 3. VIII. 91. — *S. r.* ab. *ramosana* Hb. Żurawno 1. X. 07 ex l. — *S. r.* ab. *undulana* Hb.

- Nowy Targ 7. IV.; Żurawno 28. IV i 1. X.; Rytro 9. VII i 13. IV. — *S. r. ab. obscurana* Warren. Żurawno 3. X.
4177. *Parasemia plantaginis* L. ab. *hospita* Schiff. Łotatniki 7. VI. *P. p. ab. bicolor* Rätz. Strzałków w VI. — *P. p. ab. borusia* Schaw. Strzałków w VI. — *P. p. ab. elegans* Rätz. Strzałków, Łotatniki w VI. przez cały miesiąc. — *P. p. ab. nigrociliata* Schaw. Łotatniki, Strzałków przez cały miesiąc VI.
4186. *Diacrisia sanio* L. ab. *pallida* Stgr. Strzałków, 10. VI.
4201. *Arctia caja* L. ab. *confluens* Rebl. Strzałków 18. VII. 20 w ogrodzie znaleziona.
4241. *Pericalia matronula* L. trans. ad ab. *haliciaca* Schill. Strzałków 14. VI. 22. las.
4327. *Zygaena scabiosae* Schaw trans. ad ab. *divisa* Stgr. Łotatniki 3 i 10. VII. 18. 3 okazy.
4388. *Z. carniolica* Sc. v. (et ab.) *berolinensis* Stgr. Złoczów-Krasno 15. VII. 1923.
4532. *Trochilium apiformis* Cl. Rytro, 8. VII.
4546. *Sesia sphaeciformis* Gerning. Łotatniki 14. VI. 23.
4551. *S. cepiformis* O. Rytro 7. VII. 05.
4552. *S. tipuliformis* Cl. Rytro kilka okazów 9. VI. 96 czerpane z kwitnących *Euphorbia cyparissias*.
4563. *S. culiciformis* L. Rytro 25. V. 05; Barcice koło Rytra.
4587. *S. empiformis* Esp. Rytro w VI, VII i VIII; Żurawno VIII.
4713. *Phragmatoecia castaneae* Hb. v. *cinerea* Teich. Strzałków lampa, 19. VI. 17.
4718. *Zeuzera pyrina* L. ab. *octopunctata* B. Łotatniki 26. VI. 17.
4743. *Hepialus hecta* L. ab. *decorata* Krul Strzałków lampa 12. VI. 17.

MICROLEPIDOPTERA.

17. *Crambus paludellus* Hb. ab. *nivellus* Rbl. 18. VII. 17, 5. i 13. VIII. 18, Strzałków lampa, na łąkach moczarowatych.
61. *C. tristellus* Man. ab. *paleella* Hb. Strzałków lampa w VIII. 17. kilka okazów. — *C. t. ab. fuscinelinus* Stph. razem z poprzednią.
68. *C. perlletus* Sc. ab. et v. *warringtonellus* Stt. Strzałków lampa w VI i VII.
191. *Donacaula mucronellus* Schiff. Strzałków lampa w VI i VII. na łąkach podmokłych — rzadki.
253. *Plodia interpunctella* Hb. 18. VII. 18 w domu złowiony, forma więcej południowa, u nas bardzo rzadka.

589. *Selagia argyrella* F. Man. Strzałków 13. VIII. 17. również forma rzadka.
731. *Acrobasis zelleri* Rag. Strzałków ex l. z dębów, Łotatniki, forma również niepowszednia.
841. *Pyralis regalis* Schiff. Strzałków, lampa 15. VII. 23. znany dla Polski tylko z 2 okazów, pierwszy złowił Stöckl. 4. VIII. we Lwowie; rzadkość pierwszorzędna.
- *979. *Scoparia pallida* Stph. Strzałków lampa 28. VI., 9. i 20. VII. 17. forma dla Polski nowa, bardzo rzadka.
1251. *Pyrausta purpuralis* L. gen. aest. *chermesinalis* Gn. Strzałków lampa w VI. i VII. — *P. p.* v. et ab. *ostrinalis* Hb. Strzałków 7. V. 21.
1406. *Stenoptilia bipunctidactyla* Hw. v. *plagiodactyla* Stt. Łotatniki 3. VII. rzadki.
1459. *Acalla niveana* F. Man. v. (et ab.) *scotana* Stph. Nowy Targ 7. IV.; Rytro w IV.; Strzałków w IV.
1460. *A. roscidana* Hb. Strzałków 14. IV. 18. z osiki strzepana, bardzo rzadka.
1473. *A. ferrugana* Tr. v. *selasana* H. S. Strzałków 24. VI. ex l., 8. i 10. VII.; forma więcej południowa.
1507. *Cacoecia podana* Sc. v. *sauberiana* Sorh. Strzałków lampa 4. VII. 18.; Żurawno w VII.
- *1520. *C. costana* F. Man. ab. *fuliginosana* Schille. Strzałków lampa 20. VI. 17. Opisano w „Entomol. Zeitschrift F/a“ 27. X. 17.
1540. *Pandemis ribeana* Hb. v. (et ab.) *cerasana* Hb. Strzałków 18. VI. 17. .
1585. *Tortrix paleana* Hb. v. *icterana* Froel. Strzałków i Bereźnica w VI. Gatunek ten występuje u nas przeważnie jako forma *icterana*.
- *1641. *Exapate congelatella* Cl. v. *kenneli* Schille ♂ ab. nov. Strzałków ex l. 31. X. 17. Gąsienice znalazłem na *Siryngra vulgaris* 5. VI. Forma ta opisana jest w Kennela „Die Päläarktischen Tortriciden“ ale nienazwana jako varietas. Różni się od formy typowej brakiem białej, podłużnej, szerokiej smugi w środku skrzydła przedniego. Vide wyż cytowane dzieło tabl. XI., fig. 20. Nazwałem ją ku czci prof. Dra J. Kennela, autora znakomitego wyż wymienionego dzieła.
1646. *Losopera francillana* F. Strzałków lampa 12. VII. 18. i 22. VI. 23.; jedna z rzadkich Tortricidów.

1706. *Conchylis ambiguella* Hb. Strzałków z dębów trzepana, 23. V. 22.; Łotatniki złapana 24. VI. 22.; forma bardzo rzadka.
1827. *Euxanthia angustana* Hb. Orawa w górach Skolskich 14. VI. 21.; forma również bardzo rzadka.
1964. *Cymolomia hartigiana* Rtz. W Podhorcach w szkółce drzew szpilkowych br. Brunickiego 15. i 17. VII. 18.
2043. *Semasia metzneriana* Tr. Strzałków lampa w VI, VII. i VIII. co roku nierzadka; pisze o niej Nowicki, że złapał tylko jeden okaz; Żebrawski wspomina o niej z Chrobrza; jest to więc forma lokalna nie wszędzie występująca.
- * 2061. *Notocelia rosaeicola* Dbld. Strzałków ex l. 22. VI. 17.; złapana 2. VII. 17.; jedna z rzadkich Tortricidów, dla fauny nowa.
2125. *Epiblema solandriana* L. v. (et ab.) *sinuana* Hb. Strzałków 21. i 31. VII. 17.
2259. *Carpocapsa splendana* Hb. Strzałków 8. VII. 21. z dębów płożona, również forma dość rzadka.
2331. *Glyphipteryx equitella* Sc. Strzałków 23. V. 18. rzadka.
2360. *Yponomeuta rorellus* Hb. Strzałków lampa 12. VII. 18. i 8. VII. 20.; forma niezczęsta.
2466. *Cerostoma radiatella* Don. ab. *nigrovitella* Hander. Strzałków 28. VI. i 2. VII. 17. ex l.; 7. IV. 19. las.
2471. *C. sylvella* L. Strzałków 21. i 31. VIII. 22., z dębów trzepana; forma rzadka.
2486. *Orthotaelia sparganella* Thunbg. Strzałków lampa 18. VII. 17.; rzadkość pierwszorzędna.
2542. *Gelechia cuneatella* Dgl. Strzałków lampa 20. VII. 17.; również forma bardzo rzadka.
3050. *Oegoconia quadripuncta* Hw. Strzałków lampa 25. VII. 17.; forma rzadka.
- * 3164. *Psecadia lugubris* Stgr. Łotatniki 14. VI. 22. Tę formę południową znaną tylko z Bułgarii i Górnej Austrii złapał na wspólnej wycieczce z inżynierem Romaniszynem i ze mną br. Brunicki i miał jako formę nową dla fauny ogłosić w naszym Polskiem Piśmie Entomol.
- * 3191. *Depressaria daronicella* Wck. Strzałków ex l. i Bereźnica w VI. i z początkiem VII. Gatunek ten udało mi się wyhodować, studjując biologię motyli znajdujących na *Doronicum*

pardalianches. Gaşienica sprzędza w końcu kwietnia i z początkiem maja pędy końcowe tej rośliny i wydaje motylka w VI i VII. Gatunek dla fauny nowy.

3322. *Hypercalia citrinalis* Sc. Łotatniki i Rytro w VII.; forma rzadka.

*3592. *Limnaecia phragmitella* Stt. Strzałków lampa 20. VII. 17.; gatunek dla fauny nowy i bardzo rzadki.

3772. *Coleophora ditella* Z. Strzałków lampa 24. VI. 22., rzadka.

*3850. *C. nutantella* Mühlig. Strzałków lampa 20. VI. 17.; forma dla fauny nowa i rzadka.

4076. *Glacilaria imperialella* Mn. Strzałków las 7. V. 21.; również forma bardzo rzadka.

*4223. *Phyllobrostis hartmanni* Stgr. Ze zbioru ś. p. Dra Klemensiewiczza obecnie w posiadaniu br. Brunickiego w Podhorcach.

R é s u m é.

131. *Apatura iris* L. ab. *romaniszyni* Schille ab. nov. Der Falter, ein ♂, ist in Bezug auf Binden und Flecke vollkommen normal gezeichnet und gefärbt d. h. sie sind weiss. Doch ist der Totaleindruck, den der Falter macht, ein vom Normalen ganz verschiedener, indem alle Flügelflächen gleichzeitig in allen Lagen, in die man den Falter bringt, prachtvoll violettblau schillern. Die Ausdehnung der blauen Färbung auf den Vorderflügeln ist der der normalen Falter gleich, erstreckt sich jedoch auf den Hinterflügeln über die Ocelle weg bis fast zum Apex und reicht von Ader II an bis Ader IV₂ fast bis zum Aussenrand. Die stumpf schwarzbraune Grundfärbung der Flügel, wie sie sich bei normalen Stücken dem Auge darbietet, während die eine Seite der Flügelflächen blau irisiert, ist nur dann zu ersehen, wenn man dem Falter eine äusserst schiefe Lage gibt und dann noch herrscht das Blaue vor.

191. *Melitaea athalia* Rott. ab. *latefasciata* Fixs. Bei diesem Falter ist die Binde auf der Unterseite der Hinterflügel bedeutend erweitert, weisslich; diese Färbung wird an der Oberfläche des Flügels sichtbar, wodurch dieser hier bis an den Hinterrand in seiner ganzen Breite aufgehellt wird. Die Individuen zur Gruppe *latefasciata* gehörig sind nach der Beschrei-

bung Seitz's die grössten der Athalien, was man von meiner ab. nicht sagen kann, da dieselbe kleiner ist als die normalen Falter, doch gehört diese unstreitig ihrem ganzen Habitus nach zur Gruppe *latefasciata*.

402. *Epinephele jurtina* L. ab. *testacea* Schille ab. nov. Expansion 41 mm; das Tier ist im Verhältnis zu den normalen ♂♂ von *jurtina* bedeutend kleiner, was sofort auffällt; die Farbe der Vorderflügel ein schönes Chocolatebraun, im oberen Teil der Discoidalzelle und gegen die Ocelle zu, die kaum sichtbar ist, sind die Flügel in ein stark weissliches Schalgebild aufgehellt, welche Aufhellung oberhalb des Duftflecks und seitwärts von demselben verwaschen in die Grundfarbe übergeht. Der Duftfleck ist dunkel schwarzbraun und hebt sich prachtvoll von der Grundfarbe ab. Auf der Unterseite sind die Vordeflügel schmutzig ockergelb mit breitem graubraunem Rande, die Ocelle gut ausgeprägt, licht gekernt. Die Hinterflügel sind in Grundfarbe, von der eigentlich nur der Aussenrand in breiter Binde übrig geblieben ist, etwas heller als die Vorderflügel; die Aufhellung erstreckt sich über den ganzen Flügel, so dass Geäder hier vollständig sichtbar ist und alle Adern mit Ausnahme von III₂ braun verdickt sind. Die Unterseite schmutzig grauweiss und mitten in der Zelle zwischen Ader IV₁ und IV₂ ein dunkelbrauner Punkt in ockergelber Umrahmung.

In die Gruppe von ab. *cinerascens* Fuchs kann der Falter nicht gestellt werden, weil an ihm nichts aschgraues vorkommt; ich benenne denselben als ab. *testacea*.

1136. *Agrotis augur* F. ab. *conjuncta* Schille. Die Ringmackel mit dem ersten Querstreifen verbunden, länglich, vom Vorderrand gerade abgeschnitten, braun centriert, die Nierenmakel dunkelbraun ausgefüllt; aus ihrer Mitte entspringt parallel zum Vorderrande laufend ein starker, schwarzer gerader Strich, der den hinteren Querstreifen erlangt und sich hier in dessen äussersten Ausbuchtung mit diesem verbindet. Alles andere wie bei typischen Exemplaren.

3591. *Tephroclystia veratraria* HS. ab. *prüfferi* Schille ab. nov. Kleiner als die typische Form; vollkommen zeichnungslos nur mit schwarzem Discalpunkt; im Hinterwinkel der Vorderflügel ein kleiner kaum wahrnehmbarer weisser Fleck, die

Färbung der Flügel ist ein lichtiges Olivengrau. — Benannt zu Ehren des Univer. Professors Dr J. Prüffer.

3743. *Gonodontis bidentata* Cl. ab. *trapezoides* Schille ab. nov.
Die Flügel sehr gleichmässig braungrau gefärbt; dunkler als bei der typischen Form, die Querstreifen schwarz, kaum markiert, weiss gesäumt am Innenrand, weit von einander entfernt; der Erste an der Mediana stark gebrochen und von hier ab mit dem Zweiten parallel in den Innenrand laufend. (Bei der typischen Form convergierend).
1641. *Exapate congelatella* v. *kenneli*, Schille, ♂ ab. nov. Diese Form ist in Kennels „Die Paläarct. Tortriciden“ als Varietas beschrieben doch nicht benannt, unterscheidet sich von der typischen Form durch den vollständigen Mangel der weissen in der Mitte der Vorderflügel verlaufenden breiten Längstrieme. Vide das oben citierte Werk Tafel XI. fig. 20. Benannt zu Ehren des Verfassers des ausgezeichneten Werkes „Die Pal. Tortric.“. Dr. I. Kennel.

Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla

(Verzeichnis der Käfer der Umgebung von Przemyśl)

OMARLIŃCE — NECROPHAGA

podał

T. TRELLA.

SCYDMAENIDAE.

Euthia plicata Gyll.

E. scydmaenoides Steph.

Cephennium reitteri Bris.

C. carpathicum Sauley.

Neuraphes rubicundus Schaum.

N. minutus Chd.

+ *N. nigrescens* Reitt. (w wyk. Bor. or.).

Stenichnus godarti Latr.

S. scutellaris Müll.

S. collaris Müll.