

- Fig. 9. *Ips erosus* Woll. (No. 3, Syrien, Haifa). Bez. der Länge  
des II Zahnes —2.2  $\sigma^*$ .  
 „ 10. „ „ „ (No. 4, Cykladen, Syra). Bez. der Länge  
des II Zahnes —3.5  $\sigma^*$ .  
 „ 11. „ *fejferi* n. sp. (Zwierzyniec, Polen). Bez. der Länge  
des II Zahnes —5.4  $\sigma^*$ .  
 \*) Vom Mittelwerte des *proximus* Eichh.  
 Orig. Zeichn. des Verfassers.

## Tafel III.

- Fig. 1. *Ips proximus* Eichh. (No. 618, Zwierzyniec Polen).  
 „ 2. „ „ „ (No. 625, „ „ ).  
 „ 3. „ „ „ (No. 619, „ „ ).  
 „ 4. „ *erosus* Woll. (No 5, Cykladen, Syra).  
 „ 5. „ *fejferi* n. sp. (Zwierzyniec, Polen).  
 Orig. Zeichn. des Verfassers.

## Tafel IV.

- Fig. 1. *Ips erosus* Woll. (No. 5, Cykladen, Syra).  
 „ 2. „ „ „ (No. 3, Syrien, Haifa).  
 „ 3. „ „ „ (No. 4, Cykladen, Syra).  
 „ 4. „ *proximus* Eichh. (No. 628, Zwierzyniec, Polen).  
 „ 5. „ „ „ (No. 617, „ „ ).  
 „ 6. „ *erosus* Woll. (Zwierzyniec, Polen).  
 „ 7. „ „ „ (No. 2, Syrien, Haifa).  
 „ 8. „ *fejferi* n. sp. (Zwierzyniec, Polen).  
 Orig. Zeichn. des Verfassers.

### Kilkanaście form motyli nowych lub bardzo rzadkich dla fauny Polski.

[Quelques espèces des papillons nouveaux ou plus rares pour la faune  
de la Pologne.]

Podał

JAN ROMANISZYN.

*Colias hyale* ab. *obsoleta* Tutt. Są to okazy, u których ciemne nakreślenia na tyln. skrzydłach prawie zupełnie zanikają. Jeden

okaz ♀ tej odmiany złowilem w Lubyczy Król. w sierpniu roku 1924. Drugi okaz posiadam z Odessy.

*Colias myrmidone* ab. *nigerrima* Pieszczek. Odnacza się przede wszystkim silnym przyciemnieniem wszystkich skrzydeł, a szczególnie tylnych, któreto przyprószenie wychodzi od nasady skrzydeł i wnika prawie po strzępinę. Jedną ♀ tej odmiany złowilem również w Lubyczy Królewskiej na łanie koniczyny w sierpniu 1924 roku. Jeden okaz podaje Stöckl z Brzuchowic.

*Militaea athalia* ab. *mehadiensis* Gerh. Forma o jaśniejszym tle skrzydeł i bardziej regularnym rysunku. Znany dotychczas z Węgier. Jeden okaz ♀ złapałem na polanie lasu świerkowo-sosnowego 16 lipca 1924 r. w Lubyczy Królewskiej.

*Epinephela lycaon* ab. *schlosseri* Voelsch. Okazy ♀♀ do tej odmiany należące są pozbawione oczka w komórce drugiej skrzydeł przedn. Wśród typowych 17. lipca 1924. na wrzosowiskach w Lubyczy Królewskiej.

*Chrysophanus virgaureae* v. *estonica*. Huene. Jedną ♀ tej odmiany złowilem w Hrebennem pod Rawą Ruską 30. lipca 1923 r. Odmiana ta zasadniczo różni się wielkością, gdyż okazy tejsze są o połowę mniejsze od typ. a nakreślenia wskutek tego są gęstsze i przyciemniają tło skrzydeł.

*Ch. phlaeas* ab. *suffusa* Tutt. Okaz silnie przyciemniony (melanizm) złowilem na podmokłej łące w Rzęśnie Polskiej naprzeciw stacji Brzuchowice położonej, 23. lipca 1924 r.

*Lycaena icarus* ab. *striata* Tutt. Posiada plamki na odwrocie skrzydeł podłużnie ze sobą zlanc. Jedną ♀ złowilem 10. sierpnia 1924 r. w Lubyczy Królewskiej na wrzosowiskach.

*L. icarus* ab. *parvus* Karczewski. O połowę mniejszy od normalnego; 1 okaz ♂ złowilem 23. sierpnia 1924 r. w Lubyczy Królewskiej.

*L. coridon* ab. *tiphys* Esp. Czarne kropki na odwrocie skrzydeł bywają ze sobą podłużnie połączone. Jeden okaz w Brzuchowicach 11. lipca 1922 r.

*L. semiargus* ab. *caeca* Fuchs. Kropki na odwrocie przednich skrzydeł zanikają. Jeden okaz złapałem w Strzałkowie obok Stryja 13. czerwca 1923 r.

*L. arcas* ab. *minor* Frey. Znacznie mniejsze od typowych. 2 okazy złowilem 18. lipca 1923 r. na podmokłej łące w Rzęśnie Polskiej.

*L. arcas* ab. *inocellata* Sohn. Czarne kropki na odwrocie skrzydeł maleją do zupełnego zaniku. Jeden okaz ♀ tej odmiany złowiłem wraz z poprzednią w Rzęśnie Polskiej.

*L. arcas* ab. *lucida* Geest. Jeden okaz ♂ razem i równocześnie z poprzednimi odmianami w Rzęśnie Polskiej. Skrzydła o barwie niebieskiej jaśniejszej o stalowym połysku i bardziej rozprzestrzenionej niż u typowej formy.

*Ammonoconia caecimacula* F. Piękny okaz udało mi się wyhodować z gąsienicy przygodnie znalezionej w Nozdźcu obok Dynowa; motyl wylął się 1. września 1923 r. Po Nowickim z Małopolski wykazują go: Schille ex. l. w IX. i Klemensiewicz 4 okazy z Brodów na przynętę w 1/2 IX. Ponadto znany jest z Królestwa, Poznańskiego i Górnego Śląska jakoteż z Pomorza.

*Polia chi* L. Nocnicówka b. rzadka; jedną ♀ złowiłem na stacji Brzuchowice, siedzącą na ścianie budynku stacyjnego, 20-go września 1923 r. Ze złożonych jajeczek po przezimowaniu wylęły się gąsieniczki w kwietniu roku następnego. Zaledwie dwa motyle udało mi się wyhodować, które wylęły się około połowy sierpnia 1924 r.

*Acidalia interjectaria* B. Jedną ♀ złowiłem 9. lipca 1924 r. na wrzosowisku w Lubyczy Królewskiej.

*Anaitis plagiata* ab. *interrupta* Klem. (— ab. *tangens* W. Fritsch). Jestto odmiana, u której pole środkowe skrzydeł przednich między fałdzikiem a żyłką drugą jest przerwane. Pierwszeństwo nazwy *interrupta* Klem. należy się Klemensiewiczowi, gdyż on ogłosił i opisał tę odmianę w Sprawozdaniach Komisji fizjograf. Akademji Umiejętności w Krakowie o cały rok wcześniej, nim się okazał zeszyt dzieła Seitz'a, na którym widnieje data u góry na stronie 177: „Ausgegeben 14. Ill. 1914“, — gdzie odmiana *tangens* W. Fritsch jest wymieniona i opisana. Jeden okaz ♂ tej odmiany złapałem 27. sierpnia 1922. przygodnie na parkanie pod Lwowem.

*Larentia truncata* ab. *depuncta* m. ab. nov. — Odznacza się brakiem czarnej kropki na żyłce poprzecznej skrzydeł przednich. Jeden okaz tej nowej odmiany złowiłem wieczór przy świetle lampy pokojowej w Mikuliczynie 17. lipca 1908 r.

*L. sociata* ab. *albinata* m. ab. nov. — „Alis dilutioribus fere totaliter obsoletis.“ — Wszystkie skrzydła o nakreśleniach normalnych ale bladych i bardzo jasnych tak, iż motyl czyni wra-

żenie silnie zlatanego okazu. Okaz ten znalazłem 10. sierpnia 1924 r. na pniu wierzby w Lubyczy Królewskiej.

*L. picata* ab. *albofasciata* Gauckler. Wszelkie kresy poprzeczne i nakreślenia w polu zewnętrznym zupełnie zanikają tak, iż pozostaje czysto biała wstęga aż po strzępinę,  $3\frac{1}{2}$  — 4 mm. szerokości. Jeden okaz tej ciekawej odmiany złapałem 18. czerwca 1922 r. w Łotatnikach powiat Stryj.

*Tephroclystia tantillaria* B. (= *subumbrata* Hb., *pusillata* Hb. nec. Schiff.). Prout nazywa *Tephrocl. pusillata* Hb. (dawna nazwa według katalogu Staudingera i Rebla Nr. 3535): *Eupithecia tantillaria* Bod. Kilka okazów złowiłem w latach ubiegłych w Brzuchowickich lasach na pniach świerków lub sosen w ostatniej dekadzie maja.

*Tephroclystia indigata* Hb. Bardzo rzadki gatunek miernikowca. Dotychczas podany z Małopolski przez Klemensiewicza z Naćciszwowej (N. Sącz), z Biecza, Brodów i ze Lwowa; Świątkiewicz łowił je w Janowie pod Lwowem. Mój okaz złowiłem w Brzuchowicach na pniu świerka 14. maja 1924 r.

*Spilosoma fuliginosa* trans. ad ab. *pulverulenta* Alph. Okaz należący niewątpliwie do tej odmiany złowiłem przy świetle lampy elektrycznej jeszcze 8. lipca 1905 r. Znany dotychczas z Turkestanu i półn. Chin.

*Coscinia cribrum* L. Bardzo rzadki. Znany w kilku okazach z Małopolski. Ja złowiłem 1 okaz 30. lipca 1924. siedzący na suchym poroście na pniu sosny (Mimikrja) w Hrebennem obok Rawy Ruskiej.

*Zygaena scabiosae* ab. (et v.) *divisa* Stgr. Środkowa klinowata plama przerwana na dwoje. Bardzo rzadka odmiana znana dotychczas z okolic Lwowa w kilku okazach. Mój okaz wylągl się 3. lipca z gąsienicy znalezionej przygodnie w Strzałkowie obok Stryja.

*Acentropus niveus* Oliv. Gatunek nadzwyczaj rzadki. Baron Brunicki złowił kilka okazów w Podhorcach. Mnie udało się złowić przy świetle lampy pokojowej we Lwowie 2 okazy: jeden 16. lipca 1923 r., drugi 30. czerwca 1924 r.

*Pyralis regalis* Schiff. Przepiękny motylek bardzo rzadki złowiony dotychczas w kilku okazach: Stöckl 1 okaz we Lwowie, Prüffer w Ulowie w Zamojszczyźnie, Schille w Strzałkowie, a mnie udało się złowić 3 okazy (1 ♀ i 2 ♂♂) na brzegu mło-

dego lasu świerkowego, kosząc siatką po trawie w lipcu 1924 r. w Lubyczy Królewskiej.

*Capua reticulana* Hb. Złowiłem 2 okazy w Lubyczy Królewskiej, jeden 26. czerwca na liściu olchowym siedzący, drugi 10. lipca na pniu olchy.

*Steganoptycha nitidulana* Z. Nowy gatunek dla fauny Polski. Złowiłem w jednym okazy 24. maja 1924 r. w Brzechowicach.

*Semasia pupillana* Cl. Gatunek bardzo rzadki. Kilka okazów złowiłem w roku ubiegłym w lipcu kosząc siatką piołun w Lubyczy Królewskiej.

*Yponomeuta vigintipunctatus* Retz. 2 okazy. Jeden w pierwszym pokoleniu 14. maja 1924 Brzechowice na pniu drzewa, drugi 24. lipca na płocie w Lubyczy Królewskiej.

*Cerestoma radiatella* ab. *nigrovitella* Hauder. Jeden okaz tej odmiany złowiłem w Boryniczach pod Bóbrką w lesie 22. czerwca 1924 r.

*Gelechia conspurcatella* Hein. Nowy gatunek dla fauny Polski. Jeden okaz tej rzadkości zleciał do pokoju wieczór, do światła lampy we Lwowie 6. lipca 1924 r.

*Anarsia lineatella* Z. Nowy gatunek dla fauny Polski. Jedyny okaz złowiłem przy świetle lampy wraz z poprzednim we Lwowie 6. lipca 1924 r.

*Atremaea lonchoptera* Stgr. Nowy gatunek dla fauny Polski. Jedyny mój okaz tej niebywalej rzadkości znanej dotychczas tylko z płdn.-zach. Francji i z Węgier, złowiłem przygodnie jeszcze w r. 1917, 2. lipca w Tarnopolu.

*Borkhausenia formosella* F. Bardzo rzadki gatunek. Złowiłem jeden okaz 16. lipca 1924 przy świetle lampy pokojowej we Lwowie.

*Gracilaria kollariella* Z. Jeden okaz tej rzadkości znalazłem w opuszczonym gnieździe trzmieli ziemnych w Borkach Dominikańskich 8. września 1923 r.

*Nemotois dumeriliellus* Dup. Jeden piękny okaz tej rzadkości złowiłem w Lubyczy Królewskiej 26. Lipca 1924 r. na wrzosowisku.

#### R é s u m é.

L'auteur nous présente quelques nouvelles ou plus rares espèces des papillons pour la faune de la Pologne, qu'il avait recueilli dans divers environs de la Petite-Pologne. Parmi ces

papillons il'y-a deux aberrations complètement inconnues: *Larentia truncata* ab. *depuncta* m. ab. nov. qui ne montre les points noir sur les veinules des avant-ailes et la seconde ab. *Larentia sociata* ab. *albinata* m. ab. nov. qui nous montre un total albinisme: tous les ailes sont très jaune pâle; ce dernier papillon fut recueilli le 10. VII. 1924. à Lubyca Królewska.

## Wykaz chrząszczów, zebranych w Sandżaku Trapezuntskim i Gümisch-chane w Azji Mniejszej w latach 1916—1917. VI.

(Verzeichnis der in kleinasiatischen Sandsechaks Trapezunt und Gümisch-chane in J. 1916—1917 gesammelten Coleopteren. VI.)

podał

Dr. W. EICHLER (Pabjanice).

### OEDEMERIDAE.

*Anoncodes ruficollis* F. — Kialkit 1 egz. z Umbelliferae 3. VII. 17.

*Ischnomera coerulea* L. — Trpz. 3 egz. VI. 17.

*Oedemera podagrariae* L. — Dżewizlik 26. VI. 17. z *Achillea* 3 egz.; Kialkit 1 egz. 4. VII. 17. z kwiatów. *Oed. podagrariae* L. a. *femoralis* Seidl. — tamże 1 egz. *Oed. flavescens* L. — Dżewizlik 1 egz. 26. VI. 17 z *Achillea*; Elleu 5 egz. z kwiatów 22—23. VII. 17; Trpz. dolina rzeki 21. VII. 17. *Oed. subulata* Oliv. — Elleu, 2 egz. z kwiatów 23. VI. 17. *Oed. lurida* Marsh. — Souk-su 3 egz. z *Chrysanthemum* 4. VI. 17, wzgórze płdn. 3 egz. 7. VI. i 16. VI. 17; Dżewizlik, 27. VI. 17 z kwiatów łąkowych; Elleu 3 egz. 22—23. VI. 17.

### PYTHIDAE.

*Mycterus curculionoides* F. — Kessa-dagh, 6 egz. 2. VII. 17 z kwiatów; *M. umbellatarum* F. — Kessa-dagh, 3 egz. 1. VII. 17, z *Achillea*.

### HYLOPHILIDAE.

*Hylophilus populneus* Panz. — Trpz. wzgórze wsch. z krzewów 1 egz. 12. V. 17; wzgórze zach. ze śliwki 1 egz. 20. V. 17;