

Geisselglied mindestens 4 mal so lang als breit, das 2-te etwa um ein Drittel kürzer als das erste.

Kopf und Thorax von schwarzer Grundfarbe. Weiss sind: 2 grosse dreieckige Schulterflecken des Mesonotums, Zeichnung der inneren Augenränder und Zeichnung der Mandibeln. Endrand des Clypeus rötlichweiss. Abdomen und Beine rot. Trochanteren und Trochantellen, Tibien und Tarsen III und verschwommene Fleckung der Hüften I und II, sowie der Segmente 1 und 2 schwarzbraun. Vorderflügel unterhalb des ersten Radiusabschnittes ein wenig getrübt.

3 ♀♀ Mitte August in der Umgebung von Bydgoszcz (Bromberg) von Herrn Grafen Toll an einer alten Weide gesammelt und mir freundlich überlassen.

Motyle t. zw. Większe, rzadsze lub nowe dla Małopolski. III.

(Seltenerer oder neue Macrolepidopteren für Kleinenpolen. III.).

podał

TYTUS F. KAUCKI.

Po przeprowadzeniu ostatecznej determinacji mojego zbioru motyli, głównie na podstawie dzieła Seitz'a: „Die Großschmetterlinge der Erde“, podaję większą ilość form aberatywnych, wśród nich także parę rzadkich form gatunkowych. Ponieważ w poprzednich moich pracach wkrađło się kilka omyłek, dlatego dla ścisłości naukowej owe mylnie podane formy, odpowiednio sprostowane, raz jeszcze zamieszczam. Podana przy niektórych formach wielkość (= w.) oznacza siąg skrzydeł przednich u góry. Formy nowe dla fauny Małopolski oznaczone są gwiazdką.

* *Pieris brassicae* L. trans. ad ab. *wollastoni* Btlr. Złapałem w maju 2 ♂♂ oznaczone na wierzchu przed. sk. czarną kreską dyskoidalną, przeto uważam tę formę jako przejściową do wyżej podanej aberacji, która najbardziej jest znaną z wysp Madeira i z okolicy Smyrny. Lwów 22 V 1928.

* *P. napi* L. ab. ♀ *posteromaculata* Reverd. Do tej aberacji zaliczam ♀ posiadającą na wierzchu sk. tyl. 3 dodatkowe czarne plamki. Lwów, 22 V 1928.

P. napi L. ab. *verna* Strand. Aberacja ta odznacza się bar-

dzo silnem i szerokiem ciemnem ubarwieniem żyłek na spodzie skrzydeł. Worochta, 16 VI 1914, 1 ♂.

* *Colias hyale* L. ab. *heliceides* Selys. 2 okazy b. małe (w.: ♂ 30 mm, ♀ 33 mm) złapałem przed wielu laty w sierpniu w okolicy Skolego.

C. hyale L. ab. ♀ *inversa* Alph. Rzadka forma ♀, koloru samca. Lwów, VII 1901, 1 okaz.

* *Pyrameis atalanta* L. ab. *nana* Schultz. W.: tylko 44 mm; Lwów, 25 IX 1927, 1 okaz ex l.

Vanessa urticae L. ab. *urticoïdes* F. d. W. W.: tylko 32 mm; Lwów ex l. 10 VII 1926, 1 okaz.

V. urticae L. v. (ab.) *turcica* Stgr. Forma ta wyróżnia się tłem jaśniejszem, szczególnie zaś b. małymi czarnymi plamkami dyskoidalnymi na sk. przedn.; Lwów, VI 1924, ex l. Kilka okazów.

V. urticae L. trans. ad v. *polaris* Stgr. Aberacja ta ma środkową czarną plamę brzegu ramiennego połączoną czarną smugą z takąż plamą brzegu pachowego. Lwów, 11 IX 1926, 3 ok. ex l.

* *Melitaea maturna* L. v. *urbani* Hirschke. U tej formy przeważa kolor czarny, który jest także ciemniejszy niż u okazów typowych. Łapałem ją w czerwcu 1922 i 1923 w okolicy Stryja wraz z typowymi okazami, 2 ♂♂ posiadam także z okolicy Starego Sambora.

* *M. athalia* Rott. ab. *magna* Stgr. Duży okaz ♀ (w.: 42 mm) złapanej w czerwcu 1923 w okolicy Stryja zaliczam do tej formy.

Argynnis aphirape Hb. trans. ad v. *ossianus* Hbst. Forma ta posiada środkową przepaskę i księżycy skrajne na spodzie sk. tyl. srebrzysto-białe. Mój okaz ♀ uważam jednak za formę przejściową, ponieważ wierzch jej jest dość ciemny a nie „mehr rot-gelb“, tak bowiem typowe okazy tej formy są opisane. Rzęsna Polska 3 VI 1923.

* *Coenonympha tiphon* Rott. v. *isis* Thnbg. Mały okaz ♂ (w.: 28 mm), u którego spód tyl. sk. jest szaro-niebieskawy zaliczam do tej formy. Rzęsna Polska 30 VI 1924.

Chrysophanus dorilis Hufn. Typowe ♀♀ tego motyla są u nas b. rzadkie, zupełnie tak jak np. typowe ♀♀ *Lyc. meleager* Esp. Tylko 2 takie typowe ♀♀ złapałem dotychczas w okolicy Lwowa w czerwcu 1910 i 1918. Wierzch sk. przed. ma u nich tło jasne żółto-czerwonawe a więc zbliżone bardzo do jaśniejszych okazów *Chrys. phlueas* L.

Lycaena argus L. ab. *alpina* Berce. Do tej formy zaliczam małe okazy (w.: około 22—23 mm) tego modraszka, złapane w okolicy Lwowa. 2 ♂♂ złapałem 6 VIII 1919, 1 ♂ 25 VI 1922 i 1 ♀ 8 VII 1923.

Lyc. argyrognomon Brgstr. ab. ♀ *unicolor* Favre. 2 ♀♀ tej formy, mającej wierzch jednobarwny brunatno-czarny, złapałem w okolicy Lwowa 20 VI 1914.

**Lyc. baion* Brgstr. trans. ad ab. ♂ *clara* Christ. Posiadam 2 okazy ♂♂ blade niebieskich i nieco srebrzysto-białawo mieniących się, dlatego uważam je za przejściową formę do wyż podanej aberacji, która występuje szczególnie w Azji Majej. Złapane w maju w Rzęśnie Polskiej 1912 i 1914.

Lyc. alcon F. ab. *cecinae* Horm. Forma ta ma spód prawie zupełnie jednobarwny, bez oczek. Rzęsna Polska 10 VII 1918, 1 ♂.

Lyc. euphemus Hb. ab. *obscurata* Stgr. Melanotyczny okaz ♀, złapanej w lpcu 1919 w Rzęśnie Polskiej zaliczam do wyżej podanej aberacji, występującej wedle Staudingera szczególnie na Uralu i w środkowej Azji. Okaz ten niepotrzebnie jako nową formę pod nazwą ab. ♀ *obscura* pierwotnie opisałem. (Vide: P. P. E. T. III. Z. 3. 1924, str. 91).

**Notodonta ziczac* L. trans. ad ab. *pallida* Grbg. 2 Okazy znacznie jaśniejsze zaliczam do przejściowej formy tej aberacji, występującej szczególnie w Azji środkowej. Brzechowice 23 VII 1912, 1 ♂ ex l., Lwów 13 VIII 1918, 1 ♀.

**Pygaera curtula* L. trans. ad v. *canescens* Gracs. Za przejściową formę do tej odmiany uważam 1 okaz ♂ znacznie jaśniejszy t. z. nie mający owego czerwonawo-brunatnego oprószenia, które mają okazy typowe. Lwów, 20 IV 1915 ex l. — Typ tej odmiany występuje szczególnie we wschodniej Syberji.

Lymantria dispar L. ab. *major* Fuchs. Jedną dużą ♀ (w.: około 80 mm) zaliczam do tej formy. Brzechowice VIII 1910 ex l.

**Lym. dispar* L. ab. ♀ *unifascia* Schultz. Okaz prawie jednobarwny, mający tylko jedną bladą brunatną przepaskę środkową na sk. przed. Lwów, 12 VIII 1919 ex l.

Malacosoma neustria L. ab. ♂ *vulgaris* Borkh. Forma ta odznacza się tłem brunatno-czekoladowem. Brzechowice, 28 VI 1922, 1 okaz ♂ ex l.

**Acronicta rumicis* L. ab. *euphorbiae* Steph. Wyróżnia się

kolorem sk. przed., który jest bardziej brunatno-szary. Szczerzec koło Lwowa, 12 V 1927 ex l. 1 ♀.

* *Agrotis festiva* Schiff. ab. *coerulea* Tutt. Posiada tło sk. przed. popielato-brunatno-niebieskawe. Worochta 29 VI 1911, 1 okaz.

Agr. lucipeta F. Tę b. rzadką sówkę złowiłem do światła we Lwowie 20 VIII 1908.

* *Mamestra leucophaea* View. ab. *bombycina* Ev. Rzadką tę aberację, która ma pojawiać się częściej w okolicach Uralu, podałem pierwotnie pod mylną nazwą: ab. *vestigialis* Esp. — (Vide: P. P. E. T. V. Z. 1—2. 1926, str. 63).

Mam. advena F. ab. *nitens* Haw. Forma ta posiada sk. przed. znacznie jaśniejsze t. z. jasno niebiesko-popielate, sk. tyl. także są jaśniejsze. Lwów, VI 1911, 1912 i 1921, razem 4 okazy.

* *Mam. oleracea* L. ab. *rufa* Tutt. Do tej formy należą okazy mające sk. przed. jaśniejsze, t. z. bardziej czerwono-brunatne. Lwów, VI 1920 i 1921. Kilka okazów ex l.

Mam. dissimilis Knoch. ab. *suasa* Bkh. Do tej formy należą okazy, mające sk. przed. jasno nerkowo-brunatne z ostremi nakreśleniami. Lwów, V 1921, 1922 i 1923, kilka okazów.

Mam. dissimilis Knoch. ab. *w-latinum* Esp. Aberacja rzadka. Lwów, V 1920. 1 okaz ex l.

Mam. thalassina Rott. ab. *achates* Hbn. Okazy znacznie ciemniejsze czerwono-brunatne. Lwów, V 1921 i 1926, 3 okazy.

* *Mam. thalassina* Rott. ab. *humeralis* Haw. Forma podobna do poprzedniej lecz bez brunatno-czerwonego nalotu. Lwów 22 V 1919, 1 okaz. Wydaje się być dość rzadką.

Mam. pisi L. ab. *splendens* Stph. Sk. przed. ciemniej-brunatne z b. słabymi nakreśleniami. Mikuliczyn VI 1907, 1 okaz.

* *Mam. trifolii* Rott. ab. *saucia* Esp. Forma ta ma sk. przed. jaśniejsze z odcieniem żółtawym. Lwów, V 1913 i 1915, 2 okazy.

* *Mam. trifolii* Rott. ab. *albifusa* Wlk. Forma ta, znana początkowo tylko z Ameryki półn. i Anglii, ma sk. przed. znacznie jaśniejsze od typu; szczególnie zaś wyróżnia się jasną plamą, leżącą pod plamką krągłą, i szeroką jasną przepaską, położoną przed linią falistą. Zapewne jest ona u nas rzadką, bo tylko 2 ♂♂ złapałem w okolicy Lwowa 16 VIII 1916 i 28 VIII 1917.

Mam. glauca Hbn. Jedną ♀ tej górskiej i rzadkiej sówki złowiłem na górze Rebrowacz w Worochcie 14 VI 1912.

Mam. dentina Esp. ab. *hilaris* Zett. U tej formy plama krągła tworzy z poniżej leżącą białawą plamą jedną zlaną smugę. Lwów, 1 VI 1921, 1 ♂.

**Dianthoecia luteago* Hbn. ab. *brunneago* Esp. Jedyny okaz tej rzadkiej sówki, złapanej w okolicy Lwowa w sierpniu 1898 zaliczam do tej formy, ponieważ ciemniejsze jej ubarwienie odpowiada dotyczącej rycinie w atlasie Seitz'a.

**Bombycya viminalis* F. ab. *saliceti* Bkh. Forma ta ma sk. przed. znacznie ciemniejsze u nasady niż na zewnętrznej ich części. Worochta, VII 1913, kilkanaście okazów ex l.

Diloba caeruleocephala L. ab. *separata* Schultz. Jeden okaz ♂ mający plamę nerkowatą oddzielnie postawioną zaliczam do tej formy. Lwów, 8 X 1926 ex l.

Hadena adusta Esp. ab. *duplex* Haw. Karpackie okazy tej dość rzadkiej sówki, odznaczające się głównie znacznie ciemniejszym ubarwieniem, mogą być niewątpliwie zaliczone do tej formy, gdyż zgadzają się z opisem jakoteż i z dotyczącą ryciną w dziele Seitz'a. Dlatego nadana im przezemnie pierwotnie nowa nazwa: v. *carpathica*, okazała się jako niepotrzebna i nieuzasadniona. (Vide: P. P. E. T. I. Z. 2. 1922, str. 39).

**Had. sordida* Bkh. ab. *anceps* Hbn. Okazy tej formy mają sk. przed. bardziej brudno-jasno-brunatnawe. Lwów, VI 1902, 1922, kilka okazów.

Had. lateritia Hufn. ab. *derufata* Warr. Forma ta posiada sk. przed. jaśniejsze i prawie jednobarwnie ceglasto-czerwone. Janów k. Lwowa, VII 1909 i 1912. Zakopane 29 VII 1908, 3 okazy.

**Had. basilinea* F. ab. *cinerascens* Tutt. Do tej formy zaliczam moje 2 okazy (♂ i ♀), mające sk. przed. brudno-popielatoszare bez przymieszki owego żółtawo-brunatnego koloru, który cechuje formę typową. — Aberacja ta ma być szczególnie częstą w płn. Anglii. — Lwów VII 1912 ♂ i Mikulińce VI 1926 ♀.

**Had. basilinea* F. ab. *pallida* Tutt. Jeden okaz ♀ mającej sk. przed. bardziej jednobarwnie jasno ochrowo-brunatnawe zaliczam do tej formy. Ma ona występować szczególnie w Irlandji. Lwów, 10 VI 1917.

**Brachionycha nubeculosa* Esp. ab. *perfumosa* Warr. Do tej formy zaliczam 1 okaz ♀, u której wierzch i spód skrzydeł przednich i tylnych jakoteż i abdomen, odznacza się szczególną impregnacją koloru brunatno-różowego. Worochta, 21 III 1915 ex l.

Taeniocampa pulverulenta Esp. ab. *ambigua* Hbn. Posiada sk. przed. w części nasadowej jaśniejsze od części zewnętrznej. Środek zaś jest przecięty ciemną smugą. Biłohorszcze ad Lwów, III 1913 ex l.

Taen. populeti Tr. ab. *atropunctata* Geest. Biłohorszcze ad Lwów, IV 1910, 1 ♂.

Taen. opima Hb. ab. *grisea* Tutt. Tło sk. przed. jednobarwne, popielato-szare. Lwów, 6 IV 1908, 1 okaz.

Calymnia trapezina L. ab. *grisea* Tutt. Tło sk. przed. szaropopielate z odcieniem zielonkawym. Lwów, VII 1919, 1920, 2 ♂♂ ex l.

* *Cal. trapezina* L. ab. *badiofasciata* Teich. Brzuchowice 30 VI 1920 i 29 VI 1922 ex l. 2 ♂♂. Bardzo rzadka.

Orthosia lota Cl. ab. *rufa* Tutt. Sk. przed. z czerwonym nalotem. Lwów, 20 IX 1914, 1 okaz.

Orth. circellaris Hufn. ab. *ferruginea* Esp. Sk. przed. odznaczają się ciemniejszym rdzawym tłem, niż okazy zwyczajne. Lwów, VIII 1921 ex l., 2 okazy.

Xanthia fulvago L. ab. *cerago* Hbn. Do tej formy należą okazy o b. bladych i jasnych plamach czerwono-brunatnych. Są one jakoby przejściową formą do ab. *flavescens* Esp. Lwów, VII 1921, ex l. Kilkanaście okazów.

Anarta myrtilli L. ab. *rufescens* Tutt. Okazy z okolicy Lwowa, podobnie jak wogóle Europy Środkowej, należą do tej formy. Rzęsna Polska, IV 1912 i 1913 ex l. Kilkanaście okazów.

* *Abrostola tripartita* Hufn. ab. *urticae* Hbn. Rzadka ta forma wyróżnia się zupełnym brakiem plam zielonawych na sk. przed. Lwów, 23 IV 1925 ex l. 1 okaz.

* *Plusia chrysitis* L. ab. *rosea* m. nov. ab.: „*al. ant. et post. supra subtusque pallide roseo-brunneis, fasciis aureis et conjunctis; corpore et pedibus similiter roseo-brunneis*“. Lwów ex l. 1 VIII 1923 ♀. Piękna ta i zapewne rzadka aberacja rysunkiem i złotawym kolorem przepasek odpowiada wprawdzie formie ab. *aurea* Huene, wyróżnia się jednak osobliwym kolorem tła jasno różowo-brunatnym. Dlatego nadanie jej nazwy osobnej wydaje mi się wskazanem.

Pl. gamma L. ab. *nigricans* Spul. Okazy tej formy są ciemniejsze t. z. fioletowo-czarno-brunatne. Lwów, VIII 1926, ex l. 4 okazy.

Pl. gamma L. v. *gammina* Stgr. Bardzo mały okaz (w.: 29 mm), złapany w okolicy Lwowa 25 VII 1926, zaliczam do tej formy.

* *Hypena proboscidalis* L. ab. *parva* Hannemann. Do tej formy można zaliczyć okazy drugiego t. j. letniego pokolenia, są one bowiem stale mniejsze (w.: około 27 mm) i przeważnie ciemniej ubarwione niż okazy wiosenne. Lwów, VIII 1926 ex l. Kilkanaście okazów.

* *Hyp. proboscidalis* L. ab. *infusata* Spul. Jeden okaz ♂ b. ciemny t. j. czarno-brunatny zaliczam do tej formy. Lwów, 2 VIII 1927 ex l.

* *Cymatophora octogesima* Hbn. ab. *rosea* Tutt. Okazy, u których sk. przed. są silnie różowawe. Rzęsna Polska V 1911, 1921 ex l., 2 okazy.

* *Brephos parthenias* L. ab. *obscura* Prout. Posiada sk. przed. bardziej jednobarwne bez białych plam. Lwów, 23 III 1903, 4 okazy.

* *Lygris prunata* L. tr. ad ab. *digna* Th. Mieg. (= *ochraceata* Lambill., *flavicata* Sp. Schneid.). Okazy moje, które jeszcze za przejściową formę uważam, mają tło ochrowo-wiśniowe i nakreślenia wyraźne jak u formy typowej, tylko sk. tyl. są znacznie jaśniejsze bez przyciemnienia w części nasadowej. Worochta, VII 1914 ex l. ♂ i ♀. Rzadka aberacja.

L. prunata L. ab. *constricta* Strand. (= *interrupta* Hirschke). Forma ta ma pole środkowe sk. przed. w dolnej części przerwane jasną przepaską, która łączy się ukośnie z podobną przepaską końcową. Lwów, 7 VII 1926 ex l. 1 ♀. Forma rzadka.

L. associata Bkh. Kilka okazów tego dość rzadkiego mierzniowca wyhodowałem z gąsienic z okolicy Lwowa w czerwcu 1927.

Larentia truncata Hufn. ab. *perfusca* Haw. Piękny okaz tej formy złowiłem na Rebrowaczu w Worochcie 13 VI 1910.

Lar. citrata L. 2 okazy złapałem w Zubrzy koło Lwowa w lipcu 1917.

Lar. citrata L. ab. *immanata* Haw. Rzadką tę u nas formę złowiłem w Worochcie na Rebrowaczu 16 VII 1913.

Lar. fluctuata L. ab. *abstersata* H. S. (= *fasciata* Tutt). Forma ta posiada czarną przepaskę przedłużoną aż do brzegu pachowego. Lwów, VI 1910, 1919, 2 ♂♂.

Lar. montanata Schiff ab. *continuata* Krul. Ładny okaz tej formy, mający na sk. przed. jednolitą ciemną przepaskę, złapałem na Rebrowaczu w Worochcie 16 VI 1914.

* *Lar. lugubrata* Stgr. v. *albidior* Alph. Odznacza się znacznie

szerszą i czysto białą przepaską na sk. przed. Worochta 21 VI 1909, 1 ♀. Forma rzadka.

**Abraxas grossulariata* L. ab. *dohrni* König. (= *deleta* CKU). Rzadka ta aberacja odznacza się dość znaczną redukcją czerni na sk. przed., żółte zaś przepaski ma rozszerzone i nieco bledsze, niż u okazów zwyczajnych. Tylne sk. posiadają tylko czarną plamę dyskoid., po parę plamek środkowych, zaś z plamek krańcowych tylko kilka kropek pozostało. Lwów, 15 VII 1922, 1 ♂. Odmiana ta ma być nierzadką w Anglii i Rosji.

Abr. grossulariata L. ab. *melanozona* Rayn. Do tej formy zaliczam rzadkie melanotyczne okazy, o mniej lub więcej powiększonych i przeważnie zlewających się razem plamach czarnych, szczególnie na sk. przed. Żółte zaś przepaski są b. zredukowane i zanikające. Kilka takich pięknych okazów otrzymałem ex l. z okolicy Lwowa w lipcu 1927.

Angerona prunaria L. ab. *pickettaria* Prout. Rzadka ta forma rysunkiem i ubarwieniem do ab. *sordiata* podobna, ma brzegi skrzydeł dość szeroko żółte, czem się głównie od *sordiata* wyróżnia. Brzuchowice 29 VI 1923, 1 ♀.

Ang. prunaria L. ab. *pallidaria* Prout. Również rzadka forma; posiada skrzydła jednobarwnie zgniło-łowo-brunatnawe, środkiem zaś okazuje blade duże plamy żółtawe, przez co zbliża się do ab. *sordiata*. Opis ten odnosi się tylko do ♀, samca bowiem dotychczas nie posiadam. Jedną taką ♀ otrzymałem ex l. z okolicy Stryja 14 V 1925.

Ang. prunaria L. Gen. II. W bieżącym roku choduję po raz trzeci większą ilość gąsienic *prunaria* (około 250 okaz.) ex ovo. Jajka te otrzymałem z kopulacji 3 par motyli, pochodzących z poprzedniego chowu. Około połowy sierpnia zobaczyłem ku memu wielkiemu zdziwieniu, iż jedna gąsienica przeobraziła się w poczwarkę w skręconym listku. Od tego dnia w przeciągu czterech tygodni przepoczwarczyło się stopniowo kilkanaście gąsienic. Dotychczas wylęgło się już 6 motyli; 2 typowe i 4 ab. *sordiata*. Są one naturalnie znacznie mniejsze (w.: 30—32 mm) od normalnych okazów. Tym sposobem otrzymałem drugą generację *prunaria*, która w środkowej Europie, o ile mi wiadomo, w naturze się nie pojawia.

**Semiothisa liturata* Cl. ab. *pallida* m. ab. nov. „*Supra sub-tusque multo pallidior, albescens; ceterum typice signata*“. Dwa

takie okazy aberatywne (♂ i ♀) złapałem na Rebrowaczu w Wo-rochcie 22 VI 1911. Są one znacznie jaśniejsze, brzegi skrzydeł nie są wcale przyciemnione, spód zaś jest prawie zupełnie biały. Wszelkie nakreślenia jak u formy typowej lecz bledsze i słabsze. Ponieważ tak opisaną formę nigdzie w dostępnej mi literaturze nie znalazłem, dlatego nadaję jej osobną nazwę.

Boarmia consortaria F. ab. *consobrinaria* Bkh. Aberatywny okaz tego miernika, który pierwotnie jako nową formę pod nazwą: ab. *pulcherrima* opisałem, może być zaliczony do wyżej podanej aberacji (Vide: P. P. E. T. I. Z. 2. 1922, str. 41).

Boarmia lichenaria Hufn. ab. *cineraria* Bkh. Okaz ♀ ciemno-szary i pozbawiony zlezonego nalotu zaliczam do tej formy. Zawadów koło Lwowa 15 VII 1923.

Résumé.

Es werden vom Verfasser mehrere meistens seltener und aberrative Formen von Macrolepidopteren für Kleinpolen aufgezählt. Unter ihnen werden zwei Formen und zwar: *Plusia chrysitis* L. ab. *rosea* n. ab. und *Semiothisa liturata* Cl. ab. *pallida* n. ab. als ganz neue Aberrationen angegeben. Diagnosen vide im Texte. Die aufgezählten Arten wurden von dem Verfasser, meistens in der Umgebung von Lwów (Lemberg) und in den Karpathen gesammelt. Für die Fauna Kleinpolens neue Formen sind mit einem Sternchen bezeichnet.

Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy. IV.¹⁾

(Coléoptères nouveaux pour la Pologne. IV.).

podał

SZYMON TENENBAUM.

Bembidion nigricorne a. *wahnschaffei* Heinem. Okolice Warszawy: Czarna Struga 2 IV 28. Między paruset okazami, należącymi do formy typowej tylko jeden okaz.

¹⁾ I. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy. „P. P. Ent.“ T. III, zesz. 4, 1924. Lwów 1925. — II. Kilkadziesiąt nowych dla Polski chrząszczy. Ibid. T. IV, zesz. 2, 1925. — III. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy. Ibid. T. V, zesz. 1–2, 1926.