

## Nowa aberacja *Argynnis lathonia* L. (Lepidopt.)

Nouvelle aberration de l'*Argynnis lathonia* L.

2 fig. text.

podał

K. F. WIZE.

W roku 1929 w jesieni udało mi się schwycić w Sędzinie w województwie Poznańskim, w ziemi Bukowskiej, dwa okazy *Argynnis lathonia*, których fotografię podaję tu, a które nazwałem ab. *neopina* mihi, ażeby wskazać na podobieństwo plam na brzegach skrzydeł do plam motyli, pojawiających się na płaskowzgórzach Chin i Tybetu z temperaturą bardzo zmienną w ciągu każdej doby. Odmiana ta odpowiada odmianie *Argynnis paphia* L. ab. *ocellata*, uzyskiwanej z hodowli w niskiej temperaturze. Jest ona może ostateczną formą, ekstremem ab. *melaena* Spul.; zasługuje jednakże mimo to na osobne nazwanie właśnie dla tych ciemnych oczek wspólnych z *Argynnis paphia* L. ab. *ocellata* i z niektórymi gatunkami *Neope* Btlr. oraz z *Pararge achine* Scop. Podobne zlewanie się kropek w oczy napotyamy u niektórych północnych *Argynnid*. Rok 1929 był na ogół chłodny, jesień zaś obfitowała w chłodne noce, chociaż dni były gorące.



Fig. 1.



Fig. 2.

### Résumé.

Une nouvelle (?) aberration d'*Argynnis lathonia* ab. *neopina* mihi avec une photographie de deux exemplaires. Localité de capture: Sędzin (distr.: Buk, voïevodie: Poznań).