

Fauna motyli (*Macrolepidoptera*) okolic Ciężkowic
koło Tarnowa. Część II.

Macrolepidoptera des environs de Ciężkowice près
de Tarnów (Pologne). Deuxième partie.

napisał

WŁODZIMIERZ TOMEK

W niniejszej notatce pomieszczam wyniki moich badań nad fauną motyli większych okolic Ciężkowic, przeprowadzonych w latach 1944-1954. Dane tu zawarte stanowią uzupełnienie i ciąg dalszy pracy, którą opublikowałem w XVIII tomie Polskiego Pisma Entomologicznego¹. Oprócz własnych materiałów wykorzystuję również zbiory inż. Zb. Regieca. W oznaczeniu wymienionych niżej gatunków udzielał mi pomocy mgr S. Błęszyński. Obu tym panom składam serdeczne podziękowania.

Schwytałem następujące gatunki nowe dla okolic Ciężkowic:
Zephyrus quercus L., Lipniczka, 25 VII 1943 r.
Cybosia mesomella L., Kąсна Dolna, 21 VI 1950 r.
Poecilocampa populi L., Ciężkowice, 10 XI 1940 r.
Lasiocampa trifolii Esp., Tursko, 6 VIII 1940 r. (1 okaz *ex larva*)
Drepana curvatula Bkh., Tursko, 23 V 1941 r.
Drepana binaria Hufn., Ciężkowice, 3 VI 1951 r.
Amorpha populi L., Ciężkowice, VII 1948, Kąсна Dolna, VII 1950 r. Gatunek ten występuje w okolicach Ciężkowic bardzo rzadko.

¹ Tomek, W., Fauna motyli większych rezerwatu „Skamieniałe Miasto“ w Ciężkowicach i okolicy. Pol. Pismo Entom., Wrocław, 18, 1939-1948, p. 182-220.

- Polyploca flavicornis* L., Ciężkowice, 6-17 IV 1940 r.
Zeuzera pyrina L., Ciężkowice, 2 VIII 1952 r.
Hepialus hecta L., Lipniczka, 6 VII 1940 r.
Acronycta leporina L., Pławna, 3 VII 1941 r., 23 VIII 1943 r.
Euxoes segetum Schiff., Ciężkowice, 23 VIII 1940 r.
Rhyacia plecta L., Ciężkowice, 28 V, 3 VI, 4 VI 1951 r.
Polia genistae Bkh. Ciężkowice, 15 V 1951 r.
Polia dissimilis Knoch., Ciężkowice, 25 VI 1950 r., 15 V 1951 r.
Polia nana Hufn., Ciężkowice, 27 V 1950 r., 15 V 1951 r.
Harmodia rivularis F., Ciężkowice, 27 VIII 1940 r., Lipniczka,
 10 VII 1942 r.
Aplecta tincta Brahm., Ciężkowice, 26 VI 1941 r.
Hyphilare albipuncta F., Ciężkowice, 4 VI 1951 r.
Sideridis pudorina Schiff., Ciężkowice, VI 1942 r.
Cuculia prenanthis Bsd., Ciężkowice, 4 V 1951 r.
Calophasia lunula Hufn., Ciężkowice, 27 V 1951 r.
Brachionycha sphinx Hufn., Ciężkowice, 7 X 1951 r.
Meganephria oxyacanthae L., Ciężkowice, 2 X 1951 r. W r. 1951
 wystąpił licznie, w inne lata gatunku tego nie łąpałem.
Crino satura Schiff., Ciężkowice, 14 IX 1950 r.
Mania maura L., Ciężkowice, 31 VII 1953 r.
Calamia virens L., Lipniczka, VII 1942 r.
Ephesia fulminea Scop., Ciężkowice, 9 VIII 1951 r., 14 VII 1953 r.
Brephos nata Hbn., Ciężkowice, 29 III 1953 r.
Acidalia incanata L., Ciężkowice, 24 VII 1950 r., 3 VI 1951 r.
Cidaria cuculata Hufn., Ciężkowice, 17 VI 1951 r.
Cidaria galiata Schiff., Ciężkowice, 3 VI 1951 r.
Cidaria badiata Schiff., Ciężkowice, 5 IV, 7 IV 1953 r.
Ennomos autumnaria Wrnbg., Ciężkowice, 27 IX 1952 r.

W ten sposób ilość gatunków motyli większych złowionych w okolicach Ciężkowic wzrasta do 310.

RÉSUMÉ

Le présent travail est un supplément à la liste des Macro-lépidoptères des environs de Ciężkowice près de Tarnów, publiée dans le volume XVIII de ce Bulletin.