

Zu der

# Öffentlichen Prüfung

## aller Classen

des

### Königlichen Gymnasiums zu Ratibor

den 4. und 7. April,

und dem

mit Entlassung der Abiturienten verbundenen

## Redeactus

den 20. April

luden ergebenßt ein

Director und Lehrer-Collegium.




### Inhalt:

1. Grundlage zur Kenntniß der Kaiser Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor.  
Vom Oberlehrer Kelch.
2. Schulnachrichten vom Director Dr. Mehlhorn.

Ratibor, 1846.

Druck von Bögner's Erben.

P 5475.



In entomologischer Hinsicht fehlt es an einem Werke, wodurch wir von den Insecten Schlesiens eine ebenso vollständige Uebersicht gewinnen, wie wir sie hinsichtlich der Pflanzen durch Wimmer's Flora von Schlesien und Grabowksi's Flora von Oberschlesien erhalten haben. Um die Bearbeitung eines solchen Werkes möglich zu machen, muß das bereits Bekannte zusammengestellt und zum weiteren Gebrauche veröffentlicht werden. Da aber der Einzelne nicht alle Gegenden hinlänglich genau durchforschen kann, so erscheint es nöthig, daß diejenigen, welche Gelegenheit hatten, gewisse Gegenden besonders kennen zu lernen, die Ergebnisse ihrer Bemühungen mittheilen. Seit 1819 habe ich Oberschlesien und besonders die Umgegend von Ratibor, naturhistorische Zwecke verfolgend, nach allen Richtungen hin durchforscht und die Ergebnisse geru denen mitgetheilt, welche davon Gebrauch zu machen wünschten. Dergleichen Mitheilungen machen oft viel Arbeit, rauben viel Zeit und bleiben dennoch lückenhaft. Darum entschloß ich mich in vorliegender Arbeit eine Grundlage zur Kenntniß der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor, zu geben; um, wenn es die Umstände gestatten, seiner Zeit mit den übrigen Ordnungen der Insecten, in denen ich verhältnismäßige Vorräthe zusammengebracht habe, fortzufahren und durch Nachträge die weitere Vollständigkeit zu fördern. Leider mußte ich mich über Lebensweise, specielle Aufenthaltsorte &c. sehr kurz fassen, obgleich es mir wünschenswerth erscheint, daß bei weiteren Bearbeitungen darauf mehr Rücksicht genommen werde, als es bisher, selbst in sonst sehr guten Werken, geschehen ist. Uebernehmen es Andere, die Erfolge ihrer Bemühungen auf ähnliche oder noch bessere Weise zu veröffentlichen, so dürfte es möglich werden, eine vollständige Uebersicht &c. der Insecten Schlesiens zu gewinnen und ein ausreichend lehrreiches Werk vorzubereiten. Mich darüber, so wie über die Gründe, warum ich den von dem geheimen Regierungsrath Schmidt in Stettin entworfenen Catalog zum Grunde gelegt habe, und noch über manches Andere weiter auszusprechen, ist jetzt nicht zulässig; darum nur noch einige Bemerkungen zum besseren Verständniß der nachstehenden Arbeit.

Unter Umgegend von Ratibor verstehe ich allerdings zuerst die nächsten Umgebungen der Stadt Ratibor, schließe jedoch im weiteren Sinne alle diejenigen Orte mit ein, welche von mir zwar seltener, aber doch alle Jahre mehr oder weniger oft besucht werden. Die Grenze dieser erweiterten Gegenden beginnt mit der Mündung der Olfa in die Oder, geht die Olfa aufwärts bis zur Grenze des Ratiborer- und Rybniker Kreises. Von da ab zieht sie sich nordöstlich, die Städte Loslau und Rybnik mit einschließend, bis Pilchowitz, wo sie die Bira wka bis zu ihrer Einmündung in die Oder verfolgt. Hier, die Oder überschreitend, geht sie in süd-westlicher Richtung über Bauerwitz, Deutsch - Neukirch und Massiedel an die Oppa, verfolgt die Oppa bis zu ihrer Mündung in die Oder, dann die Oder bis zur Mündung der Olfa in dieselbe. Was außerhalb dieser Grenze liegt, gehört dem weiteren Oberschlesien an, wozu ich, wie auch Wimmer in seiner Flora von Schlesien gethan hat, das diesseitige Kłocicz-Gebirge mit dem Teschner Gebiete und das Gesenke rechne.

Die erweiterte Umgegend von Ratibor ist ein Wellenland, worin sich keine eigentliche Ebene vorfindet und wird durch die Oder in zwei der Natur nach sehr

verschiedene Theile getheilt. Der Theil auf der linken Seite der Oder zeichnet sich durch fruchtbare Uckerland aus, so daß verhältnismäßig nur noch wenig Wald, zuwen Theil gemischtes Holz, vorhanden ist, indeß die rechte Seite der Oder, außer dem eigentlichen Oderthal und den nächsten Angrenzungen, schon viel todten Sand und ausgedehnte Nadelholz= (meist Kiefer=) Waldungen hat. Durch diese Eigenthümlichkeiten und durch den Einfluß der nur 6 bis 9 Meilen entfernten Gebirge (Gesenke und Klocacz= Gebirge) repräsentirt diese Gegend fast ganz Oberschlesien, wovon ich mich auf meinen weiteren Excursionen überzeugt habe. In diesem einzegrenzten Raume zeichnen sich, wie fast überall, gewisse Orte durch besondere Ergebungkeit aus; dahn gehören: die Obora, der Wald hinter Brzezie, beide gehören zu dem etwas über  $\frac{1}{2}$  Meile von der Stadt entfernten Höhenzug, die Brzezier= Berge genannt und bestehen aus gemischem Laub- und Nadelholz mit vielem Quellgrunde. Der Storchwald, Dominikaner= Wald und Lehnstofer Wald liegen in ähnlicher Entfernung im Oderthale und sind Reste der früheren Eichenwälder, welche sich im Oderthale hinzogen. Der Pawlauer= Wald, in fast gleicher Entfernung und unweit der Straße nach Bauerwitz gelegen, enthält gemischtes Laubholz, das meist als Gebundholz eingeschlagen wird. Der Doctor = Damm ist ein mit Linden bepflanzter Spaziergang in der nächsten Umgebung der Stadt. Die Landecke, der Mündung der Ostrawiza in die Oder gegenüber, ist ein Höhenzug, der im Innern Steinkohlen birgt und mit gemischem Laub- und Nadelholz bewachsen ist. Die Oderufer, die Ränder der Teiche, die Parthien um Borutin, Sawade, Kuchelna, Katscher, Adamowic, Rauden, Rybnik &c. können nicht weiter berührt werden. — So wie die Gegend um Karlsbrunn, Möltsch, Grätz, Ustron &c. das Gebirge vertreten, so dürften die Gegenden um Rosenberg, Kupp, Kraschew, Falkenberg &c. das eigentliche Flachland repräsentiren. Reiche Ausbeute gewährte mir im Juli 1844 die Gegend um Kupp, wo ich nächst vielen anderen interessanten Insecten, auch die sonst in Schlesien sehr seltene Argynnis Daphne in 40 Ex., ausschließlich auf Brombeersträuchern, fing.

Die mit Cursivschrift gedruckten Species gehören zwar Oberschlesien, aber nicht der Umgegend von Natibor an. Die hinter den Namen stehenden Ziffern zeigen die Monate an, in denen die betreffenden Individuen gefunden wurden.

Ist kein bestimmter Fundort angegeben, so findet man diese Species an verschiedenen Orten, aber an keinem vorwaltend, oder der spezielle Fundort war nicht mehr zu ermitteln.

Die \* deuten an, daß ich davon mehrere, die \*\* aber, daß ich nur einzelne Ex. abgeben kann.

Die am Ende eingeschlossenen latein. Buchstaben, sind die abgekürzten Namen derjenigen Herren, welche mir über das Vorhandensein der betreffenden Individuen Mittheilung gemacht haben, wosfür ich ihnen hiermit den verbindlichsten Dank sage, und um weitere Mittheilungen bitte.

(v. F.) heißt von Fuchs, Forst-Candidat in Kraschew. — (H.) h. Härtel, Stud. phil. in Breslau. — (Kb.) h. Kaboth, Forst-Candidat aus Kupp. — (Rd. od. Rds.) h. Radzay, Oberförster in Thiergarten bei Falkenberg. — (Ralsch.) h. Rendschmidt, Oberlehrer in Breslau. — (Th.) h. Thomas, Cantor in Natibor. — (v. U.) h. von Uechtritz, Naturforscher und Privat-Gelehrter &c. in Breslau. — (Z.) h. Zebe, Obersöster in Volpersdorf in der Grafschaft Glatz, früher in der Nähe von Natibor.

Weitere Abkürzungen sind:

Bmf.: Baumfäimme &c. — Bl.: Blüthen, Blumen &c. — Bischp.: Bischofskoppe. — Brz. W.: Brzezier Wald. — Dom.: Dominikaner-Wald. — Dr. D.: Doctor-Damm. — Dgr.: Dünzer. — Gebg.: Gebg. Gebg.: Gebirge. — Gem. Gmille. &c. — Gemille. — Ldk.: Landecke. — Lb.: Laub. — Lbhz.: Laubholz. — Lhnft.: Lehnroß. — Mr.: Moos. — Ob.: Obora. — R.: Natibor. — Pw.: Pawlauer-Wald. — Stw.: Storchwald. — Uebers.: Uebersicht der Arbeiten &c. der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. — (Andere Abkürzungen werden leicht zu ermessen sein.)

# I. Pentamera.

## 1. Caraboidea.

### 1. Cicindela. Linné.

1.\* *campestris* L. Sommer. Adamowicz, Rauden Kupp, Karlsbrunn, Ustron, an freien, der Sonne ausgesetzten Stellen; im Lande besonders auf freien Sandplänen, obgleich vereinzelt, dennoch z. häufig.

2.\* *hybrida* L. desgl.

3.\* *sylvicola* Mgl. 6—9. Edke., Adamowicz, Rybnik, Rauden, z. selten; bei Ustron a. Wege nach der Czantori z. häufig.

4.\* *sylvatica* L. 5—8. Auf freien Sandplänen des flachen Landes, z. B. Adamowicz, Rauden, Rybnik, Kupp u. z. häufig.

5.\* *germanica* L. 6—8. Auf Brachen bisweilen s. häufig.

### 2. Odacantha Pk.

6. *melanura* L. 6. 8. Ob., unter Moos, s. selten.

### 3. Tarus Clairv. (Cymindis Ltr.)

7. *humeralis* F. 6—8. Ob., unter Moos, Ultvater, unter Steinen, selten.

### 4. Dromius Bon.

8. *sigma* Ross. 6. 7. Ob., Borutin, unter Moos, s. selten.

9.\* *fasciatus* F. 5—8. An der Oder, b. Borutin, im Gemille, z. selten.

10. *4-notatus* Zenk. 6. Ob., unter Moos, s. selten.

11.\* *4-maculatus* L. 3—7. Ob., Sw., Lubliniz, unter Moos, z. häufig.

12.\* *fenestratus* F. Bei Lubliniz. (Rösch.)

13.\* *agilis* F. Im Frühjahr unter Moos, Ob., Sw., Rybnik, Sawada, häufig.

14. *marginellus* F. 5. Ob., unter Moos, s. selten.

15. *glabratus* Mgl. 10. desgl.

16. *maurus* Mgl. desgl.

17.\* *soveola* Gyll. 3—10. Ob., Nakau, Kupp, unter Moos, z. selten.

18.\* *truncatellus* L. 3—10. Ob., Dr. D., Ob., Kupp, Lubliniz, Karlsbrunn, Ustron, unter Moos, um Baumstämme, unter Gemüse, häufig.

19.\* *quadrillum* Dft. 7. Nur in Ustron, an d. Weichsel unter Steinen, z. selten. var. *2-punctatum*, ebendaselbst, 1 Er.

Anm.: *Dromius punctifer* (s. Bericht d. schles. Ges. für vaterl. Cultur, 1829 p. 53) habe ich nicht wieder gesehen.

### 5. Lebia Latr.

20.\* *chlorocephala* Gyll. 5—9. Unter Moos, um Baumstämme, im Gemüse nach Überschwemmungen u. im Gebirge unter Steinen, bisweilen z. häufig.

### 6. Brachinus Web.

21.\* *crepitans* L. Wie 20. var.: *nigripennis* z. selten.

### 7. Clivina Latr.

22.\* *fossor* L. 5—10. An der Oder auf feuchtem Sande, in Wäldern unter Moos, im Gebirge, an den Ufern der Flüsse, unter Steinen, z. häufig.

23.\* *collaris* Hb. (*discipennis* Mgl.) desgl.

### 8. Dyschirius Bon.

24.\* *thoracicus* F. 5—7. Auf feuchtem Sande an der Oder, z. häufig.

25.\* *nitidus* Dj. desgl., aber seltener.

26.\* *chalceus* Er. desgl.

27. *politus* Dj. desgl., eben so selten.

28.\* *aeneus* Zgl. desgl.

29.\* *pusillus* Dj. desgleichen.

30.\* *gibbus*. 4—10. An der Oder wie 24, in Wäldern unter Moos, Ustron an der Weichsel und Karlsbrunn an der Oppa, unter Steinen, s. häufig.

9. *Cychrus* Web.

31. *\* rostratus* L. 5—10. In Wäldern unter Moos ob. unter Steinen, Ob., Edke., Kupp, Krascheow, Ustron, Karlsbrunn z. z. häufig.  
 32. *attenuatus* F. 6. 7. Wie 31. bei Gräß, Möltisch, Karlsbrunn, aber s. selten.

10. *Procrustes* Bon.

33. *\* coriaceus* F. Sommer. In Wäldern unter Moos, in hohlen Stöcken, unter Steinen, im angeschwemmten Gemille; Ob., Edke., Kupp, Krascheow, Ustron, Karlsbrunn, z. häufig, wenn auch vereinzelt.

11. *Carabus* L.

34. *Scheidleri* F. Beneschau, im angeschwemmten Gemille, in Klocacz-Geb. in einem verfaulten Stocke, s. selten.

35. *\* Preyssleri* Dft. Sommer. In der nächsten Umgegend an Wegen, in trocknen Gräben, unter Moos, im angeschwemmten Gemille, früher z. häufig, jetzt z. selten. Am Ultwater einige Ex. unt. Steinen.

36. *coeruleus* Andr. 5. Auf dem Radosch im Klocacz-Geb., 2 Ex. unter Steinen.

37. *\* catenulatus* Pz. 5—8. In Kieferwäldern unter Moos und zurückgebliebenen Resten von Waldstreu, bei Hammer, Nauden, Krascheow, z. selten; dagegen bei Kupp s. häufig; hier fing ich im Juli 1844 an 50 Ex. und hätte ihn im Mai 1845 eben so oft fangen können.

38. *\* arvensis*. F. 5—8. Im Lande mit 37 zusammen, aber auch getrennt; im Geb. z. B. b. Ustron, Möltisch, Karlsbrunn unter Moos und unter Steinen z. selten. var. *virescens* bei Ustron, 2 Ex.

39. *\* cancellatus* Ill. Wie 37 u. 38. z. häufig.

40. *\* Ullrichii* Zgl. (*morbillosus* Pz.) 5—9. In der nächsten Umgegend v. R., b. Kupp z. z. häufig. 1844 wurden hier mit einem umgestürzten Blumennapfe, worunter sich

ein todter Maulwurf befand, an 40 Ex. gefangen.

41. *\* granulatus* L. 5—9. In der nächsten Umgegend z. häufig, seltner im Gebirge.

42. *clathratus* L. 7. Zwischen Oppeln und Kupp unter Waldstreu, jedoch selten.

43. *nodulosus* F. Bei Krascheow im Novb. 1845 in Kiefern- und Eichenstöcken 3 Ex. (v. F.) 7. am Ultwater, zwischen Waldenburg und Karlsbrunn, bei Hubertskirchen, am Rande der Gebirgsbäche, z. selten.

44. *\* auronitens* F. 5—9. Unter Moos oder Steinen, Edke., Kupp, Gräß (die Nymphe in einem verfaulten Buchenstock), Möltisch, Ustron, Karlsbrunn, überall z. selten.

45. *nitens* L. Sommer. Adamowitz, Hammer, Budzin, Rybnik (im Kuhdüniger), Kupp, Krascheow, Klocacz-Geb., Gesenke, überall selten.

46. *\* violaceus* L. 5—10. Unter Moos, Gemille, in faulen Stöcken und Stämmen, Ob., Edke., Kupp, Rosenberg, Krascheow, Klocacz-Geb. (im Mai 1839 fing ich auf der Gantori an 30 Ex. in einem verfaulten Buchenstamme), im Gesenke, überall häufig.

\* var. *glabrellus* Zgl., s. selten.

47. *\* glabratius* Pk. Wie 46, jedoch seltener.

48. *\* nemoralis* Müll. 5—8. Ob., Edke., selten; Kupp, Krascheow, mit 37 zusammen und besonders Ende Mai sehr häufig, Karlsbrunn z. selten.

49. *\* convexus* F. 5—9. In Gärten, Ob., Edke., Kupp, z. häufig; Ustron, Karlsbrunn, z. selten.

50. *\* hortensis* L. (*gemmatus* F.) 5—9. Ob., Edke., Beneschau, z. selten; Kupp, mit 37 zusammen, aber mehr im Laubholz unter Spänen z. s. häufig; Ustron selten.

51. *sylvestris* Hellw. 5—8. Im Klocacz-

- Geb. (Radosch, Czantori) und Gesenke (Alt-  
vater), z. selten.
52. *Linnaei* Mgl. 5—9. Bei Krascheow in  
Sichtensöden im Novr. 1845 eine Menge  
Ex. (v. F.). Sonst nur im Gebirge, so-  
wohl im Gesenke als im Kłocacz = Geb. s.  
häufig.
- 53.\* *intricatus* L. 5—8. Bschkp., Altvater,  
Czantori, unter Steinen, z. selten.
54. *Creutzeri* F. 7. Am Altvater um einen  
faulen Stock, 2 Ex.
55. *Fabricii* Mgl. 5. Auf dem Radosch, im  
Kłocacz-Geb., 3 Ex.
56. *irregularis* F. 7. Am Altvater, zw. Wal-  
denburg und Karlsbrunn, an feuchten Stel-  
len um Baumstämme und Stöcke, z. selten.
12. *Calosoma* Web.
- 57.\* *sycophanta* L. Sommer. Ob., Hammer,  
Randen, Peiskretscham, Kupp, Kraschewo,  
bisweilen, namentlich beim Raupenstraß s.  
häufig; so half er 1840 in Kupp die Rau-  
pen von *Bomb. dispar*, *Noctus piniperda*  
ic. und vor einigen Jahren bei Peiskret-  
scham *Bomb. monacha* vertilgen.
- 58.\* *inquisitor* L. An denselben Orten, aber  
seltener, auch häufig unter Moos.
59. *sericeum* F. Rosenberg, in Kartoffelfel-  
dern. (Rdschm.).
13. *Leistus* Froehl.
- 60.\* *ferrugineus* L. (*spinilabris* F.) 5—8.  
Unter Moos, Gemille ic., Ob., Ebke, Ustron,  
z. häufig.
61. *rufescens* F. 7. Ustron, s. selten.
62. *analis* F. 7. Karlsbrunn, z. selten.
14. *Nebria* Latr.
63. *livida* L. (*sabulosa* F.) 6. An der Oder,  
in den Weidenwickeln, 1 schönes Ex.
- 64.\* *picicornis* F. 8. Unter einem Steine am  
Rande eines Kornfeldes zw. Altendorf u.  
Doms-Höhe, 1 Ex., Ustron, 1845 an der  
Weichsel, unter Steinen, 20 Ex.
65. *brevicollis* F. 6. Ebke., unter Steinen, 2  
Ex., auf dem Radosch im Kłocacz-Geb. z.  
häufig.
66. *Gyllenhallii* Sch. 7. Karlsbrunn, unter  
Steinen an der kl. Oppa, selten.  
Unn.: Auch soll *N. brunea* Dft. nach Sturm  
ic. Deutschl. Ins. Fauna III. p. 149  
ic. in öster. Schlesien gefunden werden.  
Mir ist d. Käfer noch nicht vorgekommen.
15. *Omophron* Latr.
- 67.\* *limbatum* F. Sommer. Gegend Abend  
an der Oder auf feuchtem Sande, s. selten.
16. *Blethisa* Bon.
- 68.\* *multipunctata* F. Bisweilen im ange-  
schwemmten Gemille, z. häufig.
17. *Elaphrus* F.
- 69.\* *uliginosus* F. An der Oder, selten.
- 70.\* *cupreus* Mgl. desgl.
- 71.\* *riparius* F. An der Oder und ähnl. feuch-  
ten Stellen, bis ins Gebirge, z. häufig, auch  
bei Giesmannsdorf unweit Neiße (H.).
- 72.\* *aureus* Müll. desgl.
18. *Noctiophilus* Dum.
- 73.\* *aquaticus* F. 5—8. An der Oder auf  
feuchtem Sande, an der Weichsel b. Ustron  
unter Steinen, Kupp, unter feuchtem Moos.
- 74.\* *palustris* Dft. desgl. auch bei Lubowitz.
- 75.\* *semipunctatus* F. Ob. ic., Borutin, Kupp,  
Krascheow, Ustron, Karlsbrunn ic. unter  
Moos und unter Steinen, häufig.
19. *Pangaeus* Latr.
- 76.\* *crux major* F. Im angeschwemmten Ge-  
mille oft s. häufig, selten unter Moos.
77. *4-pustulatus* St. Den 2/4. 43 b. Brzezie  
unter Moos 2 Ex.
20. *Loricera* Latr.
- 78.\* *pilicornis* F. Ob., an der Oder, Kupp,  
Möltisch, Ustron, Karlsbrunn ic. unter  
Moos, Steinen, angeschwemmten Gemille  
s. häufig.

- 21. Callistus Bon.**
79. *Iunatus* F. Lukasine, Brzezie, Freivaldau in östr. Schlesien, unter Moos; s. selten.
- 22. Chlaenius Bon.**
80. *vestitus* F. Im angeschwemmten Gemille, z. selten.
- 81.\* *Schrankii*, 6—8. Obora, Kupp, Ustron, unter Moos und Gemille, nicht selten.
- 82.\* *nigricornis* F. desgleichen.
83. *holosericeus* F. 6—8. Obora, unter Moos, s. selten.
84. *sulcicollis* Pk. 6—8. Beneschau, auf feuchten Wiesen z. selten. (Z.)
- 23. Oodes Bon.**
- 85.\* *helopiooides* F. Im angeschwemmten Gemille bisweilen z. häufig.
- 24. Licinus Latr.**
86. *depressus* Pk. In Neugarten b. R., am Wege laufend, 1 Er., (Th.)
87. *Hoffmannseggii* Pz. 7. An der Mooslehne bei Karlsbrunn (v. U.).
- 25. Badister Clairv.**
- 87,\* *2-pustulatus* F, 6. An der Oder, Ob., Zabre b. Beuthen, z. selten.
- 88.\* *peltatus*. An der Oder, z. selten.
- 89.\* *humeralis* Bon. 6—8. Ob., a. d. Oder, selten.
- 26. Patrobus Mgl.**
- 90.\* *excavatus* Pk. 4—10. Ob., a. d. Oder, z. häufig; Ustron an d. Weichsel, Karlsbrunn an d. Oppa, unter Steinen s. häufig.
- 27. Dolichus Bon.**
91. *flavicornis* F. 6—9. Studzienka, Altendorf, an Getreidefeldern früher z. häufig, jetzt s. selten. Kommt auch bei Rosenberg vor.
- 28. Pristonychus Dej.**
92. *terricola* Hb. 7. 8. R. und Sawada, in Kellern und ähnl. Orten, s. selten.
- 29. Calathus Bon.**
- 93.\* *cisteloides* Jll. 3—10. Ob., Escheit, Kupp,
- Krascheow, Ustron, Karlsbrunn u. unter Moos, Gemille, Steinen z. häufig.
- 94.\* *fulvipes* Gyll. 5—7. Ob., Pv., unter Moos und Gemille, z. selten.
- 95.\* *fuscus* F. 4—8. Wie 93, auch a. d. Oder.
- 96.\* *glabripennis* St. 5—8. Adamowicz, Kupp, unter Waldstreu, z. häufig.
97. *micropterus* Zgl. 5—9. An d. Oder im angeschwemmten Gemille, sonst in schattigen Wäldern unter Moos od. Steinen, Ob., Karlsbrunn (Grützeberg, Mooslehne) z. selten.
- 98.\* *melanocephalus* F. 3—10. Unter Moos, Steinen, Gemille bis ins Geb., überall häufig.
- 30. Taphria Bon.**
- 99.\* *vivalis* Jll. 5—8. Obora, Edke., Ustron Karlsbrunn wie 97.
- 31. Sphodrus Clairv.**
- 100.\* *leucophthalmus* L. 7. 8. R., Sawada, Landsberg, Ustron in Kellern und ähnl. Orten, z. selten. 1843 fand ich ihn in Ustron in einer feuchten Wohnstube (in der Nacht) mit Blaps mortisaga in einem heftigen Kampfe.
- 32. Anchomenus Bon.**  
(*Platynus* Bon.)
101. *scrobiculatus* F. 7. Edke., s. selten.  
(*Anchomenus* Bon.)
- 102.\* *angusticollis* F. 3—11. Überall bis ins Gebirge, s. gemein.
- 103.\* *prasinus* F. 3—11. Unter Moos, um Baumstämme, im Gemille, unter Steinen u., bis ins Gebirge, aber besonders a. Dr. D., s. häufig.
- 104.\* *albipes* F. 5—8. Ob., an d. Oder, z. selten, b. Ustron a. d. Weichsel s. häufig.  
var. *ruficollis* besonders bei Ustron z. häufig.
105. *oblongus* F. 6. 7. Ob., Kupp, s. selten.  
(*Agonum* Bon.)
- 106.\* *marginatus* L. 5—9. Ob., an d. Oder, Beneschau u. im angeschwemmten Gemille

- bisweilen s. häufig; sonst unter Laub und Moos, um Baumwurzeln, z. selten.
107. austriacus F. Beneščau, nach einer Ueberschwemmung einige Ex. unter einer Menge von 108.
108. modestus St. Früher, wo die Oder häufiger ausgoß, unter Gemille um Sträucher, besonders auf den ehemaligen Fleischerwiesen, s. häufig; jetzt, nachdem letztere zu Ackerland umgeschaffen worden, s. selten. Ich habe früher sehr viele Ex. als Agorum austriacum Dft. versandt. Der Unterschied z. 107 u. 108. dürfte durch Uebergangs-Ex. s. zweifelhaft werden.
- 109.\* 6-punctatus L. Ueberall, bis ins Geb., s. gemein. Die var. b., mit unrein-bräunlichen Flügeldecken ließ ich, als alte, ausgefärzte Ex. laufen.
- 110.\* parumpunctatus F. Wie 109, auch in verschiedenen Färbungen.
- 111.\* elongatus Dj. 6. Bei Körberwitz an einer nach Salz schmeckenden Quelle einige Ex.
- 112.\* viduus Kug. 5—9. Unter Moos, Gemille, Steinen ic. bis ins Gebirge, z. häufig.
- 113.\* versutus St. 5—8. Obora, Pw., unter Moos, s. selten.
114. lugens Zgl. 7. 1845 b. Uſtron 2 Ex.
- 115.\* moestus Zgl. 5—8. Ob., Pw., Uſtron, z. selten.
- 116.\* micans Nicol. 5—8. An d. O., z. selten, Bösch., z. häufig.
- 117.\* gracilis St. 5—8. Ob., a. d. Ob., selten.
- 118.\* picipes F. 5—9. Ob., Pw., a. d. Ob., Seitendorf b. Benešč (v. U.) zuweilen z. häufig.
119. pelidnus Hb. Adamowicz, Landsberg (Rdsch.), s. selten.
- 120.\* 4-punctatus De G. 6. 7., Obora, unter Moos, s. selten.
121. rotundatus, 6. 7. Ob., Edke., unter Moos, s. selten.
122. punctatus F. Bei Lubliniz. (Rdsch.)
- 123.\* cupreus L. 3—10. Ueberall bis ins Geb., in den mannigfältigsten Wänderungen, woraus sich sehr leicht assinis St., coeruleascens F., splendida Falda., erythropus St., niger u. a. Var. bilden lassen. Als eigene Art dürfte vielleicht
- 124.\* versicolor St. sich herausstellen, bisweilen unter Steinen, Ziegeln ic. um altes Mauerwerk vorkommend.
125. dimidiatus Ol. 6—8. Bösch., Ulster, Gotthausberg b. Friedeberg, unter Steinen, selten.
- 126.\* lepidus F. 5—9. Ob., Edke., Ratsch., Kupp, Uſtron, Karlsbrunn, z. häufig und zwar in sehr verschiedenen Färbungen.
127. striatopunctatus Mgl. 5—7. Fand sich früher in d. Ob. unter Moos z. häufig, jetzt s. selten.
- (Argutor Mgl.)
- 128.\* vernalis F. 4—7. Ob., Edke., Uſtron, Karlsbrunn, unter Moos und Steinen z. häufig.
- 129.\* eruditus Mgl. 4—7. Ob., Edke., z. selten.
- 130.\* rotundicollis Dft. desgl.
- 131.\* strenuus Kug. 4—8. Ob., Kupp, Uſtron, z. häufig.
- 132.\* unctulatus Latr. 5—8. Ob., Karlsbrunn (Mooslehne, Leiterberg), selten.
- (Omaseus Zgl.)
- 133.\* leucophthalmus F. 3—10. R., Kupp, Uſtron, Bösch. Gesenke ic. s. gemein.
- 134.\* nigrita F. desgl., aber nicht so häufig.
- 135.\* anthracinus Ju. desgl., nur noch seltener.

- 136.\* *gracilis* St. 6. 7. Ob., auf Wiesen unter angeschwemmten Gemüll z. häufig.
- 137.\* *minor* D. 6—8. Ob., Kupp, unter Moos, Ustron, unter Steinen, z. selten.
- 138.\* *aterrimus* F. 6—8. Ob., Kupp, unt. Moos, Ustron, Altvater, unt. Steinen; z. selten.  
(*Steropus Mgl.*)
139. *madidus* F. 6. Edke., s. selten.
140. *aethiops* Ill. 7. Kupp, in einem verfaulten Stocke 1 Ex., Karlsbrunn (Mooslehne) (v. U.)
141. *cordatus* Letz. 7. Ustron, am Wege a. die fl. Gzantori, Karlsbrunn (Mooslehne v. U.)  
(*Platysma Bon.*)
142. *picimanus* Crtz. Wie 108.
143. *maurus* Dft. 7. Im Kłocacz-Geb., selten.
144. *angustatus* Mgl. 7. Kupp, unt. Spänen im Laubwalde, 1844, 2 Ex.  
(*Adelosia Sph.*)
- 145.\* *Iatibulus* St. 7. Ustron, 1839 an 30 Ex., Karlsbrunn 1837 einige Ex., im Walde unter Steinen.
- 146.\* *oblongopunctatus* F. 5—8. Ob., Edke., Kupp, Möltch, Ustron, Karlsbrunn, unter Moos und Steinen, z. häufig.  
(*Pterostichus Bon.*)
- 147.\* *niger* F. 4—9. Ueberall, bis ins Geb., unter Moos, Steinen u. z. häufig.
- 148.\* *fossulatus* Pr. 4—7. Unter Steinen im Kłocacz-Geb. (Radisch, Lissa, Gzantori) und zwar im zeitigen Frühjahr am Fuße der Berge, später nur auf Kuppen und Kämmen derselben.
- 149.\* *metallicus* F. 5—8. Ob., Edke., Kupp, Kłocacz-Geb., Gesenke, unter Steinen, z. häufig.  
(*Abax Bon.*)
- 150.\* *striola* F. 5—8. Ob., Ustron, Karls-
- brunn, Bischöp., unter Moos und Steinen, häufig.
- 151.\* *carinatus* Dft. 5—7. Ob., z. selten, Kupp. mit Car. *catenulatus* Pz. zusammen, z. häufig.
- 152.\* *ovalis* Mgl. Wie 150, außerdem auch bei Kupp.
- 153.\* *parallelus* Dft. desgl.
- 154.\* *Rendschmidtii* Hartlieb. Wurde 1826 zuerst von Rendschmidt und mir nach hohem Wasserstande am Oderufer um eine alte Weide in sehr großer Zahl gefunden. Später fand ich ihn auch hinter Plania unter Moos und Gemüll unter Sträuchern. Später, nachdem die Oder das Ufer, wo die Weide stand, weggerissen, schien er ganz verschwunden zu sein, bis ihn vor einigen Jahren Herr Cantor Thomas in der Obora auffand, wo wir ihn im zeitigen Frühjahr an feuchten Stellen unter Moos, wiewohl sehr selten und nur bei fortgesetztem Nachgraben, bis Ende Mai fanden; später ist er spurlos verschwunden. Herr Oberförster Zebe hat seine Ex. von mir.
- (Molops Bon.)
- 155.\* *terricola* F. 5—8. Ob., Edke., Kupp Rosenberg, Ustron, Möltch, Karlsbrunn unter Moos und Steinen, häufig.
35. *Broscus* Pz.
- 156.\* *cephalotes* F. 5—8. Ob., Pschorow, Zawada, Kupp, (s. häufig), Krastheow, b. ins Geb., unter Moos u. Steinen z. häufig.
36. *Stomis* Clairv.
- 157.\* *pumicatus* Hl. 5—7. Dr. Dr., Ob., Ratau, unter Moos, um Baumstämme.
37. *Zabrus* Clairv.
- 168.\* *gibbus* F. 7—9. Im Gemüll und an Kornähren, nicht selten.
38. *Amara* Bon.
159. *patricia* Dft. Im Gemüll, selten.

## (Celia Zimm.)

160. *ingenua* Crtz. Unter Ziegeln u. um altes Mauerwerk, an Schutthaufen, z. selten.
161. *monticola* Zimm. 7. Altwater (Rdsch.)
162. *infima* Dej. 3. Ob. unter Moos (H.).
163. \* *bifrons* Gyll. 4—8. R. z. selten, Ustron häufiger.
164. *rufocincta* Manh. 7. Kupp, s. selten.  
(Amara Bon.)
165. *rufipes* Dej. 6. 7. In Gemille, s. selten.
166. *tricuspidata* St. desgl.
167. \* *plebeja* Gyll. 4—10. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, z. häufig.
168. \* *similata* Gyll. desgl. weniger häufig.
169. \* *obsoleta* Dj. desgl., bes. an niedrigen Flussufern.
170. \* *eurynota* Kug. 5—9. Ob., Raka, Kupp, unter Moos, (in Varietäten), z. selten.
171. \* *trivialis* Gyll. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, s. gemein.
172. \* *spreta* Zimm. 6. 7. Ob., Ustron, z. selten.
173. *vulgaris* L. 7. Edle, Karlsbrunn, s. selten.
174. *curta* Dj. 7. R. u. Ustron s. selten.
175. \* *communis* F. desgl., aber häufiger.
176. *puncticollis* (v. Uechtr. Verz. schl. Räfer Nr. 180) 4. Ob., selten.
177. *varians* a. Altwater. (Rdsch.) kenne ich nicht.
178. *montivaga* St. 6. 7. Ob., Paw., selten.
179. \* *familiaris* Crtz. 5—8. Ob., Brzezie, Ustron u. s. häufig.
180. *gemina* Zimm. 7. Ob., s. selten.
181. *tibialis* Z. Rauden, Krascheow, unter Moos in Nadelwäldern, selten.  
(Bradytus Stph.)
182. \* *consularis* Dj. 3—6. Ob., an d. Oder, Möltsch, unter Moos und Laub um Baumstämme, z. selten.
183. \* *apricaria* F. 6—8. Ob., Paw., Bsch., Ustron, z. häufig.

184. \* *fulva* De G. 5—6. desgl.

(Leirus Mgl.)

185. \* *spinipes* L. (picea F.) Um R., Kupp. u. z. selten, häufiger im Vorgebirge, z. B. Bschp. u.

39. *Anisodactylus* Dej.

186. \* *signatus* Jll. 5—8. Ob. unter Moos, a. d. Oder unter Gemille, z. selten.

187. \* *2-notatus* F. Eben daselbst und auch an andern Orten, häufig.

188. \* *spurcaticormis* Zgl. Wie 187, ab. seltener

189. \* *nemorivagus* Dst. Wie 188.

40. *Diachromus* Er.

190. \* *germanus* L. Sommer. R., Zabrze bei Beuthen, Ober-Glogau, unter Gemille u. a. Kornähren, z. selten.

41. *Harpalus* Ltr.

(Ophonus Zieg.)

191. *punctatulus* Dst. 6. Dw., 1 Ex. unter Laub und Moos.

192. \* *azureus* F. 5. 6. Dw., Ob., 4 Ex., wie 191.

193. *puncticollis* Pk. 6. 7. Dw., Borutin, wie 191, s. selten.

194. *brevicollis* Dj. 5—7. Dw., Bschp., wie 191, s. selten.

(Harpalus Ltr.)

195. \* *ruficornis* F. Sommer. Durch d. ganze Gebiet bis ins Gebirge, häufig.

196. \* *griseus* Pz. 4—8. R., Kłocie = Geb., Gesenke, Bschp. selten; b. Kupp z. häufig.

197. \* *aeneus* F. Wie 123. und fast in eben so viel Varietäten.

198. \* *distinguendus* Dst. 4—8. Ob., Paw., unter Moos, selten.

199. *honestus* Andr. Wie 198, s. selten.

200. \* *discoideus* F. 5—7. Ob., Dirschel, unter Moos, selten.

201. *ferrugineus* F. 5—7. Kuchelna, Krascheow, unter Spänen, s. selten.

202. *hottentotta* Dft. var. *ped. ferrugineis*.  
7. Ustron 1 Ex.
203. \* *fulvipes* F. 5—9. Ob., an der Oder, Kupp, Bschp., Ustron, Karlsbrunn, unter Moos, Gemille, Steinen ic., z. häufig.
204. \* *luteipennis* Dft. 5—8. Ob., Kupp, Bschp. wie 203, selten.
205. \* *satyrus* Kn. 5—8. Ob., Edke., Ustron, Karlsbrunn (Mooslehne), wie 203, selten.
206. \* *rubripes* Cetz. 6—8. Ob., Kupp, Bschp., wie 203, selten.
207. *hirtipes* Ill. 6. Ob., unt. Laub, s. selten.
208. \* *impiger* Mgl. 4—8. Ob. an d. Oder, Kupp, z. selten.
209. \* *tardus* Ill. 4—8. Obora, an d. Oder, Bschp., z. selten.
210. *rugulosus* Heer. 7. Ultvater (v. U.)
211. *serripes* Crtz. 6. Edke., 2 Ex.
212. *anxius* Dft. 6. 7. Ob., unter Laub und Moos, s. selten.
213. *servus* Crtz. 5. An d. Oder, unter angeschwemmten Gemille, s. selten.
214. \* *picipennis* Mgl. 6. Edke., Bschp., unter Steinen, s. selten.
- 42. Stenolophus Mgl.**
215. \* *vaporariorum* F. 4—7. Ob. unt. Moos, wo er überwintert, an d. Oder unter Gemille, z. selten.
216. *consputus* Dft. 6. An d. Oder, s. selten.
217. \* *dorsalis* F. 4—10. Ob., an d. Oder, Ustron an d. Weichsel, häufig.
218. \* *suturalis* Zgl. Den 10. Decbr. 1845, Ob., unter Moos und Heidekraut, s. selten (Th.)
219. *brunnipes* St. 5. Dw., unt. Moos, s. selten.
220. \* *meridianus* L. 4—10. R. u. Umgegend, auch b. Ustron, s. häufig.
221. *flavicollis* St. 6. Ob., Kupp, unter Moos, s. selten.
222. *exiguus* Dj. 6. Ob. unt. Laub, s. selten.
- 43. Brandycellus Er.**
223. \* *collaris* Pk. 5—10. Ob., Nakau, Boretin, Kupp, unt. Moos, z. häufig.
224. *scipius* Grm. 7. Kupp, unter Moos im Nadelwald, s. selten.
- 44. Trechus Clairv.**
225. \* *discus* F. 5—7. R. um alte Weiden, s. selten.
226. \* *micros* Hb. 7. Ustron, unter Steinen an d. Weichsel, z. häufig.
227. *littoralis* Zgl. 7. desgl., aber selten.
228. *paludosus* Gyll. 6. Ob., unt. Laub, s. selten.
229. *minutus* F. 5—9. Ob., Paw., Nakau ic. s. häufig.
230. *obtusus* Er. 6. 7. Ob., Ustron, selten; Karlsbrunn (Janowitzer Heide) häufiger.  
var. *alpinus* b. Karlsbrunn (v. U.)
230. *palpalis* Dft. 6. 7. Nakau, Ustron, Ultvater, selten.
232. *rotundipennis* Dft. 7. Karlsbrunn an d. El. Oppa, selten.
233. \* *secalis* Pk. 6—8. Ob., an d. O., Ustron, Karlsbrunn, z. häufig.  
var. *alpestris* a. Ultvater (v. U.).
- 45. Bembidium Latr.**  
(Blemus Zgl.)
234. \* *areolatum* Crtz. 7. Ustron, an der Weichsel unter Steinen, z. häufig.  
(Tachys Mgl.)
235. *2-striatum* Mgl. 7. Ustron, a. d. Weichsel  
unt. Steinen u. ange-  
schwemmten Gemille,
236. *rufescens* Hfsmg. schwemmten Gemille,
237. *5-striatum* Gyll. s. selten.
238. *nanum* Gyll. 6. Ob., s. selten (H.)
239. \* *4-signatum* Crtz. 7. Wie 235—237.
240. *pulicarium* Dj. 5. 6. Dr. D., um Baumstämme, s. selten.  
(Notaphus Mgl.)
241. \* *undulatum* St. 4—8. An d. O., häufig.
242. \* *ustulatum* L. desgl., auch a. d. Weichsel b. Ustron.

243. *obliquum* St. desgl.
244. \* *fumigatum* Grtz. U. denselben Orten, aber s. selten.  
(*Bembidium in spec.*)
245. \* *paludosum* Pz. 5. 6. U. d. Oder, z. selten.
246. \* *striatum* F. desgl.
247. \* *foraminosum* Mgl. desgl.
248. *aerosum* Er. 5. 7. U. d. Oder, Bene-  
schau u. ic. an Teichrändern, s. häufig.
249. \* 2-punctatum L. Nakau, s. selten; Ustron  
a. d. Weichsel z. häufig.  
(*Peryphus Mgl.*)
250. \* *tricolor* F. 6. 7. Ustron a. d. Weichsel  
s. häufig, an d. Olsa und am Prudnik b.  
Waldgrund unter der Bischoffskoppe weniger  
häufig.
251. *modestum* F. 5—8 U. d. Oder und a.  
d. Weichsel b. Ustron z. häufig; b. Pleß  
(Hartlieb).
252. \* *lunulatum* And. 5—8. U. d. Oder, selten.
253. \* *Andreae* F. 5—8. U. d. Oder, in Wäl-  
dern unter Moos u. ic. a. d. Weichsel u.  
a. Orten s. häufig.
254. *fluviatile* Dj. Bei Borutin (Z.).
255. *femoratum* Dj. Wie 253.
256. *saxatile* Gyll. 7. Ustron a. d. Weichsel,  
häufig.
257. *prasinum* Mgl. 5. U. d. Oder, s. selten.
258. \* *fasciolatum* Mgl. 5—8. Ustron, a. d.  
Weichsel häufig, var: sehr in Färbung,  
Größe u. wodurch sich einige besonders  
auszeichnen.
259. *coeruleum* Dj. 7. Ustron a. d. Weichsel,  
Karlsbrunn a. d. fl. Oppa, selten.
260. *complanatum* Heer. 7. U. d. fl. Oppa  
b. Karlsbrunn. (v. U.)
261. \* *tibiale* Mgl. 7. U. d. Weichsel b. Ustron,  
z. selten.
262. \* *decorum* Zenk. 7. Mit 261., und a.  
d. fl. Oppa b. Karlsbrunn, z. häufig.
263. *distinctum* Dj.
264. *fulvipes* St. } Wie 261., s. selten.
265. *fuscocrine* Dj. }
266. *rufipes* Ill. 5. Ob. unter Moos, 7. wie  
261., selten; auch var: *palpalis*.
267. *Heerii* v. Uechtr. (*rufipes* Heer.) Ustron,  
s. selten.
268. \* *albipes* St. 7. U. d. Weichsel b. Ustron,  
z. selten.
- (Leja Mgl.)
269. \* *pygmaeum* F. 4—8. U. d. Oder, Ro-  
senberg, a. d. Weichsel b. Ustron, z. häufig.
270. \* *velox* Er. 4—8. U. d. Oder, Ustron,  
Wiedergrün b. Karlsbrunn, z. häufig.
271. \* *celere* F. 3—10. Wie 269., und unter  
Moos u. ic. an andern Orten, s. häufig.
272. \* *pusillum* Gyll. 5—8. U. d. Oder, z.  
häufig.
273. \* *tenellum* Er. 5—7. Ob. unter Moos,  
Dr. D. um Baumstämme, a. d. Oder,  
bisweilen z. häufig.
274. *Doris* Ill. Ob., unter Moos, Rosenberg  
(Rdsch.), s. selten.
275. *affimile* Gyll. Ob., unter Moos, s. selten.
276. *obtusum* Dj. 5—8. Ob., Kupp, unter  
Moos, Ustron a. d. Weichsel, s. selten.
277. \* *guttula* F. 5—8. Ob., Stw., unter  
Moos, z. selten.
278. \* 2-guttatum F. 9. Bei Lubowiz, Gr.  
Peterwiz, Ustron, unter feuchtem Moos,  
selten.
- (Lopha Mgl.)
279. \* 4-guttatum F. 6—8. U. d. Oder, z.  
häufig.
280. 4-pustulatum F. desgl., aber s. selten.
281. \* 4-maculatum L. 5—9. U. d. Oder,  
Ob., Borutin, z. häufig.
282. \* *articulatum* Pz. 5. 6. U. d. Oder,  
häufig.

## (Tachypus Mgl.)

283.\* *caraboides* Ol. (*picipes* Mgl.) b. U. d.  
Oder selten, häufiger a. d. Weichsel b.  
Ustron.

284.\* *pallipes* Mgl. desgl.

285.\* *flavipes* L. 5—9. U. d. Oder z. häufig.

## 2. Hydrocantharida.

1. *Haliplus*. Latr.

1. *obliquus* F. Grabowka, am Leichrande, s.  
selten.

2. *fulvus* F. Neugarten, s. selten.

3.\* *ruficollis* De G. Neugarten, Ehnst. z.  
selten.

4. *impressus* F. Grabowka, Zawade, Ehnst.  
s. selten.

5. *fluviatilis* Aub. Grabowka, Borutin, selten.  
Anm.: Sie wurden alle mit Lemnaarten  
aufgeschöpft.

2. *Cnemidotus* Ill.

6. *caesus* Dft. Neugarten, wie d. vorigen.

3. *Cybister* Curtis.

7. *Roeselii* F. Ehnst., Beneschau, früher s.  
häufig; Rosenberg (Rdsch.)

4. *Dytiscus* L.

8. *latissimus* L. Ehnst., Adamowicz, selten.

9.\* *marginalis* L. In fast allen stehenden,  
oder doch wenig Abfluß habenden Gewässern  
d. Umgegend häufig. Einzelne Ex. an trock-  
nen Stellen, z. B. in der Obora, in der  
Stadt, wohin sie sich verflogen hatten.

10. *dubius* Gyll. (v. Weber bestimmt) Adamo-  
wicz, s. selten.

11. *circumcinctus* Ahr. Wie 8.

12. *circumflexus* F. desgl.

13. *conformis* Kze. In der Lache am Dr. D.,  
Beneschau, selten.

14. *dimidiatus* Brgst. Grabowka, selten.

5. *Acllius* Lench.

15.\* *sulcatus* L. Babiz, Rauden, Dr. D.,  
Adamowicz ic. häufig.

16. *canaliculatus* Kn. Adamowicz, Babiz  
selten.

6. *Hydaticus* Bach.

17.\* *transversalis* F. R.-Hammer, Adamo-  
wicz, Beneschau, z. häufig.

18.\* *Hübneri* F. desgl., jedoch seltener.

19.\* *stagnalis* F. Wie 18.

20.\* *cinereus* L. Adamowicz, Beneschau, s.  
selten.

21. *bilineatus* De G. desgl.

22. *austriacus* Dj. Beneschau (Z.) z. selten.

7. *Colymbetes* Clairv.

23.\* *fuscus* L. Dr. D. (im zeitigen Frühjahr,  
bei noch nicht vollständig aufgetautem Eis  
einige u. 20 Ex.; einige saßen an den in  
der Nähe stehenden Linden; Rauden ic. z.  
häufig).

24. *striatus* L. (Boegmanni Gyll.) Am Dr.  
D., im Fluge 2 Ex.

25. *pulverosus* Kn. Adamowicz, selten.

26.\* *notatus* F. Adamowicz, Bojanow, Be-  
neschau, häufig.

27. *collaris* Pk. Babiz, Grabowka, Beneschau,  
z. selten.

28.\* *adspersus* F. desgl. aber häufiger.

29.\* *Grapii* Gyll. Babiz, Adamowicz, R.-  
Hammer, Lukasine, Ewerkau, Beneschau,  
häufig.

8. *Ilybius* Er.

30. *ater* De G. Ehnst., Beneschau, selten.

31.\* *4-guttatus* Dj. Babiz, selten.

32. *fenestratus* F. desgl.

33.\* *subaeneus* Er. desgl.

34. *guttiger* Gyll. Rauden, 2 Ex.

35.\* *fuliginosus* F. Babiz, Adamowicz, Brze-  
zie, Rosenberg, z. häufig.

9. *Agabus* Leach.

- 36.\* *agilis* F. Neugarten, Lukasine, mit Lemna-Arten geschöpft, z. selten.  
 37.\* *uliginosus* L. Babik, Beneschau, z. selten.  
 38.\* *femoralis* Pk. Adamowicz, s. selten.  
 39. *congener* Pk. Beneschau (Z.) s. selten.  
 40. *maculatus* L. Neugarten, Brzezie, Adamowicz, z. selten.  
 41.\* *abbreviatus* F. desgl., z. häufig.  
 42.\* *guttatus* Pk. Brzezie, Ustron, Gesenke, z. selten.  
 43. *silesiacus* n. sp. Gesenke. (Uebrs. 1843 p. 170.)

44. *assinis* Pk. Neugarten, s. selten.  
 45.\* 2-pustulatus L. Babik, Adamowicz, Kupp, häufig.

10. *Noterus* Clairy.

- 46.\* *crassicornis* Müll. Lhnst. Neugarten, mit Lemna-Arten geschöpft, z. häufig.  
 47.\* *hyalinus* De G. Mit Lemna-Arten geschöpft.  
 48.\* *minutus* F. ges. geschöpft, z. selten.

11. *Lacophilus* Leach.

- 49.\* *ferrugineus* L. Im angeschwemmt Gezimille, z. selten.  
 50. *reticulatus* F. Neugarten, s. selten.  
 51.\* *decoratus* Gyll. Neugarten, Adamowicz, selten.

52. *geminus* F. Wie 51, auch b. Sawade und Beneschau.

53. *unistriatus* Schrk. desgl. angeschwemmt Gezimille.

54. *alternans* Grv. Im angeschwemmt Gezimille.  
 55.\* *picipes* F. Neugarten, z. häufig.  
 56. *ovatus* St. Borutin (Z.) selten.  
 57.\* *palustris* L. Neugarten, z. selten.  
 58. *lituratus* F. Neugarten, Borutin, selten.  
 59.\* *planus* F. Neugarten, z. häufig.  
 60.\* *picus* St. Adamowicz, Rauden, z. selten.

- 61.\* *lienatus* F. Neugarten, selten.

- 62.\* 2-lineatus St. Adamowicz, Sawade, Beneschau, z. selten.  
 63. *pictus* F. Neugarten, s. selten.

14. *Gyrinus* Geöff.

- 64.\* *natator* L. Ueberall, gemein.  
 65.\* *mergus* Ahr. Fast eben so häufig, insdēß mehr in Gewässern sandiger Gegenden.  
 66. *bicolor* Pk. Budzin, s. selten.  
 67. *minutus* F. Markowicz, in Gesellschaft von 64, jedoch nur einige Gr.

15. *Orechtochilus* Er.

- 68.\* *villosus* F. Bei R. 1836 in der Senna, bei abgelassenem Wasser, auf dem Schlamm, in ungeheurer Menge; Ustron a. d. Weichsel unter Steinen z. selten; Er scheint anderweit selten zu sein, denn ich habe von 60—70 Gr. alle vertauscht bis auf 6.

3. *Brachelytra*.1. *Myrmedonia* Er.

- 1.\* *canaliculata* Pk. 3—10. Unt. M., Gem., St., um Bmsf., auch in Gesellschaft von Ameisen, bis ins Geb., hfg.  
 2.\* *limbata* Pk. 3—10. Ob., a. d. Oder, unt. M., Gem., besonders mit F. flava zusammen, z. sltn.  
 3.\* *humeralis* Gr. 3—9. I. d. Colonien v. F. fuliginosa u. rufa, hfg.  
 4.\* *cognata* Mrkl. Brzezie, wie 3, s. sltn.  
 5.\* *funesta* Gr. Wie 3, besonders um alte Weiden, nicht sltn.  
 6.\* *laticollis* Mkl. Wie 5.  
 7.\* *Iugens* Gr. Wie 5, jedoch mehr i. Spät-herbst.  
 8. *Howorthi* Steph. Frühj., a. d. Oder, unt. Gem., s. sltn. (Th.)  
 9. *collaris* Gr. 8. 9. Brz. W., unt. Laub, s. sltn.

2. *Antalia* Leach.
10. *impressa* Ol. Borutin (Z.) s. sltm.
11. *rivularis* Gr. 7. Ustron, i. Kuhdgr., s. sltm.
3. *Falagria* Leach,
- 12.\* *sulcata* Pr. 4—9. Im Kuhdgr., unt. faulem Kartoffelfraute, bisweilen s. hfg.
- 13.\* *thoracica* Curt. 4—8. Ob., unt. M., Eb., auch um alte Mauern, s. sltm.
- 14.\* *obscura*. Gr. 4—70. Ob., Pv., Stw., wie 13, hfg.
- 15.\* *nigra* Gr. Wie 14.
4. *Bolitochara* Mhm.
- 16.\* *lunulata* Pk. 4—10. Ob., Pv., Edke, um Pilze, s. hfg.
17. *obliqua* Er. 7. Ustron, i. Baumchwäm- men, s. sltm.
5. *Ocalea* Er.
18. *badia* Er. Frühj. u. Herbst. Ob., unt. M. u. Heidekraut, s. sltm.
6. *Colodera* Mhm.
19. *nigricollis* Pk. Frühj., unt. Eb., s. sltm. (Th.)
- 20.\* *forticornis* Boisd. Frühj., i. Roth, hfg. (Th.)
21. *nigrita* Mhm. Frühj., Ob., Dr. D., um Bmst., sltm.
- 22.\* *rubicunda* Er. 4—7. U. d. Oder, Ustron a. d. Weichsel, unt. feuchtem Eb., z. sltm.
7. *Taehyusa* Er.
- 23.\* *constricta* Er. 5—8. U. d. Oder, auf Schlammin, z. hfg.
- 24.\* *coarctata* Er. desgl., s. hfg.
25. *scitula* Er. Unt. M., s. sltm. (Th.)
- 26.\* *immunita* Er. 5—8. Ob., Pv., unt. M., mit Homaloten zusammen, sltm.
- 27.\* *atra* Gr. 5—8. In Gärten, auf Schlammin, sltm.
28. *umbratica* Er. desgl. (Th.)
29. *lata* v. Kwtr. 5—7. U. d. Oder, auf Schlammin, z. hfg. (Th.)

8. *Phloeopora* Er.
30. *corticalis* Gr. 6. 7. R., unt. Rinde a. einem Pfahle, Leobschützer Stadtwald unt. Eichenrinde, s. sltm. (Th.)
9. *Homalota* Mhm.
- 31.\* *graminicola* Gr. Frühj. unt. nassen Eb., später auf Bl., z. sltm.
32. *umbonata* Er. Mit F. fuliginosa zus., s. sltm. (Th.)
33. *nitidula* Mkl. i litt. Wie 32.
- 34.\* *pavens* Er. 6. 7. U. d. Oder, a. d. Weichsel, z. sltm.
35. *languida* Er. 7. Ustron, i. Gem., s. sltm.
36. *gracilis* Riehl i. litt. R., unt. M., s. sltm. (Th.)
37. *labilis* Er. 5—7. An Leichrändern, auf Schlammin, z. sltm.
- 38.\* *velata* Er. desgl.
39. *luteipes* Er. R., unter Eb., s. sltm. (Th.)
- 40.\* *elongatula* Gr. 3—10. Unt. M., Gem., Dgr. u. überall gemein.
- 41.\* *angustula* Gyll. 3—10. Um faule Bmst., z. sltm.
42. *aequata* Er. Ob., an einem mit Pilzen bewachsenen Stocke, s. sltm. (Th.)
- 43.\* *cuspidata* Er. Im Octbr. 1845 unt. d. Rinde alter Weiden a. d. Straße nach d. Lukasine, s. hfg. (Th.)
- 44.\* *circularis* Gr. Wie 40, auch unt. F. fuliginosa.
45. *depressa* Gr. 6. An Ufern, s. sltm.
- 46.\* *socialis* P. Wie 40, aber auch i. Pilzen u. unter Ameisen.
47. *sodalis* Er. Ob., unt. M. (H.)
48. *ochracea* Er. 10. Edke, in Pilzen, sltm.
- 49.\* *analis* Gr. Wie 47, im Geb. z. b. Ustron, sltm.
50. *exilis* Er. U. d. Oder, auf Schlammin, s. sltm. (Th.)

- 51.\* *palleola* Er. 5—8. Ob., Pw., Ustron, i. Pilzen, j. sltn.
- 52.\* *inquinata* Gr. Herbst. Ob., auch a. andern Orten, i. Kuhdgr., j. sltn.
- 53.\* *cauta* Er. R., Ustron, wie 52.
54. *celata* Er. Herbst, wie 52. (Th.)
- 55.\* *sordidula* Er. Wie 52.
56. *ripicola* v. Kwtrr. 5. Auf Schlammt, j. sltn.
- 57.\* *livida* Er. 6—9. Pw., Kupp, Ustron, i. Kuhdgr., hfg.
- 58.\* *longicornis* Gr. Wie 46.
- 59.\* *fungi* Gr. 6—10. Unt. M., Eb., besonders i. Pilzen, s. hfg.
- 60.\* *vernacula* Er. 5—10. Unt. Eb., M. ic. hfg.
- 61.\* *orphana* Er. desgl., auch unter Ameisen.
- 62.\* *aterrima* Gr. 5—10. Ob., Pw., Kupp, Ustron, unt. Eb., M. ic. hfg.
- 10. *Oxypoda* Mhm.**
63. *ruficornis* Er. 6. Ob. Unt. F. fuliginosa, s. sltn. (Th.)
- 64.\* *luteipennis* Er. 5—8. Ob., Stw., Pw. ic. unter faulem Eb., j. hfg.
- 65.\* *vittata* Mkl. 5—10. Wie 63.
- 66.\* *opaca* Gr. 4—10. Ob., Pw., Stw., Kupp, Ustron, unt. M., Eb., Ameisen, i. Pilzen, s. hfg.
- 67.\* *alternans* Gr. 7—10. Stw., Ob., Kupp ic. wie 64.
68. *abdominalis* Mhm. Ob., unt. M. (H.)
69. *helveola* Er. 8. 9. u. d. Oder, unt. Eb., Gem., auch um Bmst., sltn.
70. *ferruginea* Er. In Frühj. u. Herbst unt. Linden, sltn. (Th.)
- 71.\* *cuniculina* Er. 5—8. R. u. Ustron, i. Nestern d. F. fuliginosa, hfg.
72. *exigua* Er. 6. 7. u. d. Oder, Kupp, unt. nassen Eb. u. Gem., j. sltn.
73. *fumida* Er. 7. Ustron, in Schwämmen, j. sltn. (Th.)
- 11. *Aleochara* Gr.**
- 74.\* *fuscipes* F. Sommer. Im Roth, j. hfg.
75. *rufipes* Er. 5—7. Ob., Pw., Ustron, i. Gem., j. sltn.
76. *tristis* Gr. 4—7. Im Kuhdgr., s. selten.
- 77.\* *2-punctata* Gr. 5—9. Ob., Pw., Ustron, unt. M., i. Kuhdgr., hfg.
78. *brevipennis* Gr. Im Kuhdgr. sltn.
79. *fumata* Gr. Kupp, Leobschützer Stadtw., i. Pilzen, j. selten.
80. *2-signata* Er. 5—8. Unt. M., s. sltn.
- 81.\* *nitida* Gr. Sommer, wie 77.
- 82.\* *lanuginosa* Gr. desgl.
83. *moesta* Gr. 5—7. Ob., Ustron, unt. M., Gem., j. sltn.
84. *erythroptera* Gr. 5. Pw., unt. M., s. sltn. (Th.)
85. *gentilis* Lün. Frühj., unt. M., um Bmst., sltn.
86. *morion* Gr. 5—7. Ob., Ustron, unt. M. u. Ameisen, i. Kuhdgr., sltn.
87. *angulata* Er. Ob., Ebke., unt. F. rufa, s. sltn.
88. *praeusta* Er. Unt. Eb., s. sltn. (Th.)
89. *inquilina* Mkl. Ob. unt. F. fuliginosa, s. sltn. (Th.)
- 12. *Oligota* Mhm.**
90. *pusillima* Gr. Ob., unt. faulem Eb. s. sltn.
- 13. *Gyrophaena* Mhm.**
- 91.\* *nana* Pk. In Pilzen, überall s. hfg.
92. *affinis* Sbg. desgl. (hinter d. Schießhause) sltn.
- 93.\* *congrua* Er. Wie 91.
94. *Incidula* Er. Ob., i. Pilzen, sltn. (Th.)
95. *manca* Er. 6. 7. In Baumschwämmen, R. sltn., Ustron j. hfg.  
Nam.: Wahrscheinl. auch *polita* Gr.

- 96.\* *boleti* L. 7. Ustron, i. Baumschwämmen an Fichtenstöcken, z. hfg.
97. *minima* Er. Im Frühj. in Pilzen, s. sltn. (Th.)
- 14. Lomechusa** Gr.
98. *emarginata* Pk. Ob., unt. M. (H.)
- 15. Silusa** Er.
99. *rubiginosa* Er. Unt. M., um Bmst., sltn.
100. *rubra* Er. Ob., i. Pilzen, s. sltn. (Th.)
- 16. Pronomea** Er.
- 101.\* *rostrata* Er. 6—8. Ob., unt. M., Eb. u. z. hfg.
- 17. Myllaena** Er.
102. *gracilis* Heer (graminicollis v. Kwttr.) Ustron, a. d. Weichsel, s. sltn. (Th.)
103. *intermedia* Er. desgl.
- 18. Hypocyptus** Schöpp.
- 104.\* *longicornis* Pk. Herbst. Pv., Ob., Wiesen, unt. M., Gras u. z. hfg.
- 19. Conurus** Steph.
105. *littoreus* L. 6. 7. Ob., Ustron, i. fauen Bmstöcken., sltn.
- 106.\* *pubescens* Gr. 6—10. Ob., Pv., Ustron, um Bmstöcke., unt. Eb., i. Gem., z. hfg.
107. *testaceus* F. 8. Pv., unt. M. u. Eb., sltn. Ich halte diesen Käfer für eine eigene Art und nicht für var. v. 106.
108. *fusculus* Gr. 6—8. Ob., Pv., unt. Eb., um Bmst. u. z. sltn.
- 109.\* *pedicularius* Gr. 5—8. Ob., Pv., Stw., Brzw., Lubowiz, a. d. Oder, unt. nassem Eb., u. z. hfg.
110. *2-punctatus* Gr. R., unt. Bmrinde. (Th.) Würbenthal (v. U.) sltn.
- 20. Tachyporus** Gr.
- 111.\* *obtusus* L. Frühj. bis Herbst, unt. M., Gem. u. s. hfg.
- 112.\* *hypnorum* F. desgl.
- 113.\* *chrysomelinus* L. desgl., jedoch seltener.
- 114.\* *solutus* Er. 5—7. Pv., Ustron, unt. Eb. u. M., sltn.
- 115.\* *humerosus* Kn. 6. A. b. Oder, unt. feuchtem Eb., z. sltn.
- 116.\* *ruficollis* Gr. 10. Edke., um Pilze, 10 sltn.
- 117.\* *pusillus* Gr. 6—9. Ob., Stw., a. d. Oder, Ustron, unt. Eb., M. u. Gem., nicht sltn.
- 118.\* *scitulus* Er. 3—8. Ob., Ustron, wie 117, z. sltn.
- 119.\* *brunneus* F. 3—10. Ob., a. d. Oder, wie 100, z. hfg., auch unter Ameisen, bes. F. fuliginoosa. Uebrigens scheint sich das ganze Gen. mit Ameisen sehr gut zu vertragen, denn ich fand die obigen Spec. sehr hfg. mit der einen oder andern Art der gewöhnl. Ameisen zusammen.
- 21. Tachynus** Gr.
120. *silphoides* L. 6—8. Ob., Pv., Leobschütz, i. Dgr., sltn.
- 121.\* *rufipes* De G. 3—7. In faulem M., Eb. u. nicht sltn.
- 122.\* *stavipes* F. desgl.
- 123.\* *humeralis* Gr. 5—7. Ob. u. a. Deten, i. Roth u. auf Bl. hfg.
124. *marginellus* Gr. Ob., unt. M. (H.)
- 125.\* *simetarius* Gr. 5—9. Ob., Ehnst., Kupp, Ustron, Karlsbrunn, meist i. Dgr. u. i. Pilzen, hfg.
- 126.\* *collaris* Gr. Wie 125, aber seltener.
- 22. Boletophilus** Leach.
127. *analis* Pk. 6. Pv., um Pilze, s. sltn.
128. *formosus* Gr. Frühj., Stw., unt. Eb., s. sltn.
129. *cernuus* Gr. desgl.
130. *rufus* Fsch. 7. Ustron, unt. Gem., s. sltn.
131. *striatus* Ol. (var.) Ob., unt. Eb., s. sltn. (Th.)
- 132.\* *atricapillus* F. 5—10. Ob., Pv., Stw., Edke., um u. i. Pilzen, s. sltn.

133. *Ianulatus* L. 6. Stw., Pv., i. Pilzen, s. sltn.
134. *exoletus* Er. 7. Leobsch. Stw. s. sltn. (Th.)
135. <sup>\*</sup> *pygmaeus* F. 5—10. In Pilzen, überall, gemein. <sup>11</sup> 12—14. <sup>15</sup>
- 23. Mycetoporus** Mhm.
136. <sup>\*</sup> *longulus* Mhm. 5—8. Unt. M., bef. i. Nadelwalde, z. hfg.
137. *lepidus* Gr. 5—8. Ob., Kupp, unt. trockenem M., mit Ameisen zus., z. selten.
138. *pronus* Er. 8. Um Wmst., wie 137.
139. *narus* Gyll. 8. Pv., unt. M., s. seltn.
140. *splendidus* Gr. desgl.
- 24. Othius** Leach.
141. <sup>\*</sup> *fulvipennis* F. Frühj., Ob., unt. M., sltn.
142. *melanocephalus* Gr. 6. 7. Ob., Kupp, unt. M., sltn.
143. *pilicornis* Pk. 6. 7. Ob., Kupp, Ustron, unt. M. und Gem., sltn. var: *fusco-rufescens*, s. sltn.
144. *myrmecophilus* v. Kwtr. 6. Ob., unt. M. mit Ameisen zus., s. sltn.
145. *gracilis* (v. U.), Ob. (H.)
- 25. Xantholinus** Dahl.
146. *elongatus* Gr. Ob. (H.)
147. *lentus* Gr. desgl.
148. <sup>\*</sup> *punctulatus* Pk. 3—10. Ob., a. d. i. Oder, Ustron, unt. Wmst., M. u. Gem., z. hfg. var: *ochraceus* Gyll. sltn. (dürfte doch wohl eine eigene Art sein.)
149. <sup>\*</sup> *tricolor* F. 5—10. Ob., Ustron, Karlsbrunn, (Grüzeberg) unt. M., um faule Stöcke u., z. hfg.
150. <sup>\*</sup> *linearis* Ol. desgl., s. hfg.
- 26. Leptacinus** Er.
151. *batychrus* Kn. 6. Ob., unt. M., sltn.
- 27. Staphilinus** L.
152. *hirtus* L. Sommer. Adamowiz, Borutin, i. Ogr., sltn.
153. <sup>\*</sup> *maxillosus* L. 4—10. Im Ogr., überall, gemein.
154. <sup>\*</sup> *nebulosus* F. 4—10. Unt. M., Ob., i. Ogr., hfg.
155. <sup>\*</sup> *murinus* L. desgl.
156. <sup>\*</sup> *pubescens* De G. R., Kupp, Ustron, wie 154, s. sltn.
157. *fossor* Scop. Frühj., i. Gem., s. sltn.
158. <sup>\*</sup> *erythropterus* L. Wie 154.
159. *caesareus* Cedh. Im Ogr., sltn. var: *flavicornis* Zgl. s. sltn.
160. *stercorarius* Ol. Im Ogr., s. sltn.
- 28. Ocypus** Kirby.
161. *olens* Mllr. 6. Bschp., unt. St., z. hfg.; Sawade, i. Kas (Z.).
162. *cyaneus* Pk. R., Borutin, unt. Gem., sltn.
163. *macrocephalus* Gr. 7. Ustron, unt. Gem., sltn.
164. *alpestris* Er. 7. Ustron, a. Bege n. d. fl. Czantori, unt. St., s. sltn.
165. <sup>\*</sup> *similis* F. 4—10. Ob., Dw., Kupp u. unt. M., z. hfg.
166. <sup>\*</sup> *fuscatus* Gr. 6. 7. Ob., Ustron, Karlsbrunn, z. sltn.
167. *picipennis* F. 6. Adamowiz, i. Ogr., s. sltn.
168. *cupreus* Rossi. 6. 7. R., Ustron, i. Gem., s. sltn.
169. <sup>\*</sup> *morio* Gr. Frühj., Ob., unt. M., sltn.
- 29. Philonthus** Leach.
170. <sup>\*</sup> *splendens* F. 5—7. Ob., Rudnik, unt. M. u. Gem., z. sltn.
171. *laevicollis* St. a. d. Oder, unt. Gem., s. sltn.
172. *intermedius* Boisd. Frühj., wie 171.
173. *laminatus* Crtz. 4—7. a. d. Oder, unt. Sträuchern, Karlsbrunn, sltn.
174. *nitidus* F. 5. Ob., unt. M., s. sltn.
175. *carbonarius* Gyll. 5—7. R., i. Ogr., sltn.
176. <sup>\*</sup> *aeneus* Rossi. 3—10. R., Ustron, Karlsbrunn, unt. M., Ob., i. Ogr., Kas u., hfg.
177. *scutatus* Er. a. d. Oder, s. sltn.
178. <sup>\*</sup> *atratus* Gr. 5—8. Ob., a. d. Oder, Karlsbrunn, a. Schlam, i. Kas, feuchtem M., z. sltn. var: *coeruleescens*. s. sltn.

- 179.\* *decorus* Gr. 5—9. Wie 176. wenig. hfg.
180. *lucens* Mhm. 6. Altendorf, i. Kas., sltn.
- 181.\* *politus* F. Wie 179.
- 182.\* *marginatus* F. 7. 8. Ob., Ustron, i. Kühhgr. sltn.
183. *umbratilis* Gr. 6. Pw., i. Ogr., s. sltn.
- 184.\* *varius* Gyll. 5—10. Ob., Pw., a. d. Oder, Ustron, unt. M., sltn.
185. *2-maculatus* Gr. 6. Pw., unt. M., sltn.
- 186.\* *albipes* Gr. 6. 7. Ob., Kupp, Ustron, i. Gem., sltn.
187. *cephalotes* Gr. 8. Pw., i. Ogr., s. sltn.
188. *simetarius* Gr. 5—8. Pw.. Giesmannsdorf b. Neiße, i. Ogr., sltn.
189. *sordidus* Gr. Wie 187.
190. *fascus* Gr. R. (H.)
- 191.\* *ebeninus* Gr. 4—10. Ob., Pw., Kupp, Ustron, unt. M. u. Gem., hfg.
- 192.\* *corvinus* Er. desgl.
193. *fumigatus* Ndm. R. s. sltn.
194. *corruscus* Gr. R., i. Roth, s. sltn. (Th.)
- 195.\* *sanguinolentus* Gr. Wie 191.
196. *2-pustulatus* Pz. 6. 7. An d. Oder, a. d. Weichsel, sltn.
- 197.\* *varians* Pk. 5—8. R., Kupp, Ustron, im Ogr., hfg.
- 198.\* *opacus* Gr. (auch in Variet.) Wie 197.
199. *debilis* Gr. 8. Pw., unt. Eb., sltn.
200. *ventralis* Gr. desgl.
201. *discoidens* Gr. desgl.
202. *rubidus* Er. desgl.
203. *quisquiliarius* Gyll. Wie 197, ab. sltn.
- 204.\* *vernalis* Gr. 3—6. Ob., unt. M., s. hfg.
- 205.\* *splendidulus* Gr. Wie 197.
- 206.\* *micans* Gr. 6. Ob., unt. M., s. sltn.
- 207.\* *fulvipes* F. 6. 7. U. d. Oder, an dem Weichsel, s. hfg.
- 208.\* *tenuis* F. 5—8. An d. Oder, Ob., unt. Eb. und Gemille, s. selten.
209. *pullus* Ndm. 6. 7. Borutin, Ustron, im Gemille, sltn.
210. *rubripennis* Gr. 7. An d. Oder, Ustron, im Gemille, sltn.
- 211.\* *aterrimus* Gr. 3—10. Ueberall, gem.
212. *punctus* Gr. 6. Ob., unt. M., s. sltn.
213. *procerulus* Gr. Giesmannsdorf b. Neiße (H.).
214. *elongatus* Er. 8. Pw., unt. Eb. u. M., s. selten.
- 30. Heterothops** Kirby.
215. *dissimilis* Gr. 6. 7. An d. Oder, Kupp, s. selten.
216. *4-punctatus* Gr. 6. Ob., unt. M., s. sltn.
217. *nitens* Ndm. Lukofine, unt. Eb., s. sltn. (Th.)
- 31. Quedius** Leach.
218. *fulgidus* F. 6—8. Ob., Baupitz b. Neiße, sltn.
219. *cruentus* Ol. Ob., unt. M., s. sltn. (Th.)
220. *xanthopus* Er. 6. 7. An d. Oder, an d. Weichsel, im Gem., s. sltn.
221. *impressus* Pz. An d. Oder, im Gemille, sltn. (Th.)
- 222.\* *brevis* Er. 6. 7. Ob., Ustron, unt. F. *fulginosa*, 1 Ex. in d. Nestern d. F. *rufa*, s. sltn.
223. *molochinus* Gr. Ob., unt. M., s. sltn. (Th.)
- 224.\* *fuliginosus* Gr. 6—8. Ob., a. d. Oder, unter nassen Laub w., s. selten.
225. *picipes* Mhm. 9. Ob., um Pilze, sltn.
226. *fimbriatus* Er. 7. Ustron, auf d. E зан- tori, unt. Lannenrinde, s. sltn. (Th.)
227. *umbrinus* Er. Ob., unt. nassen Eb., sltn. (Th.)
228. *boops* Gr. desgl.
- 32. Euryoporus** Er.
229. *picipes* Mrsh. Frühj., Ob., unt. M., s. sltn. (Th.)
- 33. Oxyporus** F.
- 230.\* *rufus* L. 5—10. Ob., Edke., i. Pilz., hfg.

231. *maxillosus* F. 6. Edke., in Pilzen, sltm.

34. *Cryptobium* Mhm.

232.\* *fracticorne* Mhm. 6. 7. Ob., a. d. Oder, a. d. Weichsel, im Gemille, z. sltm.

35. *Achenium* Leach.

233. *depressum* Gr. 6. Ob., unt. M., sltm.

36. *Lathrobium* Gr.

234. *brunnipes* F. Ob., an der Oder, Babik, Leobschütz, im Gem., unt. M., sltm.

235.\* *elongatum* L. 5—8. Ob., an d. Oder, an d. Weichsel, Karlsbrunn, hfg.

336.\* *fulvipenne* Gyll. desgl.

237. *multipunctatum* Gr. Unt. Ziegeln a. d. Salzniederlage, s. sltm. (Th.)

238. *quadratum* Gyll. Ob., unt. M., s. sltm.

239. *punctatum* Zett. desgl.

240. *filiforme* Gr. Ezenkowitzer Fägerhaus (H.).

241. *pallidum* Ndm. An d. Oder, Lukasine, unt. nassen Ob., s. selten. (Th.)

242. *dilutum* Er. Desgl.

243.\* *longulum* Gr. 6—8. Ob., an d. Oder, unt. Umlisen, nicht selten.

244. *scabricolle* Er. Brzezie, auf einer Anhöhe, unt. M. u. Steinen, 2 Er.

37. *Scopaeus* Er.

245. *laevigatus* Gyll. Früh., unt. Ob. i. Ackerfurchen a. sonnigen Waldrändern, i. Khdgr., s. sltm.

246.\* *minutus* Er. Desgl.

38. *Lithocharis* Dj.

247. *brunnea* Er. 6. U.d.Oder, i. Gem., s. sltm.

248.\* *melanocephala* F. Frühj., desgl., auch um alte Gebäude ic.

249. *obsoleta* Ndm. 8. Pw., im Dgr., s. sltm.

39. *Stilicus* Latr.

250. *fragilis* Ltr. Sltm. Im zeitg. Frühj.

251.\* *rufipes* Mllr. Hfg. u. i. Herbst an

252.\* *similis* Er. Hfg. sonnigen Wald-

253.\* *geniculatus* Ahr. Sltm. rändern unt. M.

254.\* *affinis* Er. Hfg. ob. ic., nicht sltm.

255. *orbiculatus* Pk. Sltm. (Th.) in Gefellschaft v.

ameisen; Brze-

zie, Ob., Paw.

u. a. Orten.

40. *Suntus* Leach:

256. *filiformis* Ltr. Wie 245.

257. *intermedius* Dj. U. d. Oder, s. sltm (Th.).

258.\* *angustatus* Pk. 6—8. U. d. Oder, Ob., Pw., Brzezie, a. sonnigen Stellen unt. M., z. hfg.

41. *Paederus* Gr.

259.\* *litteralis* Gr. 4—10. U. d. Oder, Ob., a. d. Weichsel, Karlsbrunn, unter Moos, Gem. u. z. hfg.

260.\* *longipennis* Dhl. desgl., aber hfg. in der Ebene.

261.\* *riparius* L. Wie 259, aber seltener.

262.\* *ruficollis* F. 5—8. Ustron, a. d. Weichsel, hfg.

42. *Dianous* Leach.

263. *coerulescens* Gyll. 7. Ustron, a. d. Weichsel, im Gemille, überaus selten.

43. *Stenus* Latr.

264.\* *2-guttatus* F. 4—10. Überall gemein, besonders auf schlammigem Boden.

265.\* *2-punctatus* Krb. Desgl., weniger hfg., und mehr an trocknen Orten.

266.\* *2-maculatus* Gyll. 5—8. Ob. u. unt. M., z. häufig.

267. *stigmula* Er. Frühj., um alte Bmst., sltm.

268. *Juno* F. Ob., unt. M., z. sltm.

269.\* *ater* Mhm. 5—11. Ob., Brzezie, Ustron, nicht häufig.

270. *carbonarius* Gyll. Frühj., im Dgr., sltm.

271.\* *bupthalmus* Schrk. R., Zaudit, i. Dgr., z. häufig.

272. *morio* Kn. Frühj. unt. Sträuchern, sltm.

273.\* *speculator* Kn. 3—10. Ob., Pw., Brz., an der Oder, z. häufig.

274.\* *providus* Er. Desgl.

275. *Argus* Kn. 7. Ustron im Gem., z. sltm.

276.\* *fuscipes* Gr. 5—10. R., Kupp, Ustron, unt. Moos, z. häufig.

277.\* *humilis* Er. Desgl.

- 278.\* *circularis* Gr. Desgl.
279. *declaratus* Tisch. 6—8. Ob., Giesmannsdorf, Ustron, s.ltn.
280. *campestris* Er. 6—8. Ob., Zauditz, s.ltn.
281. *unicolor* Er. Ob., unt. M., selten.
282. *subimpressus* Kn. Ob. (H.)
- 283.\* *plantaris* Er. 5—8. Pv., i. Dgr., z. s.ltn.
284. *impressus* Tisch. 3—6. Pv., Brz. W., unter Sträuchern, z. s.ltn.
- 285.\* *pallipes* Gr. 3—6. Stw., Ob., an der Oder, unter Gemüse, z. selten.
- 286.\* *tarsalis* Lj. 5—10. Ob., an der Oder, Ustron, im Gemüse, z. häufig.
- 287.\* *oculatus* Gr. desgl., auch bei Zauditz.
- 288.\* *cicindeloides* Schall. desgl.
- 44. Euaestethus** Kn.
289. *scaber* Kn. Frühj., Ob., unter M., um Eichen, i. einem Garten um Pappeln, s. s.ltn.
- 45. Bledius** Leach.
- 290.\* *3-cornis* Hb. 4—8. Ob., Ustron, unter Moos und Gem., z. s.ltn.
291. *fracticornis* Pk. 5. Ob., unt. M., s. s.ltn.
292. *longulus* Er. 6. 7. An der Oder, an der Weichsel, unt. Gemüse, selten.
293. *dissimilis* Er. A. d. Oder, auf Schlamm, s. s.ltn. (Th.)
294. *rufipennis* Er. 6—8. An der Oder, unter Gemüse, selten.
- 295.\* *crassicollis* Boisd. Desgl.
296. *opus* Block. Wie 293.
297. *nanus* Er. Desgl.
- 298.\* *subterraneus* Er. Wie 294.
- 46. Platystethus** Mhm.
- 299.\* *morsistans* Pk. 3—10. Im Dgr., M. ic., gemein.
- 300.\* *cornutus* Gr. Desgl.
- 301.\* *nodifrons* Sbg. An ähnl. Orten, ab. s.ltn.
- 47. Oxytelus** Gr.
- 302.\* *rugosus* F. 3—10. Im Dgr., Roth, unter M. u. Gem., bis ins Geb., hfg.
- 303.\* *insecatus* Gr. Wie 302, etwas seltener.
- 304.\* *pieceus* L. Wie 302.
- 305.\* *sculptus* Kn. 5—8. Ob., Brz., im Dgr., selten.
306. *sculpturatus* Er. desgl., s. selten.
- 307.\* *nitidulus* Gr. 3—10. Im Dgr., um Dün-
- 308.\* *depressus* Gr. Gerhäuf. schwärzend, s. hfg.
- 48. Phleonaecus** Er.
- 309.\* *caelatus* Gr. Wie 302.
310. *caesus* Er. Im Dgr., selten.
- 49. Trogophloeus** Mhm.
311. *dilatatus* Er. 4—6. An der Oder, an d. Weichsel, im Gem., z. selten.
- 312.\* *2-lineatus* Stph. 4—6. An der Oder, auf Schlamm, nicht selten.
313. *obesus* v. Kittw. desgl., s. selten.
314. *riparius* Boisd. 5—8. R. Kupp, i. Dgr., Kas, selten.
315. *elongatus* Er. desgl.
316. *fuliginosus* Gr. 5—8. Desgl.
- 317.\* *corticinus* Gr. 5—8. Um Bmf. s. s.ltn.
- 318.\* *inquilinus* Er. Desgl.
319. *pusillus* Gr. Auf Schlamm, s. s.ltn. (Th.)
320. *tenellus* Er. Wie 317.
- 50. Coprophilus** Ltr.
321. *striatus* F. Unt. Ob., Gem., s. selten.
- 51. Acrognathus** Er.
322. *mandibularis* Gyll. Von Bl. geschöpft, s. selten. (Th.)
- 52. Deleaster** Er.
323. *dichrous* Gr. 7. Ustron, a. d. Weichsel, i. Gem., s.ltn.
- 53. Phloeoccharis** Mhm.
424. *substilissima* Mhm. Unt. M., um Bmf., selten.
- 54. Anthophagus** Gr.
- 325.\* *armiger* Gr. 6. Pv., Bschfp., unt. M., auf Bl., z. s.ltn.
326. *caraboides* L. 5—8. Pv., Dw., Karlsbrunn, desgl.
- 327.\* *abbreviatus* F. desgl.
328. *plagiatus* F. Bschfp. desgl.
- \* var. *nigrita* Mllr. Ustron, desgl.
329. *melanocephalus* Heer. 7. Karlsbrunn, unt. Bl. (v. U.)

55. **Lesteva** Latr.
- 330.\* *bicolor* F. 5. 6. An der Oder, Bisch., unter nassen Laube, z. selten.
331. *punctata* Er. An der Oder, unt. nassen Laube, s. selten (Th.)
56. **Arpedium** Er.
332. *quadratum* Gr. Von Bl. geschöpft, s. selten.
57. **Acidota** Leach.
333. *crenata* F. Unt. nassen. Lb., s. ltn. (Th.)
334. *cruentata* Mhm. Unter Moos, selten.
58. **Olophrum**. Er.
- 335.\* *piceum* Gyll. 6. Obora unter Moos, Bisch., von Bl. geschöpft, selten.
336. *fuscum* Gr. 6. Brzezie (H.)
- 337.\* *assimile* Pk. 4—7. Ob., Wo., an der Oder, unter Moos, seltener.
59. **Lathrimaeum** Er.
- 338.\* *athrocephalum* Gyll. 4—8. Brz. W., Ob., Giesmannsdorf, auf Farrenraut, z. ltn.
60. **omalium** Gr.
- 339.\* *rivulare* Pk. 5—10. R., unt. Weidenrinde; Wo., Giesmannsdorf, unter Moos, nicht ltn.
340. *fossulatum* Er. Unt. feuchtem Moos, s. ltn. (Th.)
- 341.\* *caesum* Gr. 4—9. Stw., Brz., Paw., Lubomiz, unter Moos, z. selten.
- 342.\* *pusillum* Gr. 6. 7. An der Oder, an d. Weichsel, auch unter Kieferrinde, selten.
- 343.\* *florale* Pk. 5—7. Obora, Bisch., von Bl. geschöpft, z. ltn.
344. *brunneum* Pk. Lhnst. unter Eichen, s. selten (Th.)
- 345.\* *Iucidum* Er. 6. Unt. Weidenrinde, ltn.
346. *deplanatum* Gyll. An Bäumen, unter Rinde, s. selten.
347. *concinnum* Mrsh. desgl.
348. *planum* Pk. desgl., auch im Leobschützer Stw., s. selten.
349. *luridum* Gyll. Im Herbst, in Baum-schwämmen, s. selten.
61. **Anthobium** Leach.
350. *florale* Pk. Ob., auf Bl., s. ltn.
351. *semicoleoptratum* R. 6. Bisch., auf Bl., z. hfg.
- 352.\* *limbatum* Er. desgl.
- 353.\* *sorbi* Gyll. 6. 7. Grätz, Ustron, Karlsbrunn, auf Bl., bes. Sp. Aruncus s. hfg.
354. *abdominalis* Gr. Bisch., Ustron, wie 353, s. selten.
- 355.\* *minutum* E. Ob., Biesen, Karlsbrunn, unter Bl., hfg.
- 356.\* *longipenne* Er. Wie 353.
62. **Proteinus** Latr.
- 357.\* *brachypterus* F. 8—10. Obora, Edte, unter Moos, z. selten.
358. *macropterus* Gyll. desgl.
- 359.\* *atomarius* Er. 5—10. desgl. unter M. um Eichen, um Dgr. im Fluge, z. hfg.
63. **Megarthrus** Kby.
360. *depressus* Pk. Ob., im Kuhdgr., s. ltn.
361. *marginicollis* Er. desgl.
- 362.\* *hemipterus* Jll. Ob., Kupp, Leobschütz, in Pilzen, z. hfg.
64. **Micropeplus** Latr.
363. *porcatus* Pk. 6. Im Dgr., auf Kleefeltern, s. selten.

#### IV. Sternoxá.

1. **Melanophila** Eschs. (Phaenops Mg.)
1. *cyanea* F. (tarda F.) Kupp, an Kbst., ltn.
2. **Buprestis** L. (cinnamomea) Mg.
- 2.\* *Mariana* L. 6—8. Adamowiz, Rauden, Rosenberg, Krascheow, Kupp, an Klafern und liegenden Kieferstämmen. (Als Larve in alten Kieferstöcken, tief ins Holz gehend. Kb.)
3. **Ancyloteira** Eschs.
3. *rustica* L. Pleß, Krascheow, Kupp, an Klafern, auf Bl., z. ltn.
4. *punctata* F. Rauden, Borutin, an Klafern, selten.

5. *8-guttata* L. 7. Rybnik, Rosenberg, Krascheow, Kupp, um 10—15jährige Kiefern und Klafterholz schwärmend, selten.
4. *Eurythyrea* Serv.
6. *austriaca* F. (*Quercus Hb.*) 6—9. R., im Fluge u. 1 Ex. i. Quarta, Rosenberg.
5. *Dicera* Eschs.
7. *berolinensis* F. 6—8. R., Kupp, Krascheow, an sonnigen Stellen, s. selten.
- var. *Alni* Mgl. 6. Ob. an Erlenklaftern z. hfg., aber seit 6 Jahren nicht wieder.
8. *aenea* L. R., im Fluge, Krascheow, sltn.
6. *Lampra* Mgl.
9. *rutilans* F. 6—8. R., im Fluge, Kupp, a. einem Zaune, s. selten.
7. *Chrysobothrys* Eschs.
- 10.\* *chrysostigma* L. 7. R., Kupp, an Eichenklaftern und liegenden Eichen, z. selten.
8. *Agrilus* Mgl.
11. *2-guttatus* F. 6. Kupp, an Eichenklaftern oder liegenden Stämmen, s. sltn. (Kb.)
12. *sinuatus* Ol. 6. Borutin, Tworkau, im Fluge, s. selten.
13. *viridis* L. 6. 7. Adamowicz, Krascheow, s. selten.
14. *cyanescens* Jll. (*cyaneus* Ol.) 7. Ustron, auf Sp. Aruncus, selten, Karlšbrunn, auf *Lonicera nigra*, nicht selten.
15. *angustulus* Jll. 6. 7. Krascheow, Falkenberg, Kupp, wie 11.
16. *pratensis* Rtzbg. 6. Adamowicz, Kupp, auf Bl., z. selten.
- 17.\* *tenuis* Rtzbg. 6—8. Krzjanowicz (aus Pfählen erzogen, (Z.), Kupp, Krascheow, Falkenberg, Ustron, wie 11 u. a. Bl., z. hfg.
18. *nocivus* Rtzbg. Falkenberg (Rds.).
19. *fagi* Rtzbg. Kupp, Falkenberg, Larve in Rothbuchen, sltn.
9. *Coraebus* De Lap.
- 20.\* *elatus* F. 6. Adamowicz, an sandigen Stellen, auf Bl., z. hfg.
10. *Anthaxia* Eschs.
21. *nitidula* L. 6. Mit 20 zus., aber s. sltn.
22. *4-punctata* L. 6—10. Auf Bl. überall hfg. Die Larven fand Kb. in 10—15j. Kiefern zwischen Bast und Splint.
11. *Trachys* F.
23. *minuta* L. 5—9. Auf Bl. überall, bis ins Geb., hfg.
24. *nana* Pk. Borutin (Z.).
12. *Aphanisticus* Latr.
25. *pusillus* Ol. 5. Auf Bl., s. selten.
13. *Synaptus* Eschs.
- 26.\* *filiformis* F. 8—10. Im Gem., unt. M., s. hfg.
14. *Crafonychus* De.
27. *niger* F. R.. Krascheow, Kupp, sltn.
- 28.\* *castanipes* Pk. Ob., Edke, Ustron; Würbenthal, auf Bl., besonders auf Sp. Aruncus, Sorb. Aucuparia, z. hfg.
15. *Adelocera* Latr.
29. *fasciata* L. Ultvater, Uebers. 1840, p. 81.
30. *varia* Ol. 7. Karlšbrunn, an Stöcken unter der Rinde, sltn.
16. *Lacon* De Lap.
- 31.\* *murinus* L. Im Gem., auf Klafterholz u. bis ins Geb., hfg.
17. *Athous* Kschs.
32. *rufus* F. Doppel auf der Polkoinsel, s. sltn. (v. F.)
33. *undulatus* Pk. 7. Ustron, an einer Buche, 1 schönes Ex.
- 34.\* *scrutator* Hb. Auf Bl. nicht sltn.
- 35.\* *hirtus* Hb. Auf Bl., im Gem., um Bmst., bis ins Geb., Karlšbrunn, z. hfg.
36. *mutabilis* M. B. Wie 35, seltener.
- 37.\* *longicollis* F. Desgl. s. hfg.
- 38.\* *haemorrhoidalis* F. Desgl. s. hfg.
39. *fuscipennis* St. Vereinzelt unter 38.
- 40.\* *vittatus* F. Ob., Pw., Dw., auf Bl. im Gem., z. hfg.

- 41.\* *subfuscus* Gyll. Wie 40, auch b. Ustron auf Spierst., Karlsbrunn auf Myrrhis *hir-suta* (v. U.).
42. *obscurus* Sch. Karlsbrunn (v. U.)
18. ***Campylus*** F.
43. *denticollis* F. 7. Ustron a. Stöcken, Karlsbrunn, an frischen Klaftern, Schloßberg v. Johannisberg bei Tauerndt, s. selten.
44. *mesomelas* L. 7. Ob., Edke, Ustron, Karlsbrunn, s. selten.
19. ***Limonius*** Eschs.
45. *cylindricus* Pk. Ustron, Karlsbrunn, s. sltn.
- 46.\* *nigripes* Gyll. Auf Holzpläcken, im Gem., bis ins Geb., hfg.
47. *mus* Ku. Ob., unt. M., s. sltn.
48. *serraticornis* Pk. Pw., Ustron, Karlsbrunn, auf Bl., s. sltn.
49. *minutus* L. desgl.
50. *lythroides* Grm. Ob., unter Moos, s. sltn.
- 51.\* *bructeri* F. 6. 7. Kupp, Bschkp., um Binst., nicht hfg.
52. 2-pustulatus L. Desgl.
53. *ruficornis* Ahr. 6. Pw., unter Moos, um Binst., s. selten.
20. ***Cardiophorus*** Eschs.
54. *thoracicus* F. Unt. Gem., bisweilen z. hfg.
- 55.\* *equiseti* Hb. An Eichrändern z. hfg.
21. ***Ampedus***.
- 56.\* *sanguineus* L. Ob., Paw., Kupp, Ustron, Karlsbrunn, Falkenberg, an Klaftern, auf Bl. ic., z. hfg.
57. *ephippium* F. Ob., an Klaftern, s. sltn.
58. *praeustus* F. desgl., auch bei Karlsbrunn.
- 59.\* *crocatus* Zgl. Auf Holzpläcken, auch bei Grottkau, z. sltn.
- 60.\* *elongatulus* F. desgl. auch b. Karlsbrunn.
- 61.\* *balteatus* L. desgl.
62. *aethiops* Frhl. Ustron, Karlsbrunn, s. sltn.
63. *nigrinus* Hb. Ob., Pw., s. selten.
22. ***Cryptohypnus*** Eschs.
64. 4-pustulatus F. 7. Ustron, a. d. Weichsel, unter Steinen, hfg.
- 65.\* *lapidicola* Wstr. 7—9. An der Oder, an der Weichsel, unter St., s. hfg.
23. ***Brasterius*** Eschs.
66. 2-maculatus F. 7. Ustron, an der Weichsel, s. sltn.
- 67.\* *pulchellus* L. Ob., unt. M. u. Gem., s. sltn.
24. ***Ludius*** Ltr.
68. *ferrugineus* L. Oppeln auf der Polkoinsel, Kupp, s. sltn.
25. ***Corymbites*** Latr.
69. *signatus* Pz. Ustron 1 Er., Sägdorf bei Freiwalde, Uebers. 1844 p. 69.
- 70.\* *haematodes* F. Jawade, Ustron, nicht hfg.; sitzt gern an den jungen Blättern, auch auf d. Bl. von Sorb. *Aucup.* u. *Samb. racemosa*.
- 71.\* *aeruginosus* F. Ob., Edke., s. sltn.; Bschkp., Karlsbrunn auf Blättern und Bl., s. hfg.
72. *cupreus* F. Beneschau, (Z).
73. *Heyerii* Sax. 7. Karlsbrunn (v. U.).
- 74.\* *pectinicornis* L. Wie 71.
- 75.\* *castaneus* L. Obora, Beneschau, Bschkp. Ustron, selten.
- 76.\* *tesselatus* L. Unter Gemille, auf Holzpläcken, bis ins Gebirge, hfg.
- 77.\* *assimilis* Gyll. Wie 76, aber sltn.
26. ***Diacanthus*** Ltr.
- 78.\* *holosericeus* F. Obora, Nakau, Kupp ic., bis ins Geb., im Gem., um Binst., hfg.
- 79.\* *metallicus* Pk. desgl., aber selten.
80. *cruciatus* F. Obora, Kupp, Krascheow, Kefel im Gesenke, z. sltn.
- 81.\* *latus*. Wie 78.
82. *melancholicus* F. Karlsbrunn (v. U.).
83. *longulus* Gyll. Pw., auf Bl., s. sltn.
- 84.\* *aenus* L. Ueberall, gemein.
27. ***Agriotes*** Etchs.
85. *pilosus* F. Obora, Borutin, z. sltn.

- 86.\* *gilvellus* Zgl. Auf Bl., bes. im Geb., hfg.  
 87.\* *lineatus* L. (*segetis* Gyll. *striatus* F.)  
     Im Gemüle, auch bei Karlsbrunn, z. hfg.  
 88.\* *obscurus* L. (*variabilis* F.) Überall bis  
     ins Gebirge, hfg.  
 89.\* *sputator* L. Desgl.  
     28. *sericosomus* Serv.  
 90. *brunneus* F. Ob., Edke., Bsch., Ustron, sfn.  
 91. *fugax* F. Desgl.  
 92. *fulvipennis* Dj. In der Obera, vor einigen  
     Jahren eine zieml. Anzahl, später nicht wieder.  
     29. *Dolopius* Mgl.  
 93.\* *marginatus* L. Auf Bl., überall, hfg.  
     30. *Ectinus* Eschs.  
 94.\* *aterrimus* L. Kupp, auf *Salix cinerea*,  
     häufig.  
     31. *Adrastus* Mg.  
 95.\* *limbatus* F. Auf Bl., im Gemüle, bis  
     ins Geb. hfg.  
     Anhang.  
 96. *Elater hirticollis* Uebers. 1829 } habe ich  
     p. 53. } nicht  
 97. *Elater undatus*, Uebers. 1840 } aufgefunden  
     p. 81. } den

## V. Malacodermata.

### 1. *Dascillus* Latr. (*Atopa* Pk.).

1. *cervinus* L. 7. Ustron, auf Sp. *Aruncus*,  
     Karlsbrunn, auf *Carduus personatus*, sfn.  
 2.\* *cinereus* F. 7. Ustron, wie 1, Karlsbrunn  
     auf *Cnicus oleraceus*, z. sfn. Nach mei-  
     ner wiederholten Beobachtung sind 1 und  
     2 nicht m. u. f. sondern eigene Arten.

### 2. *Elodes* Latr. (*Cyphon* Pk.).

- 3.\* *pallida* F. 6—8. Pw., Ustron, auf Bl.,  
     z. hfg.  
 4. *livida* F. 6. Pw., auf Bl., s. sfn.  
 5.\* *grisea* F. 6. Pw., Ustron, Karlsbrunn,  
     Bsch., auf Bl., bes. Sp. *Aruncus*, hfg.  
 6. *pubescens* F. Wie 4.  
 7. *padi* L. Ob., wie 4.

8. *coarctatus* Pk. Ob. Wie 4.  
 9. *deflexicollis* Mllr. 6. 7. Ob., Ustron, wie 5.  
 10.\* *rufilabris* Mgl. 6. Pw., auf Bl., sfn.  
 11. *badia* Mg. 5. 6. Ob., auf Bl., s. sfn.  
     3. *Seyrites* Jl.  
 12.\* *hemisphaericus* F. R., Kupp, auf Bl.,  
     Frühj. unter Moos, z. hfg.  
     4. *Lygistopterus* Dej.  
 13.\* *sanguineus* F. 5—8. Ob., Edke., Bsch.,  
     Ustron, Gesenke auf Bl., bes. Spiräen, s. hfg.  
     5. *Dyctyopterus* Latr.  
 14.\* *Aurora* F. 6—8. Ob., Ustron, Karlsbrunn  
     (Grüzeberg), wie 13, jed. s. sfn.  
 15. *affinis* Pk. 7. 8. Karlsbrunn, auf Myrr-  
     his arom., sfn. (v. U.)  
 16. *minutus* F. 7. Gesenke (Glaserberg) auf  
     Dolden, 3 Er.  
     6. *Homalitus* Geoff.  
 17. *suturalis* F. 7. Ustron und im Ges., unt.  
     Rinde an alten Stöcken, z. sfn.  
     7. *Lampyris* L.  
 18. *noctiluca* L. Fast überall und bekannt un-  
     ter dem Namen „Johanniwürmchen.“  
 19. *splendidula* L. Weniger hfg., mehr i. Geb.,  
     ist größer und bes. das Weibchen dunkler.  
     8. *Podabrus* Fisch.  
 20. *alpinus* Pk. 7. Ustron und im Ges., auf  
 21. *rubens* F. Bl., aber s. sfn.  
     9. *Telephorus* De G. (*Cantharis* F.).  
 22.\* *anticus* Mack. 6—9. Auf Blumen, bes.  
     in Gärten.  
 23.\* *fuscus* L. desgl., s. gemein, bis ins Geb.  
 24.\* *varipes* Dj. Wie 22.  
 25. *dispar*. Wie 22, aber s. selten, auch bei  
     Borutin und bei Karlsbrunn.  
 26.\* *pellucidus* F. Wie 24, auch b. Karlsbrunn.  
 26. *tristis* F. Karlsbrunn a. Vacc. Myrt. (v. U.)  
 28.\* *nigricans* Mllr. Auf Bl., an Klafern,  
     bis ins Geb., hfg.  
 29. *nigripes* Ritter. Im Ges. (Mooslehne,  
     Grüzeberg) auf *Abies excelsa* Lam. (v. U.)  
 30.\* *obscurus* L. Wie 28. R., Kupp, Karls-  
     brunn ic.

31. *lateralis* L. Obora, auf Bl., auch trocknen Baumst., sltm.
32. *thoracicus* Ol. desgl., aber s. sltm., vielleicht nur var. von 33.
33. *\* fulvicollis* F. 5—10. R., Kupp, Ustron, auf Bl., hfg.
34. *denticollis* Sch. Uebers. 1843, p. 193 u. 1844, p. 71.
35. *flavilabris* Fall. Wie 33, aber sltm.
36. *\* lividus* F. Auf Bl., überall z. hfg.
37. *\* rufus* L. desgl.
38. *bicolor* F. Borutin, Karlsbrunn, auf Myrrh. arom., sltm.
39. *praeustus* Dj. R., hinter d. Schloß (H.).
40. *\* melanurus* F. Ueberall, bis ins Geb., hfg.
41. *pilosus* Pk. Im Gesenke, auch bei Ustron, aber s. selten.
42. *ruso-testaceus* n. sp. Uebers. 1844 p. 72.
43. *\* fuscicornis* Ol. Wie 40.
44. *assimilis* Pk. Ob., Edke., Borutin, z. sltm.
45. *nigricornis* Mgl. 6. Obora, an trocknen Baumstämmen, 2 Gr.
46. *lituratus* Fall. Bei Karlsbrunn, Moess-lehne. (v. U.)
47. *\* fulvipennis* Grm. 5. Ustron, an der Weichsel, auf Steinen umher kriechend, z. hfg.
48. *\* testaceus* L. Wie 40.
49. *melanocerus* Sch. Uebers. 1843 p. 193 und 1844 p. 71.
50. *pallidus* F. Um Natibor, z. sltm.
51. ? *pallipes* F. Desgl.
52. *barbarus* F. Edke., vor Jahren einige Gr.
53. *ater* L. Landecke und bei Ustron, s. sltm.
54. *paludosus* Gyll. In sumpfigen Stellen am Ultrater auf Hierac. paludosum (v. U.)
55. *\* rufilabris* Oesk. 6. Obora, Bistk., z. sltm.
10. *SILIX* Mgl.
56. *nitidula* F. 5—8. Rudnik, Pr., Borutin, a. (spinicollis Mgl.) Dolden, sltm.; Karlsbrunn, a. Myrrhis arom. (v. U.)
57. *ruficollis* F. 5. Pavlauer-Wald, sltm.
11. *Malthinus* Ltr.
58. *\* flaveolus* Hb. 6—8. Rudnik, Kupp, auf Bl., sltm.
59. *\* 2-guttatus* L. 6—8. Obora, Rudnik, Kupp, auf Bl., sltm.
60. *sanguinicollis* Fall. Wie 59, z. hfg.
61. *\* ustulatus* Ullr. Desgl.
62. *\* marginatus* Ltr. Desgl., auch bei Ustron.
63. *fuscescens* St. i litt. Auf Bl., s. sltm.
64. *obscurus* Ullr. Desgl.
65. *brevicollis* Pk. 6. Pavlauer-Wald, s. sltm.
12. *Malachius* F.
66. *\* aeneus* L. Sommer. Auf verschiedenen Bl., an Kornähren u. Natibor, Kupp,
67. *\* 2-puslutatus* L. Sommer. Auf verschiedenen Bl., an Kornähren u. Natibor, Kupp,
68. *\* viridis* F. Sommer. Auf verschiedenen Bl., an Kornähren u. Natibor, Kupp,
69. *\* marginellus* F. bis ins Vorgebirge, hfg.;
70. *\* pulicarius* F. seltener 69.
13. *Anthocomus* Er.
71. *\* equestris* F. Wie die Malachius-Arten.
72. *\* fasciatus* L. Wie die Malachius-Arten.
14. *Ebaeus* Er.
73. *thoracicus* F. Sommer, Rudnik an Bl., s. sltm.
74. *praeustus* F. Desgl.
75. *flavipes* F. (ochraceus W. Mus.) Obora, an einem Baumstamm, s. sltm.
15. *Charopus* Er.
76. *\* graminicola* And. 6—8. Obora, Pr., Kupp, an Bl. auch unter Moos, um Baumstämme, nicht sltm.
77. *angulatus* F. Desgleichen, aber s. sltm.
16. *Dasytes* Pk.
78. *ater* F. 7. Ustron, auf Sp. Aruncus, 2 Gr.
79. *\* floralis* Gyll. 6—8. Natibor, Bischofsskoppe, auf Bl., nicht sltm.
80. *femoralis* Ill. 7. Wie 76, 6 Gr.
81. *\* nigricornis* F. 5—8. Natibor, Kupp, auf Bl., nicht sltm.
82. *coeruleus* F. 7. Wie 80.
83. *fusculus* Ill. 6. Obora, unter Moos, um Baumstämme, s. sltm.

- 84.\* *niger* F. 5—8. Ratibor, Kupp, Bischofskoppe, an Bl., nicht sltn.  
 85.\* *flavipes* F. Wie 82, hfg.  
 86. *plumbeus* St. 5—8. Obora, Krascheow, Schloßberg bei Johannisberg, s. sltn.  
 87.\* *linearis* F. 6. 7. Adamowiz, Gräß bei Troppau, Zelazno bei Oppeln, sltn.  
 88.\* *pallipes* Ill. Wie 82, hfg.

## VI. Xylotrogi.

### 1. Tillus Ol.

1. *elongatus* L. 7. Karlsbrunn, an alten Stöcken, 2 Ex.

### 2. Opilio Latr. (Notoxus F.)

2. *mollis* L. R., an trockenem Holze ic., z. sltn.

### 3. Trichodes F.

- 3.\* *apiarius* L. Sommer, an Bl., überall, hfg.

4. *cyanellus* And. 6—8. Obora, Krascheow, an Klaftern, sltn.

### 4. Clerus Geoffr.

- 5.\* *mutillarius* F. 6—8. Adamowiz, sltn.; Falkenberg, die Larve zerstört die Brut der Hylesinen (Rd.); Kupp, an Eichenklaftern, 20 Ex. (Kb.)

- 6.\* *formicarius* L. 5—8. Ratibor, Kupp, Krascheow, Falkenberg, Karlsbrunn, Ustron, an Nadelholz-Klaftern, hfg. Entschiedener Feind der Bostrichen. (Rd.)

### 5. Corynetes Hb.

- 7.\* *violaceus* L. Ratibor, unter Moos und Rinde, an Baumstämmen, z. hfg.

8. *pygmaeus* (v. Ullr. best.) Wie 7, aber s. sltn.

9. *ruficollis* F. Wie 7, s. sltn.

### 6. Lymexylon F.

10. *navale* L. 6—7. Rauden in alten Stöcken; Falkenberg in halb abgestorbenen Birken; Kupp, 1842 in alten Eichenstöcken; bisweilen hfg.

### 7. Hylecoetus Latr.

- 11.\* *dermestoides* L. 6—8. Schillersdorf,

Krascheow, Ustron, Zukunftmantel, in Zannenstöcken; Falkenberg, wie 10.

### 8. Ptilinus Geoff.

12. *pectinicornis* L. Schillersdorf, Krascheow, Falkenberg, an alten Stöcken, nicht sltn.  
 13. *costatus* Gyll. desgl., und bei Kupp an alten anbrüchigen Weiden, wo ihn d. Bohrlöcher verrathen, hfg. (Kb.)

### 9. Xyletinus Latr.

14. *pectinatus* F. Unt. Rinde, s. sltn.

### 10. Ochina Zgl.

15. *carpini* Hb. Kuchelna, Falkenberg, Kupp, an schadhaften Stellen der Weißbuchen, auch auf Alst. a. d. Bohrlöchern sitzend, z. sltn.

### 11. Anobium F.

- 16.\* *tesselatum* F. R., Kupp, in anbrüchigen Eichen, Weißbuchen, alten Häusern ic. an den Bohrlöchern sitzend, nicht selten.

- 17.\* *pertinax* L. R., Kupp, Falkenberg, in altem Holze, z. hfg.

- 18.\* *rufipes* F. R., Krascheow, Kupp, desgl. besonders in alten Kiefernbäumen.

19. *nitidum* F. Gräß bei Troppau (Z.).

- 20.\* *striatum* Ol. R., Kupp, Ustron, Karlsbrunn, in altem Holze. Stöcken ic., hfg.

21. *emarginatum* Mgl. R., Kupp, Falkenberg, in alten Fichten; Käfer und Larve scheint nur in und unter der Rinde zu leben; starker Harzaussluß verrath sein Dasein.

22. *pini* Er. Falkenberg (Rd.); Kupp, in 10—15 j. Kiefern, a. d. Maitrieben, (Kb.) slt.

23. *abietinum* Gyll. Falkenberg (Rd.).

24. *nigrinum* Er. 5. Kupp, auf 5j. Kiefern sltn., erzogen aus Zweigen 30j. Kiefernbestandes (Kb.)

25. *molle* L. R., Kupp, im Holze alter Gebäude, s. sltn.

26. *abietis* F. Kupp, im Frühj. in den frisch abgefallenen Fichtenzapfen, sltn. (Kb.)

- 27.\* *paniceum* L. R., Kupp in Herbarien, Blatt und dergl., s. hfg.

11. **Hedobia** Zgl.  
 28. **imperialis** L. Kraschew, an Bäumen, s. ltn.  
 (v. F.)  
**12. Ptinus** L.  
 29. **\* fur** L. Ueberall, im alten Holze, bes. Möbeln, gemein.  
 30. **raptor** St. Ratibor, in Möbeln, s. ltn.  
 31. **rufipes** F. Desgl.  
**13. Scydmaenus** Ltr.  
 32. **\* collaris** M. et Kze. Óbora, an der Oder, unter Moos und Gemille, z. ltn.  
 33. **elongatus** M. et Kze. Lehnst., an der Oder, desgl.  
 34. **\* pubicollis** M. et Kze. Stw., Lehnst., desgl.  
 35. **denticornis** M. et Kze. Desgl. (Th.)  
 36. **hirticollis** Jll. Óbora, Lubowit, desgl.  
 37. **Hellwigii** Hb. Óbora. (H.)  
 38. **tarsatus** Kze. Pawlauer-Wald, s. ltn.  
 39. **quadratus** M. et Kze. Óbora, an der Oder, z. ltn.

## VII. Clavicornia.

- 1. Necrophorus** F.  
 1. **\* germanicus** L. Ratibor, in den hohen Räumen der von Has übrig gebliebenen Knochen, bes. Pferdeköpfen, nicht hfg.  
 2. **humator** F. Desgl., auch bei Rosenberg und andern Orten.  
 3. **\* vespillo** L. Desgl., aber auch im Dgr., hfg.  
 4. **\* fossor** Er. Wie 3, jedoch ltn.  
 5. **sepultor** Chpt. (obrutor Er.) Meist mit 4 zusammen, jedoch ltn.  
 6. **\* mortuorum** F. Ueberall, wie 3, z. hfg.  
**2. Silpha** L.  
 7. **\* littoralis** L. Wie 3.  
 8. **\* thoracica** L. Im Has, Finger, unter Laub, überall z. hfg.  
 9. **\* rugosa** L. Desgl., s. hfg.  
 10. **\* sinuata** L. Desgl.

11. **dispar** Hb. Desgl. aber ltn.  
 12. **opaca** L. Wie 11.  
 13. **\* carinata** L. Wie 8.  
 14. **\* 4-punctata** L. Ratibor, Kupp, Plés, an Eichen, z. ltn.  
 15. **\* reticulata** F. Wie 8.  
 16. **tristis** Jll. Ratibor, 1829, 3 Er., unter Gemille, s. ltn., Karlsbrunn, Uebrs. 1843 p. 174.  
 17. **\* obscura** L. Ueberall, bis ins Geb., gemein.  
 18. **nigrita** Dfts. Altvater, Uebrs. 1840 p. 81 1843 p. 174.  
 19. **laevigata** F. Altvater, Uebrs. 1843 p. 174.  
 20. **\* atrata** L. In Laubwäldern, unter Gemille, bis ins Gebirge, z. hfg.; auch die braune Varietät.  
**3. Pteroloma** Schlr.  
 21. **Forsströmii** Gyll. (Holocnemis Gravenhorstii Schllg.) Ich fand diesen, wie es scheint, s. seltenen Käfer 1837 am Altvater in 3 Er.; später siehe Uebrs. 1841, p. 109.  
**4. Scaphidium** F.  
 22. **4-maculatum** F. Grätz bei Troppau (Z.), Altvater (Rdsch.).  
**5. Scaphisoma** Leach.  
 23. **\* agaricinum** F. R., unter Moos und in Pilzen, z. hfg., a. b. Gräfenberg.  
**6. Catops** Pk.  
 24. **angustatus** F. Ób., Pw., Stw., Lehnst., wie alle folgenden Arten meist im Frühj. unt. Moos, nassen Laube, Mulm, s. ltn.  
 25. **agilis** Jll. desgl.  
 26. **fuscus** Pz. desgl.  
 27. **picipes** F. desgl.  
 28. **grandicollis** Er. desgl. (Th.)  
 29. **\* chrysomelinus** Pz. desgl.  
 30. **tristis** Pz. desgl. (Th.)  
 31. **nigrita** Er. desgl.  
 32. **morio** F. desgl. (Th.)  
 33. **dissimulator** Sp. desgl.

- 34.\* *fumatus* Sp. hfg.  
 35. *sericeus* Pz. sltm.  
 7. ***Colon*** Hb.  
 36. *clavicornis* Dj. Unter M. u. Gem., s. sltm.  
 37. *calcaratus* Er. Frühj. unt. Gem., s. slt. (Th.)  
 38. *brevicornis* Pk. Frühj. unt. Eb. u. M., s. slt.  
 39. *fusculus* Er. Wie 37.
8. ***Peltis*** Kug.  
 40. *grossa* L. 7. Altwater 1837. Später siehe Uebers. 1840, p. 81.  
 41.\* *ferruginea* L. In feuchten Stuben, R. und Jakobswalde, bisweilen hfg.  
 42.\* *oblonga* Pk. An alten Weiden, biswl. hfg.  
 43. *dentata* Pk. Altwater. Uebers. 1840, p. 81.
9. ***Thymalus*** Latr.  
 44. *limbatus* F. Altwater 1837. Später siehe Uebers. 1840, p. 81.
10. ***Cercus*** Latr.  
 45.\* *pedicularius* L. Dw., Wiesen, auf Bl., z. sltm.  
 46. *sambuci* Mkl. R., Zawade, Grätz, von Bl. geschöpft, sltm.
11. ***Brachypterus*** Kug.  
 47. *gravidus* Jll. Alle auf Blumen;  
 48. *cinereus* Heer. mehr oder weniger  
 49.\* *pubescens* Schüpp. selten, im Frühj. auch  
 50.\* *urticae* Kug. unter Laub, Gem. u. c.
12. ***Epuraea*** Er.  
 51.\* *10-guttata* F. Auf Bl. und am austreibenden Saft der Eichen, z. hfg.  
 52. *silacea* Hb. Auf Bl., z. sltm.  
 53. *melina* Er. desgl.  
 54.\* *ochracea* Er. (aestiva L. F.) Ueberall, auf Bl., bei Spiräen, bis ins Gebirge, Ustron, Karlsbrunn u. c., hfg.  
 55. *neglecta* Heer. Auf Bl., s. sltm.  
 56.\* *obsoleta* F. Wie 51, auch unter Rinde an Rothbuchen.  
 var. *minor* v. U. Karlsbrunn unt. Buchenrinde.  
 57. *parvula* St. R., Zawade, auf Bl., s. sltm.
58. *pygmaea* Gyll. R. auf Bl. s. sltm. (Th.)  
 59. *pusilla* Jll. Karlsbrunn, Ustron, s. sltm.  
 60.\* *aestiva* Jll. (florea Er.) Auf Bl., z. slt.  
 61. *melanocephala* Mrsh. Auf Bl., s. selten.  
 62.\* *limbata* F. Dw., Pw., unter Laub, nicht selten. Im Frühjahr am austreibenden Saft der Weiden sitzend (Th.)
13. ***Nitidula*** F.  
 63.\* *2-pustulata* L. 4—8. Ratibor, Borutin, unter Rinde, Laub und Moos, z. sltm.  
 64.\* *obscura* F. 4—10. Ratibor, Kuppl, Ustron, unter Laub und Moos, auf Bl., bei Spiräen, s. hfg.  
 65. *4-pustulata* F. Zawade, unter Rinde, s. sltm.  
 66. *flexuosa* F. Neugarten b. R., s. sltm. (H.)
14. ***Soronia*** Er.  
 67.\* *grisea* L. (N. varia F.) Ratibor, Zawade, Zaubitz, im Frühjahr, unter Weiderinde, Laub und Moos, später auch auf Bl., nicht sltm.
15. ***Amphotis*** Er.  
 68. *marginata* F. Um Baumstämme, mit F. fuliginosa zusammen, sltm. (Th.)
16. ***Omosita*** Er.  
 69. *depressa* L. Ratibor, Landecke, Karlsbrunn, unter Moos, auf Bl., (Sorb. Auc.) sltm.  
 70.\* *colon* L. Ratibor, unter Laub, auf Bl., in Has., z. sltm.
- 71.\* *discoidea* F. Im Frühjahr, unter Laub und Moos, auch in Has., hfg..
17. ***Meligethes*** Stpk.  
 72. *rufipes* De G. Frühjahr, unter Laub und M., später auf Bl., bis ins Geb., z. sltm.  
 73.\* *pedicularius* Gyll. Desgl., aber s. sltm.  
 74. *subrugosus* Gyll. Wie 72.  
 75.\* *aeneus* F. Wie 73.  
 76.\* *ovatus* St.  
 77. *convexus* Schüpp. { Wie 72.  
 78. *sympyti* Kze.  
 79. *coracinus* St.

- 80.\* *viridescens* F. Wie 73.  
 10. *Pocadius* Er.  
 81. *ferrugineus* F. 7. Oberhalb des Dorfes  
Weichsel bei Ustron, unter Rinde an einem  
alten Stöcke, 2 Gr.  
 19. *Cychramus* Kug.  
 82.\* *luteus* Kug. Ratibor, Zawade, Kupp,  
unter Gemüle und auf Bl., j. hfg.  
 20. *Cryptarcha* Shuck.  
 83.\* *strigata* F. Frühjahr, Stw., unter Moos,  
um Eichen, j. hfg.  
 84. *imperialis* F. Frühjahr, am aussließenden  
Saite alter Eichen, s. sltn.  
 21. *Jps* F.  
 85. *4-guttatus* F. Ratibor, Ustron, unter Rinde  
an alten Stöcken, s. sltn.  
 86.\* *4-punctatus* Hb. } Desgl., weniger sltn.  
 87.\* *4-pustulatus* F. } Desgl.  
 22. *Byturus* Ltr.  
 88.\* *tomentosus* F. R., Ustron, Karlsbrunn,  
 89.\* *fumatus* F. } auf Bl., unt. Rinde, hfg.  
 23. *Daene* Latr. (Engis F.)  
 90. *sanguinicollis* F. Edke, unter Rinde, s. sltn.  
 91.\* *humeralis* F. Ratibor, Ustron, Karlsbrunn,  
in Schwämmen, unter Rinde, j. hfg.  
 92.\* *2-pustulata* F. Desgl.  
 24. *Antherophagus* Kn.  
 93. *pallens* F. Unter Moos, um Bins., sltn.  
 25. *Typhaea* Kirby. (*Limnesius* Er.)  
 94. *typhae* Fall. An Teichrändern geschöpft,  
s. sltn.  
 95.\* *caricis* Ol. An Teichrändern und auf  
feuchten Wiesen, geschöpft, hfg.  
 96. *sparcana* Ahr. Desgl., s. sltn.  
 97. *fumata* Mkl. Desgl., s. sltn.  
 26. *Cryptophagus* Hb.  
 98. *lycoperdi* Hb. Ratibor, Ustron, Karlsbrunn,  
unter Rinde, sltn.  
 99. *pilosus* Gyll. Pawlauer = Walb, Stir.,  
Frühjahr, unter Moos, s. sltn.  
 100. *dentatus* Hb. Desgl.
101. *crenatus* St. Desgl.  
 102. *acutangulus* Gyll. Desgl.  
 103. *affinis* St. Desgl.  
 104. *scanicus* L. Desgl.  
 105. *pusillus* Pk. Desgl.  
 106. *crenulatus* Er. Desgl.  
 27. *Atomaria* Kirby.  
 107. *ipsooides* Hb. Ob., Pw., unter Moos und  
Laub, auch bei Karlsbrunn.  
 108.\* *fuscipes* Gyll. Pw., Ob., Stw., wie 107.  
 109.\* *atra* Hb.  
 110. *mesomelas* Hb.  
 111. *linearis* Sph.  
 112. *umbrina* Gyll. } Desgl.  
 113. *nigriceps* Mkl.  
 114. *terminata* Dhl.  
 115. *apicalis* St.  
 116. *fuscata*  
 117.\* *analis* Desgl. Vom Hrn. Prof. Dr. Erich-  
 118.\* *nana* son bestimmt.  
 119. *pusilla*  
 120. *peltata* Er. (n. sp.) davon besitze ich nur 1 Gr.  
 28. *Micetaea* Kirby.  
 121. *hirta* Mrsh. Frühj. unter Moos und Ge-  
müle, sltn. (Th.)  
 29. *Elachistus* Hoffg.  
 122. *globulus* Gyll. Unt. M. u. Gem., s. sltn.  
 30. *Trichopterix* Kirby.  
 123. *atomaria* Gyll. R., Kupp, u. Dgr. schwär-  
 124. *fascicularis* Hb. mend, auch unt. Gem., slt.  
 125.\* *grandicollis* Mkl. R., Kupp, Ustron,  
desgl. s. hfg.  
 126. *sericans* Heer. Wie 123.  
 31. *Ptenidium* Er.  
 127.\* *pusillum* Gyll. Wie 123.  
 32. *Dermestes* L.  
 128.\* *lardarius* L. Ein Stammgast in Speise-  
und Vorrathskammern, oft nur zu hfg.  
 129. *lupinus* Eschs. Zawade (Z.).  
 130. *affinis* Gyll. Fand ich meist an d. Oder im  
 131. *murinus* L. angeschwemmten Gem., j. hfg.

**33. Attagenus Ltr.**

132. 20-guttatus F. Sawade (Z.)  
 133.\* pellio L. Ueberall gemein. Die Larve arbeitet gern im Pelzwerk (zu Gunsten d. Kirschner), in ausgestopften Thieren und ähnl. Dingen.  
 134.\* undatus F. desgl., ist aber viel seltener.  
 135. megatoma Dj. desgl. auch in Ustron.  
 136. Schafferi Hb. R. (H.), Sawade (Z.).

**34. Anthrenus Geoffr.**

- 137.\* scrophulariae L. Auf Bl., überall hfg.  
 138. verbasci F. Auf Bl., z. sltn.  
 139.\* museorum L. Auf Bl., unt. M., hfg.  
 140.\* pimpinellae F. desgl.  
 141. claviger Er. Sehr selten.

**35. Hololepta Pk.**

142. plana Fly. Fing ich vor Jahren auf der Barania in einem modrigen Stocke 3 Ex.

**36. Platysoma Leach.**

- 143.\* depresso F. Pv., Ob., Brz., W., Kupp, Ustron, unter Rinde an alten Stöcken.  
 144. oblongum F. Wie 143, aber s. sltn.

**37. Hister L.**

- 145.\* 4-notatus Scr. S. hfg.  
 146. unicolor L. S. sltn.  
 147.\* fimetarius Hb. (sinuatus F.) S. hfg.  
 148.\* cadaverinus E. H. S. hfg.  
 149.\* carbonarius E. H. S. hfg.  
 150.\* purpurascens Pk. Sltn. } Meist im Dgr., bis- weilen unter Moos, im  
 151. stercorarius E. H. S. sltn. Gemille und Kas. } Gemille und Kas.  
 152. sinuatus Pk. S. sltn.  
 153.\* bis-6-striatus F. hfg.  
 154. neglectus Zenk. S. sltn.  
 155.\* 2-maculatus L. S. sltn.  
 156. corvinus Grm. S. sltn.  
 157. 12-striatus Pk. S. sltn. (H.)

**38. Dendrophilus Leach.**

158. punctatus E. H. Mit d. v. zus., s. sltn.  
**39. Paromalus Er.**

159. flavidornis Hb. Unter Rinde, z. sltn.

**40. Saprinus Er.**

- 160.\* nitidulus F. Im Dgr., unter Moos, Gemille u. hfg.  
 161.\* aeneus L. Desgl.  
 162. conjungens Pk. Desgl., aber s. sltn.

**41. Trixagus Kug.**

163. adstricctor Hllw. 4–8. Ob., Kupp, unt. Rinde, sltn.

**42. Nosodendron Latr.**

- 164.\* fasciculare Ol. Um austreibenden Saft der Eichen, bisweilen hfg.

**43. Byrrhus F.**

165. ornatus Ustron, Karlsbrunn, unter Moos und Gemille, sltn.

- 166.\* pilula. Ueberall, unter M. u. Gem. hfg.  
 167. arietinus. Wie 165.

168. fasciatus. Desgl.

169. dorsalis. R., unt. M. und Bmf., sltn.  
 170.\* ater. R. und Ustron, im Gemille, sltn.

- 171.\* varius. Wie 166.

- 172.\* aeneus. Desgl., aber sltn.

- 173.\* nitens. Desgl., z. sltn.

**44. Syncalypta Dillwyn.**

- 174.\* arenaria St. Im Dgr., s. sltn.

**45. Simplocaria Curtis.**

- 175.\* semistriata Jll. Wie 174.

**46. Limnichius Zel.**

176. sericeus Dfts. Obora, unter M., s. sltn.

**47. Elmis Latr.**

- 177.\* aeneus Mllr. Obora, um Bmf. s. sltn.

178. Maugetii Ltr. Desgl.

**48. Parnus F.**

- 179.\* prolifericornis F. Unt. Rinde, M., hfg.

- 180.\* auriculatus Kug. Brzezie, Krascheow, Ustron. Wie 179.

181. rufipes Dhl. Desgl., aber s. selten.

182. lutulentus Er. Ustron, s. sltn.

**49. Heterocerus F.**

- 183.\* fossor Kttwr. An der Oder, auf Schlamm, s. hfg.

- 184.\* laevigatus R. Desgl., aber sltn.

## VIII. Palpicornia.

### 1. Helophorus F.

1. \* hubilis F. Ratibor, Kupp, auf Schlamm, im Gemille, hfg.
2. \* grandis Ill. Auf Schlamm, im Gem., hfg.
3. \* aquaticus L. Desgl., s. sltn.
4. \* granularis L. Desgl., hfg.
5. \* griseus Hb. Desgl.

### 2. Hydrochus Grm.

6. \* elongatus F. Pawlauer-Wald, Obora, an der Oder, unter Eb., auf Schlamm u. z. hfg.

### 3. Ochtebius Leach.

7. pygmaeus F. Obora, Frühj., unt. Eb., s. sltn.

### 4. Spercheus Kug.

8. emarginatus Schall. Auf Schlamm, s. sltn.

### 5. Berosus Leach.

9. aericeps Curt. Auf Schlamm, s. sltn.

### 6. Hydrophilus Geoffr.

10. piceus L. In stehenden Gewässern, z. hfg.

11. \* aterrimus Eschs. Desgl.

12. \* caraboides L. Desgl., s. hfg., verfliegt sich bisweilen, so daß man ihn an Orten findet, wo er seiner Natur nach nicht leben kann.

### 7. Hydrobius.

13. \* fuscipes L. (scarabaeoides F.) Ratibor, Kupp u., im Dünger, s. gemein.

14. \* limbatus F. Im Dünger, nicht hfg.

15. \* testaceus F. (grisescens Gyll.) Wie 13.

16. \* melanocephalus F. Desgl.

17. \* griseus F. Desgl., weniger hfg.

18. \* marginellus F. Desgl., auch unt. M., z. sltn.  
\* var: affinis Pk. Desgl.

### 8. Cyllidium Ex.

19. seminulum Pk. Unter Moos, sltn.

### 9. Cyclonotum Dej.

20. \* orbiculare F. Im Dünger, im Wasser, unter nassem Gemille, bis ins Gebirge, hfg.

### 10. Limnebius Leach.

21. \* truncatellus Pk. Frühj., unter M., sltn.

11. Laccobius Leach.
22. \* minutus L. Im Dünger, unter nassem Gemille, hfg.

### 12. Sphaeridium F.

23. \* scarabaeoides L.
24. \* marginatum F. } Im Dgr., überall gem.
25. \* 2-pustulatum F. }

### 13. Cercyon Leach.

26. \* haemorrhoidale F. Im Dünger, z. hfg.
27. \* haemorrhorum Gyll. Desgl., auch b. Ustron.
28. \* flavipes F. Wie 27, aber s. hfg.

29. \* melanocephalum L. Wie 26.

30. \* 1-punctatum L. Desgl., aber s. hfg.

31. stercorarium Ullr. Obora, Kupp, Ustron, z. sltn.

32. terminatum St. Ustron, im Gemille, s. sltn.

33. \* centrimaculatum St. Obora, Pv., nicht hfg.

34. \* pygmaeum Ill. Obora, Pawlauer-Wald, Ustron, nicht sltn.

35. \* anale Pk. Obora, Pv., z. sltn.

36. lugubre Pk. Obora, s. sltn.

37. minutum F. Desgl.

38. atomarium F. Im Dünger, unter Moos, überall, gemein.

## IX. Lamellicornia.

### 1. Gymnopleurus Ill.

1. pilularius F. Ustron. (H.)

### 2. Copris Geoffr.

2. \* lunaris L. Im Dünger, durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, hfg.

### 3. Onthophagus Ltr.

3. \* medius Kug. Im Frühjahr und Herbst unter Laub und Moos, im Sommer

4. \* vacca L. Herbst unter Laub und Moos, im Sommer

5. \* coenobita Hb. Unt.Dgr., mehr oder we-

6. \* fracticornis PrL. niger hfg., selbst i. Geb.

7. \* nuchicornis L. Auf der Landdecke, unter Laub

8. nutans F. und Moos, s. sltn.

9. lemur F. und Moos, s. sltn.

10. \* taurus L. Um Ratibor und Ustron nicht selten, besonders die Weibchen.

11. capra F. Mit 10 zusammen, jedoch sltn.

12. \* Schreberi L. Im Dünger, überall, gem.

13. *furcatus* F. Im Dünger, s. sltn.  
14.  $\approx$  *ovatus* L. Wie 12.

**4. Oniticellus** Zgl.

15. \* *flavipes* F. Fand ich vor einigen Jahren unweit Rybnick im Kuhdüniger, z. hfg.

**5. Aphodius** Ill.

Die Aphodiens leben überall im Düniger, im Frühjahr und Spätherbst findet man einzelne Sp. auch unter Laub, M., Gem. u.

16.  $\approx$  *subterraneus* L. Bis ins Gebirge, hfg.  
17.  $\approx$  *erraticus* L. Desgl.

18.  $\approx$  *fossor* L. Desgl.  
var: *sylvaticus* seltener.

19. *terrestris* F. Ustron, s. sltn.

20. *scybaliarius* F. S. sltn.

21. *foetens* F. Desgl.

22. \* *similis* L. Ueberall, bis ins Geb., gem.

23. 4-*maculatus* L. Bei Rybnick, 4 Gr.

24. \* *haemorrhoidalis* L. Wie 22.

25. *pussillus* Hb. Desgl.

26. 2-*maculatus* F. S. sltn.

- var: *niger* St. häufiger.

27. 4-*guttatus* Hb. Obora, Rybnick, s. sltn.

28.  $\approx$  *rufescens* F. Ratibor, Kupp und andern Orten, gemein.

29.  $\approx$  *sordidus* F. Desgl.

- var: 4-*punctatus* seltener.

30. \* *immundus*. 3. sltn.

31. *nitidulus* F. Ustron, sltn.

32. \* *merdarius* F. Nicht hfg.

33. \* *prodromus* Brhm. Hfg.

34. *melanostictus* Schüpp. S. sltn.

35.  $\approx$  *inquinatus* F. } S. gemein.  
var: *nobilis* Pz. }

36. *sus* F. Hinter der Lukafine im Schweindünger, s. sltn.

37. *rufipes* L. Ratibor, Ustron, Karlsbrunn, s. sltn.

38. *luridus* F. Desgl., aber hfg.

39.  $\approx$  *nigripes* F. S. hfg. Dürfte doch wohl eigene Art sein.

40. *pecari* F. Vor einigen Jahren fand ich diesen Käfer s. hfg. auf der Planier Haltung, seit ein Theil derselben zu Ackerland gemacht worden — nicht wieder.

**6. Oxyomus** Eschs.

41. *asper* F. Ratibor und Ustron, sltn.

42.  $\approx$  *porcatus* F. Ratibor, Kupp, Ustron, im Düniger und im Fluge, hfg.

**7. Trox** F.

43. \* *sabulosus* L. Im angeschwemmten Geleiste, s. sltn.

44. *scaber* L. Desgl., noch seltener.

**8. Geotrupes** Ltr.

45. *Typhoeus* L. Kupp, Krascheow, s. sltn.

46.  $\approx$  *stercorarius* L. Ueberall gemein.

47. *politus* Malin. Mit 46 zusammen, seltener.

48.  $\approx$  *sylvaticus* F. Besonders in Kieferwäldern hfg., auch bei Ustron und Karlsbrunn, aber seltener.

49.  $\approx$  *vernalis* L. Wie 48. var: sehr in Farbe (blau, grün, schwarz u.) Größe u. Punctirung.

**9. Bolboceras** Kirby.

50. \* *mobilicornis* F. Klingebeutel, in Kartoffelfeldern, Sawade in Laubholz schwärmen, sltn.

**10. Oryctes** Ill.

51.  $\approx$  *nasicornis* L. Ratibor, Adamowiz, Falkenberg, Kupp, Krascheow, in faulen, modrigen Holzstückchen, Höhe u. z. hfg.

**11. Anomala** Mgl.

52.  $\approx$  *julii* F. Auf jungen Saalweiden, Erlen, oft hfg.

- var: *Frischii* F. Desgl., auch bei Kupp, Falkenberg u.

53.  $\approx$  *horticola* L. Durch das ganze Gebiet bis ins. Gebirge, hfg.

**12. Anisoplia** Mgl.

54. *agricola* F. Landecke, Falkenberg, s. seltn.

55. \* *fruticola* F. Rybnick, z. hfg., Kupp, Falkenberg, Krascheow, z. sltn.

**13. Melolontha F.**

- 56.\* *fallo* L. 5, 6. Hinter dem Schloße bei Ratibor, um Weidengebüsch in manchen Jahren hfg. und besonders nach Sonnenuntergang schwärzend; auch bei Kupp (im Kieferwalde und an Maulbeerbäumen), Falkenberg, jedoch sltn.  
 57.\* *vulgaris* F. Durch das ganze Geb. hfg.,  
 58.\* *hippocastani* F. jedoch meist getrennt, so daß in dem einen Jahre 57 in einem andern Jahre 58 häufiger vorkommt.

**14. Rhizotrogus Latr.**

- 59.\* *aestivus* Ol. 7. Ustron, hfg., besonders auf der großen Czantori, wo er bei schwüler Mittagssonne in großer Menge umherschwärmt.  
 60.\* *solstitiales*. 7. Durch das ganze Geb., besonders bei Ustron, s. hfg.  
 61. *ruficornis* F. Rybnik, Falkenberg, s. sltn.  
 62. *aprilinus* Crtz. Edke., s. sltn.

**15. Omaloplia Mgl.**

- 63.\* *brunnea* L. Pw., s. sltn.; Falkenberg, Kupp, Ustron, spät nach Sonnenuntergang schwärzend, z. hfg.

1844 fand ich in Kupp eine starke Kiefer an der Sonnenseite von Kienensämlern angeschlagen. Der Anschlag ging etwa ein Drittel in die Kiefer hinein und hatte im Neuhorn etwa 1 Fuß Höhe. In Folge der Sonnenhitze tropfste das ausschmelzende Harz auf die untere Fläche, wo es sich bereits in zieml. Menge angehäuft hatte und täglich vermehrte. In diesem Harze fand ich eine Menge von O. brunnea, theils tot und mit Harz bedeckt, theils lebend und darauf unverkrautet. Obgleich ich fast jeden Abend diesen Baum besuchte, so fand ich den Käfer doch nie schwärzend, dagegen fand ich an sonnigen Morgen immer neue Ankommlinge auf dem Harze sitzend, die nach und nach wieder mit Harz bedeckt wurden. Einige andere, nicht hierher gehörige Insekten, fanden mit ihm ihr Grab, jedoch schwärzten andere Käfer diese Gefahr zu vermeiden. Später ließ mir ein Freund diese Harzlage aussagen und ich sendete sie dem Prof. Dr. Göppert in Breslau. Das Ganze erinnerte deutlich an die im Bernstein befindlichen Insekten &c.

64. *variabilis* F. Ob., im zeitigen Frühjahr in Ackerfurchen unter Laub, ganz frisch ent-

wickelt, später auch an andern Orten, sltn.; Falkenberg (Rd.).

**16. Hoplia Ill.**

65. *argentea* F. 6. Bschp., auf jungen Papeln; Kupp a. Gräsern; Falkenberg s. sltn.  
 66.\* *pulverulenta* Ol. Im Frühj. bei hohem Wasserstande an d. Oder auf Grashalmen sitzend, bisweilen hfg.  
 67. *graminicola* F. R., Kupp, Krascheow, Falkenberg, sltn.

**17. Osmoderma Serv.**

- 68.\* *eremita* F. R., Krascheow, Rosenberg, Kupp, Falkenberg, besonders in dem Wurmmehl alter Eichen, wo die Larve oft s. hfg. vorkommt.

**18. Enorimus Serv.**

69. *variabilis* L. (8-punctatus F.) Rauden, Landsberg, Krascheow, Kupp, Falkenberg, an Erlen, Flieder u. modriger Erde, s. sltn.  
 70.\* *nobilis* 6—8. Jawade, Edke., sltn.: Ustron auf Sp. Aruncus s. hfg.; Kupp, an dem Ausfluß alter Eichen (Kb.), Falkenberg.

**19. Trichius F.**

- 71.\* *fasciatus* L. Im jungen Laubholz auf Bl., bes. Spiräen, R., Ustron, Gesenke, hfg.

**20. Valgus Scr.**

- 72.\* *hemipterus* L. Wie der vorige, doch auch unter Gemüse und Laub.

**21. Cetonia F.**

73. *fastuosa* F. Jawade, Falkenberg, Kupp. Die Larve und Nymphe wurde in der Mädererde hohler Eichen (z. Th. beim Ausnehmen wilder Bienen) gefunden und daraus der Käfer erzogen, den man auch an dem ausfließenden Saft sitzend fand.

74. *aenea* And. Auf Bl., besonders Rosen, Spiräen &c., in Gärten, nicht hfg.

- 75.\* *marmorata* F. Desgl., z. hfg.

- 76.\* *aurata* L. Überall, bis ins Geb., s. hfg. Unn. Unter den Varietäten könnten sich noch andere Arten befinden.

77.\* *hirta* F. R., Sawade, Krascheow, Kupp,  
auf Hierac. Pilosella u. and. ähnl. Blm.

**22. *Lucaeus* L.**

78.\* *cervus* L. R., Rosenberg, Krascheow,  
Kupp, Falkenberg, Freistadt ic. Die Larve  
im Wurmmehl alter Eichen, den Käfer am  
Tage an Eichen sitzend und nach Sonnen-  
untergang umherfliegend, nicht sltn.

79.\* *capreolus* F. R., Sawade, Kupp, Frei-  
stadt, lebt auf ähnl. Weise wie 78, jedoch  
findet man die Larve auch in alten Wei-  
den, z. sltn.

**23. *Doreus* Mg.**

80.\* *parrallelepipedus* L. R., Krascheow, Kupp,  
Falkenberg, in hohlen Eichen, auch in der  
Rinde alter Stöcke, nicht sltn.

**24. *Platycerus* Ltr.**

81.\* *caraboides* L. R., Krascheow, Kupp, Fal-  
kenberg, Ustron, Karlsbrunn, an Holzklas-  
tern, unter der Rinde, an Bmst. ic. nicht  
häufig.

82.? *rufipes* F. Ob., Edke., auf ähnl. Weise,  
aber sehr selten.

**25. *Sinodendron* F.**

83.\* *cylindricum* L. R., Grätz, Rosenberg, Kupp,  
Falkenberg, Ustron, Karlsbrunn, unter der  
Rinde alter Stöcke ic., bisweilen z. hfg.

## II. Heteromera.

### I. Melasomata.

**1. *Blaps* F.**

1.\* *mortisaga* L. R., Kupp, Ustron, in Kellern,  
feuchten Wohnungen ic. nicht slt., obwohl  
immer vereinzelt.

**2. *Opatrum* F.**

2.\* *sabulosum* L. Unter nassem Moos und  
Gemille, auf Schlamm ic., überall, hfg.

**3. *Microzoum* Dej.**

3.\* *tibiale* F. Obora, unter Laub, sehr sltn.

**4. *Crypticus* Latr.**

4. *quisquilius* L. R., Kupp, unter Moos auf  
Sandboden, s. sltn.

### II. Taxicornia.

**1. *Eledona* Ltr.**

1. *reticulata* L. R., Sawade, unt. Rinde, s. sltn.  
2.\* *agricola* F. R., unt. Rinde u. i. Schwämme  
an alten Weiden, hfg.

**2. *Leiodes* Ltr.**

3. *castanea* Kug. 7. Kupp, unter Rinde an  
einem alten Fichtenstocke 3 Ex.

**3. *Anisotoma* Kn.**

4. *picea* Kug. Sawade, s. sltn. (Z.)  
5. *Triepkii* Schdt. R., Kupp, unter trockenem  
Gemille, um Bmst., s. sltn.

6. *dubia* Jll. Obora, Stw., wie 5.  
\*var. *ferruginea* St. Obora, Kupp, Ustron,  
wie 5, weniger sltn.

7. *ciliaris* Schdt. Obora, wie 5. (Th.)

8. *parvula* Sbg. Stw. unter Moos, s. sltn.

9. *badia* St. Ustron s. sltn. (Th.)

10. *dentipes* Gyll. (Colenis Er.) Stw., unter  
Moos, s. sltn.

**4. *Neomida* Zgl.**

11. *2-color* F. (aenea Pk.) R., Kätscher in  
der Modererde hohler Bmst. besonders Wei-  
den, s. sltn.

**5. *Diaperis* Geoffr.**

12. *boleti* L. R., Rosenberg, Ustron, Karls-  
brunn, in Baumshwämmen, unt. d. Rinde  
alter Stöcke, überall sltn.

**6. *Tloma*.**

13.\* *culinaris* F. Adamowitz, Kupp, Ustron,  
unt. der Rinde alter Fichtenstöcke, s. sltn.

**7. *Hypophloeus* Hillwg.**  
14.\* *castaneus* F. R.-Hammer, Ustron, Karls-  
brunn, unt. d. Rinde alter Fichtenstämme,  
z. hfg.

15. *fraxini* Kug. R., 2 Ex. aus einem Eschen-  
stocke herausgebohrt.

16. *2-color* F. 4. Matibor, unter Rinde alter  
Weiden, sltn.

17. *piceae* Rtzbg. Raubden, Kuchelna, unter Tannen- und Fichtenrinde stehender Klaftern, z. sltn.

### III. Tenebrionida.

#### 1. *Orchesia* Ltr.

- 1.\* *micans* Ill. Aus Larven, im Schwamm einer hohlen Eiche am Teichdamm b. Brzezie in großer Menge erzogen. (Th.)

#### 2. *Hallomenus* Pk.

2. *humeralis* Rhn. Obora, um Bmst., s. sltn.  
3.\* *affinis* Pk. Ob., Ustron, um Bmst., sltn.

#### 3. *Hypulus* Pk.

4. *quercinus* Quens. Frühj., Dr. D., im Gemüse, an Eichen; Krascheow, an alten Stöcken, sltn.

#### 4. *Serropalpus* Hell.

5. *barbatus* Schall. Ustron, 1 Ex. aus einer alten, mit vielen Bohrlöchern versehenen Platte herausgebohrt (Th.).

#### 5. *Melandrya* F.

- 6.\* *caraboides* L. (*serrata* F.) Ustron, Karlsbrunn, unter Rinde fauler Stöcke, sltn.

#### 6. *Tenebrio* L.

- 7.\* *molitor* L. Im Mülz fauler Bäume z. hfg.; in Bäckereien, Mühlen, Vorrathskammern ist die Larve (Mehlwurm genannt) Stammgast.

### IV. Helopida.

#### 1. *Helops* F.

1. *lanipes* L. Dr. D., im zeitigen Frühjahr s. hfg. um die Wurzeln der Linden, Sawade um die Wurzeln der Eichen, später verschwindet er.

- 2.\* *caraboides* Pz. R., Sawade, Ustron, um Bmst., z. sltn.

#### 2. *Mycetochares* Ltr.

3. *flavipes* F. R., bisweilen auf Bl., jed. sltn.

#### 3. *Omophilus* Mg.

- 4.\* *picipes* F. 6. Bisweilen an Kornähren, z. hfg.

- 5.\* *atra* F. R., Kupp, in hohlen Weiden, an alten Stöcken, nicht sltn.  
6.\* *fulvipes* F. R., Ustron, in feuchten, hölzernen Gebäuden, bisweilen hfg.  
7.\* *sulphurea* L. Brzezie, Ditzmachau, auf Bl., z. hfg.  
8. *evonymi* F. Krascheow (v. F.) s. sltn.  
9. *testacea*, Uebers. 1829, p. 53, habe ich nicht wieder gesehen.

### V. Trachelida.

#### 1. *Lagria* F.

- 1.\* *hirta* F. An Getreideähren, auf Bl., hfg.

#### 2. *Pyrochroa* F.

- 2.\* *coccinea* L. Landdecke, Ustron, Gesenke, meist auf Bl., z. sltn.

3. *pectinicornis* L. Ustron, auf Bl., s. sltn.

#### 3. *Notoxus* Geoffr.

- 4.\* *monoceros* L. Auf Bl., im Gemüse, unt. Eb. ic., überall, hfg.

#### 4. *Anthicus* F.

5. *floralis* L. Obora, unt. trockenem M., s. sltn.

#### 5. *Mordella* F.

- 6.\* *fasciata* F. Ratibor, Kupp, Ustron, auf Bl., nicht sltn.

7. *sericea* Zgl. Desgl., z. sltn.

- 8.\* *aculeata* L. Auf Bl., überall, hfg.

9. *grisea* Fröhl. Auf Bl., sltn.

10. *pumilla* Gyll. Ratibor, Bischoffskoppe, auf Bl., z. sltn.

11. *aterrima* Gyss. Ratibor, Ustron, auf Bl., s. sltn.

12. *abdominalis* F. Pw., auf Bl., s. sltn.

#### 6. *Anaspis* Geoffr.

- 13.\* *frontalis* L. Auf Bl., überall, s. hfg.

- 14.\* *rufilabris* Lt. R., Kupp, Ustron, auf Bl., s. hfg.

15. *flava* L. Brzezie, auf Bl., s. sltn. (H.)

- 16.\* *thoracica* L. R., auf Bl., z. sltn.

## VI. Cantharida.

### 1. Meloe L.

- 1.\* proscarabaeus L. Im Frühjahr an Weizen, oder im Grase.  
 2.\* violaceus Mrsh. kriechend; 1. 2. 5.  
 3. tuccius Rossi. 4. brevicollis Hllw. 5.\* variegatus Don. 3. hfg., bes. 2.

### 2. Cerocoma Geoff.

6. Schaefferi L. R., Adamowiz, Pleß, an Kornähren oder auf Brachen, z. sltn.

### 3. Lytta F.

- 7.\* vesicatoria L. R., Kupp, auf Hollunder, Esche, Ahorn, Pappeln, oft s. hfg.

## VII. Stenelytra.

### 1. Calopus F.

1. serraticornis L. Altwater, Ustron, sltn.

### 2. Asclera Dej.

2. sanguinicollis F. Zawade, im Eibholz, auf Bl., s. sltn.

3. coerulea L. Ustron, s. sltn.

### 3. Oedemera Ol.

4. podagrariae L. Edke., Ustron, s. sltn.

- 5.\* flavescens L. R., Kupp, Bschkp., Ustron, auf Bl., z. hfg.

6. marginata F. Brzezie, auf Bl., sltn.

7. clavipes F. Pw., Ob., auf Bl., sltn.

- 8.\* virescens L. Wie 5.

- 9.\* lurida Mrsh. Desgl., noch häufiger.

### 4. Anocodes Dj.

10. adusta Pz. Karlsbrunn, Ustron, s. sltn.

11. viridipes Mgl. Ustron, s. sltn.

### 5. Chrysarthria Schdt.

12. viridissima L. Brzezie, auf Bl., s. sltn.

- 13.\* viridis Jll. R., Kupp, Belasna, auf Bl., bes. Hyp. perforatum, z. hfg.

### 6. Mycterus Ol.

14. curculioides F. R., Kupp, s. sltn.

### 7. Rhinosimus Latr.

15. planirostris F. R., im Gem., s. sltn.

16. ruficollis Pz. Desgl. (Th.) H. v. 1830, 111.  
 17. roboris F. R., an einer alten Weide, s. sltn.

## III. Tetramera.

### I. Rhynchophora.

#### 1. Brachus L.

1. marginellus F. 6—9. Brzezie, Kupp, vor Bl. geschöpft, s. sltn.

2. pisi F. 8. Brzezie, Pw., desgl.

- 3.\* rufimannus Sch. 8. Obora, desgl., nicht sltn.

- 4.\* granarius L. 6—8. Dom. W., unter Moos und auf Bl., z. sltn.

5. luteicornis Hllw. 8. Auf Wiesen, geschöpft, s. sltn.

6. loti Pk. 6—8. Ratibor, Kupp, Ustron, unter Moos und auf Bl., z. sltn.

7. cisti F. 6—9. Brzezie, auf Saroth. vulvaris, auch aus dem Saamen erzogen, z. hfg.

8. seminarius L. Auf Wiesen, geschöpft, s. sltn.

#### 2. Spermophagus Steven.

9. cardui Stv. 7. Adamowiz, s. sltn.

#### 3. Brachytarsus. Schönh.

10. scabrosus F. Meist unter Rinde, auch in Gärten, gefunden, z. sltn.

- 11.\* varius F. Ratibor, Falkenberg; Rd. fand ihn hfg. in der starken Rinde der Kiefer und Fichte, meist über der Wurzel alter Stämme, wo die Rinde am stärksten ist.

#### 4. Tropideres Schönh.

12. albirostris H. 8. Edke., Landsberg, s. sltn.

#### 5. Platyrhinus Clairv.

13. latirostris F. Brzezie, an einer Klafter, 1 Gr.

#### 6. Anthribus Geoffr.

- 14.\* albinus L. 6—8. Obora, Brzezie, an Buchen, z. sltn.

7. *Apoderus* Ol.
- 13.\* *coryli* F. et *avellanae* L. 6—10. Durch das ganze Gebiet, auf Haselnusssträuchern, jungen Pappeln, Erlen, Birken, sehr verbreitet. Auf Wiesen, im Kiefernwald, auf den Moossträuchern.
- 16.\* *intermedius* Pz. Edke, Sawade, Karlsbrunn, wie 15, aber z. sltn.
8. *Attelabus* L.
- 17.\* *curculionoides* L. 6—9. Wie 15.
9. *Rhynchites* Hb.
18. *Bacchus* L. 6—9. St., Kupp, Krascheow, auf jungem Laubholz, z. sltn.
19. *coeruleocephalus* Schall. Ratibor, Krascheow, wie 18.
20. *aequatus* L. Brzezie, Ruchelnad, s. sltn.
21. *cupreus* L. 8. Obora, s. sltn.
22. *planirostris* F. 6. Pv., s. sltn.
23. *conicus* Ill. (*alliariae* F.) Ob., Pv., z. hfg.
24. *pauxillus* Grm. Desgl.
25. *minutus* Hb. Desgl.
- 26.\* *nanus* Pf. 5—9. Auf Bl., jungem Laubholz, überall s. gemein.
- 27.\* *populi* L. Desgl., auch s. hfg.
- 28.\* *betuliti* F. Desgl., aber weniger hfg.
29. *pubescens* F. Pv., s. sltn.
30. *tristis* F. Desgl.
- 31.\* *betuleti* L. Wie 27.
10. *Rhinomacer* F.
32. *attelaboides* E. 6. Obora, auf Bl., s. sltn.
11. *Diodyrhynchus* Grm.
33. *austriacus* Mgl. 6. Obora, auf Bl., s. sltn.
12. *Apion* Hb.
- 34.\* *pomonae* F. Unter Moos; auf Bl. der Obstbäume u., s. gemein.
- 35.\* *craccae* L. Auf Bl., bes. Leguminosen, doch auch unter Moos, hfg.
36. *subulatum* Krb. Pv., s. sltn.
37. *stolidum* Gyll. Dw., s. sltn.
38. *vicinum* Krb. Obora, Dw., sltn.
39. *atomarium* Kr. 5—7. Desgl.
40. *penetrans* Gr. Im Frühjahr hinter dem Schloß unter Moos, sltn.
41. *tenue* Krb. 5—7. Auf Wiesen, z. sltn.
- 42.\* *aeneum* F. Im zeitigen Frühj. u. Spät herbst unt. M., um Sträucher.
- 43.\* *radiolus* Krb. u. Bst., im Sommer a. Bl.
- 44.\* *onopordi* Krb. z. hfg.
45. *gibbirostre* Gyll. Frühjahr, unter Moos;
46. *brevirostre* Hb. ( ) s. sltn.
47. *pallipes* Krb. Brzezie. (H.)
- 48.\* *fuscirostre* F. Brz. B., Bschp., auf Saroth. vulgaris, s. hfg.
- 49.\* *difficile* Hb. 5. 6. Brz. B., unter Heidekraut, nicht sltn.
50. *genistae* Krb. Auf Ginster, aber s. sltn.
51. *flavofemoratum* Hb. Brz. B., Pv., s. sltn.
- 52.\* *vernale* F. Frühjahr, unter Moos, um Sträucher und Baumstämme, nicht hfg.
53. *viciae* Pk. Auf Wiesen, von Leguminosen geschöpft, sltn.
54. *dissimile* Grm. Von Bl. geschöpft,
55. *varipes* Grm. s. sltn.
- 56.\* *apricans* Hb. Frühjahr bis Herbst, unt. Moos, auf Bl. u., z. hfg.
57. *ononides* Gyll. An Grabentändern von Bl. geschöpft, s. sltn.
- 58.\* *flavipes* F. Wie 56.
59. *aestivum* Grm. Auf Wiesen, von Bl. geschöpft, s. sltn.
- 60.\* *assimile* Gyll. Auf Bl., unter Moos, nicht sltn.
61. *nigritarse* Krb. Obora, Giesmannsdorf, geschöpft, sltn.
- 62.\* *miniatum* Sch. 6—8. Auf Wiesen, bes. von Rumex Acetosa geschöpft, z. hfg.
63. *haematodes* St. Auf Wiesen, s. sltn.
- 64.\* *frumentarium* L. Pv., auf Wiesen, z. hfg.
65. *sanguineum* De G. Dw., s. sltn.
- 66.\* *seniculus* Krb. Ob., Pv., Wiesen, z. sltn.
- 67.\* *civicum* Grm. Desgl.
- 68.\* *foraminosum* Grm. Desgl.

- 69.\* *columbinum* Grm. Proschowiz, Obora, z. s.ltn.
70. *superciliosum* Gyll. Unter Moos, s. s.ltn.
71. *ebeninum* Kb. Desgl.
72. *platalea* Grm. Giesmannsdorf, s.ltn. (H.)
73. *ervi* Krb. Obora, Bischofskoppe, s. s.ltn.
- 74.\* *virens* Hb. Auf Wiesenblumen, unter Moos um Geäst, nicht hfg.
75. *punctigerum* Grm. Pw., s. s.ltn.
76. *foveolatum* Krb. In Obstgärten, s.ltn.
- 77.\* *aethiops* Hb. Unter Moos, auf Bl., z. hfg.
- 78.\* *astragali* Pk. Pw., Obora, unter Moos, auf Bl., z. s.ltn.
- 79.\* *vorax* Hb. Obora, Pw. ic., unter Mors, auf Bl., hfg.
80. *pavidum* Grm. Pw., s. s.ltn.
81. *pisi* Mgl. Von Leguminosen geschöpft, auch im Gesenke, s.ltn.
- 82.\* *sorbi* Hb. Obora, Pw., Zaunp. unter Moos, auf Bl., z. s.ltn.
83. *dispar* Grm. Pw., Escheit, s. s.ltn.
- 84.\* *atratulum*. Obora, Landecke, Bischofskoppe, auf Bl., nicht hfg.
- 85.\* *humile* Grm. Obora, Pw., auf Bl., z. s.ltn.
86. *simum* Grm. Desgl., s. s.ltn.
87. *minimum* Hb. Brz. W., auf Bl., s. s.ltn.
88. *violaceum* Krb. Ob., Desgl.
- 89.\* *marchicum* Hb. Auf Wiesen, geschöpft, z. s.ltn.
90. *angustatum* Krb. Desgl., s. s.ltn.
91. *aterimum* Krb. Desgl.
13. *Thylacites* Grm.
- 92.\* *pilosus* F. Nudnik, Pw., Bschkp., im jungen Laubholz, z. s.ltn.
14. *Cneorhinus* Schoenh.
93. *geminatus* F. R., Kupp, Falkenberg, an jungen Erlen, Birken u. Kiefern, nicht hfg.
15. *Strophosomus* Billbg.
- 94.\* *coryli* F. Im jungen Laubholz, unter M. ic., überall, hfg.
- 95.\* *cervinus* Grm. Desgl.; er ist kleiner und weniger hfg.
- 96.? *affinis* Dj. R., Kupp, wie 94, z. s.ltn.
97. *faber* Hb. Kraschew. (v. F.)
98. *squamulatus* Hb. Pw., unt. Eb. u. M., s. s.ltn.
16. *Scinophilus* Schvenh.
- 99.\* *muricatus* F. 6—10. Wie 94.
17. *Brachyderes* Schvenh.
- 100.\* *incanus* L. Frühj. und Herbst unter M. um Bmst.; im Sommer an Kiefern, Tannen, Klafterholz ic. Er durchsieht die jüngsten Triebe der jungen Kiefern, daß sie später umknicken. (Kb.)
18. *Eusomus* Grm.
- 101.\* *oculum* Jll. Auf Weiden und jungen Pappeln s. hfg., bisweilen auch auf Bm.
19. *Tanymecus* Grm.
102. *palliatus* F. Wie 100, wird auch oft mit demselben verwechselt.
26. *Sitones* Schoenh.
103. *griseus* F. Pw., an Klaftern, s. s.ltn.
104. *regensteinensis* Hb. Pw., unt. M., s. s.ltn.
- 105.\* *lineellus* Bonsd. Unter Moos, Gemille, auf Bl., z. hfg.
106. *tibialis* Hb. Desgl.
107. *sulcifrons* Thbg. Desgl.
- 108.\* *lineatus* L. Desgl., s. hfg.
- 109.\* *hispidulus* F. Desgl.
21. *Scytropus* Schoenh.
- 110.\* *mustela* Hb. Auf Bl., z. s.ltn.
22. *Chlorephanus* Dalm.
111. *viridis* L. Auf Weiden a. d. Ober,
- 112.\* *graminicola* Mgl. im jung. Ebholz, n. s.ltn.
23. *Polydrusus* Grm.
- 113.\* *undatus* F. Frühj. und Herbst unter M., sonst im jungen Ebholz, s. hfg.
114. *flavipes* De G. Auf Weiden, z. s.ltn.
115. *corruscus* Mur. Desgl.
- 116.\* *cervinus* L. Wie 113.
- 117.\* *picus* F. Desgl.

118. *\* sericeus* Schall. Auf Weiden, jungen Birken, Pappeln u., in vielen Abänderungen, s. hfg.
119. *\* micans* F. Im jungen Lbhlz., in der Ebene nicht so hfg. als im Gebirge.
120. *amoenus* Grm. Ustron, im Lbhlz. geschöpft, z. sltn.
- 24. Metallites** Schoenh.
121. *\* mollis* Grm. Ob., Kupp, Falkenberg, Bschp., Ustron, Karlsbrunn, auf Blättern und Bl., hfg.
122. *\* atomarius* Ol. Desgl.
- 25. Cleonus** Schoenh.
123. *\* marmoratus* F. Edke., an einer Klft., 2 Er.
124. *nebulosus* L. Krascheow, auf Kiefern u. Pappeln, nicht sltn. (v. F.)
125. *sulcirostris* L. R., Kupp, Krascheow, an Klaftern u., vereinzelt, jedoch nicht sltn.
126. *albidus* F. Brz. W., an Klaftern, s. sltn.
127. *glaucus* F. Krascheow, Kupp, Falkenberg, an Kiefern-Stangenholz, an Klft., z. sltn.
- 26. Alophus** Schoenh.
128. *\* 3-guttatus* F. An Klaftern, im Gem. u., überall, z. hfg.
- 27. Liophloeus** F.
129. *\* nubilus* F. Unt. Moos, Gemille, an Wegen, auf Lbhlz., Klaftern, überall, gemein.
130. *Herbstii* Mgl. Nur 1 Er., i. Gem. gefangen.
- 28. Barynotus** Grm.
131. *\* obscurus* F. Wie 128.
- 29. Tropiphorus** Schoenh.
132. *mercurialis* F. Unt. M. u. Gem., s. slt.
- 30. Lepyrus** Grm.
133. *\* colon* F. Wie 129.
134. *\* 2-notatus* F. Wie 129.
- 31. Tanysphyrus** Grm.
135. *lemnae* F. Kupp, s. sltn.
- 32. Hylobius** Schoenh.
136. *\* abietis* L. Überall, bis ins Gebirge, auf Klaftern, behauenem Holze, in Tannen-, Fichten- und Kieferwäldern, s. hfg.
- 33. Molytes** Schoenh.
137. *coronatus* Ltr. Ustron u. Karlsbrunn, slt.
138. *\* flavomaculatus* Mgl. Einige Er. bei Katscher an d. Blättern von Petas. off.; hfg. im Gesenke auf ders. Pf. und auf Cac. albifrons.
139. *germanus* L. Karlsbrunn. (Ol.)
- 34. Leiosomus** Krb.
140. *cribrum* Mgl. Ustron, s. sltn.
- 35. Plinthus.**
141. *Megerlei* Pz. Ultvater, s. sltn.
- 36. Phytonomus** Schoenh.
142. *\* punctatus* F. 6—8. Unter trockenem M., Gem., Klftn., nicht sltn.
143. *oxalis* Hb. Desgl., sltn.
144. *elongatus* Pk. } Desgl.  
var. *variabilis* Zgl. }
145. *mutabilis* Grm. Desgl.
146. *\* rumicis* L. Auf Wiesen, unter Moos, Gemille u., z. hfg.
147. *\* Pollux* F. Desgl.
148. *\* suspiciosus* Hb. Desgl.
149. *plantaginis* De G. Desgl., z. sltn.
150. *murinus* F. Wie 146.
151. *variabilis* Hb. Wie 149.
152. *\* polygoni* L. Wie 146.
153. *meles* F. Wie 149; bes. auf Kleefeldern.
154. *\* nigrirostris* F. Wie 146, bes. auf niedr. Pflanzen.
- 37. Phyllobius** Schoenh.
155. *\* calcaratus* F. 6—8. Um R., übhpt. in der Ebene z. sltn.; im Geb., bei Ustron, Karlsbrunn, am Glaserberge, auf verschiedenen Pflanzen, s. hfg.
156. *pyri* L. Obora, Falkenberg, Karlsbrunn, z. sltn.
157. *psittacinus* Zenk. Auf verschiedenen Pf., z. sltn.
158. *\* argenteus* L. Durch das ganze Geb., bes. auf Weiden, s. hfg.

159. *maculicornis* Grm. R., Falkenberg, z. sltn.  
 160. \* *oblongus* L. Wie 157.  
 161. \* *sinuatus* F. Obora, auf Moos, z. sltn.  
 162. \* *vespertinus* F. Brzezie, Falkenberg, Gesenke, auf jungem Laubholz, nicht sltn.  
 163. *viridicollis* F. Obora, Falkenberg, Gesenke, z. sltn.

**38. Trachyphloeus** Grm.

164. \* *scabriusculus* L. 6—8. Unt. M., z. sltn.  
 165. *setarius* Sch. Desgl., f. sltn.

**39. Omias** Grm.

166. *hirsutulus* F. Unter Moos, f. sltn.  
 167. \* *brunneipes* Ol. 6—8. Lhnst., Stw., unter Moos um Eichenstämme, z. hfg.

**40. Ottiorhynchus** Grm.

168. *niger* F. 7. 8. Karlsbrunn und Ustron, unter St., auf den Blättern von Pet. vulgaris, Cac. albifrons ic., sltn.  
 169. *villosopunctatus* Zgl. Desgl., z. sltn.  
 170. *fuscipes* Ol. Desgl., f. sltn.  
 171. \* *tenebricosus* Hb. Durch das ganze Gesenke und Kłocicz-Gebirge, f. hfg.  
 172. \* *irritans* Hb. 7. 8. Ratibor, sltn.; Kupp., auf Sal. cinerea und aurita, f. hfg.  
 173. *laevigatus* F. Ratibor, Falkenberg, f. sltn.  
 174. *morio* F. 7. Karlsbrunn. (H.)  
 175. *unicolor* Hb. 7. Ustron, Karlsbrunn, f. sltn.

176. *nigrita* F. 6. Wschp., unter St., f. sltn.  
 177. \* *lepidopterus* F. 6—8. Wschp., Ustron, unter St. und Gemüse, z. sltn.

178. \* *gibbicollis* Schdt. 7. Obora, Stw., Ustron, unter St. und Gemüse, z. sltn.

179. *orbicularis* Hb. Wie 175.

180. *pauper* Zgl. Im Gesenke und Kłocicz-Gebirge, f. sltn.

181. \* *hirticollis* Hb. 6. Wschp., im Lbholz, geschöpf., z. sltn.

182. \* *raucus* F. Ratibor, unter Moos und Gemüse, im Lbholz, nicht sltn.

183. \* *septentrionis* Hb. R., Kupp., wie 182.

184. \* *ligustici* L. Unter Gemüse, an Wegeu. z. hfg.  
 185. *austriacus* F. Unt. M., um Binst., z. sltn.  
 186. \* *aerifer* Schüpp. Ratibor, Ustron, Karlsbrunn, unter Moos und St., z. sltn.  
 187. *costatopunctatus* Dj. Desgl.  
 188. \* *ovatus* L. 6—8. Ratibor, Borutin, Wschp., Ustron, Karlsbrunn, nicht sltn.

**41. Lixus** F.

189. \* *appendiculatus* Kn. Ob., an Leichrändern, z. sltn. und meist schon sehr abgestaubt.

190. *bardanae* F. Rauden. (H.)

**42. Pissodes** Grm.

191. \* *piceae* Jll. Ratibor, Kupp., Krascheow, Falkenberg, im Gebirge, auf Holzschlägen z. hfg. Er geht oft bis einige Linien tief ins Holz hinein.

192. *pini* L. Desgl., führt auch eine ähnliche Lebensweise, hält sich aber mehr an Kiefern als an Tannen ic.

193. *notatus* F. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, leider nur zu sehr verbreitet und gefannt.

**43. Magdalimus** Grm.

194. \* *violaceus* L. 6—8. Adamowiz, Rauden, Kupp., Krascheow, Falkenberg. In Kiefern-Schonungen an den jungen Trieben oft f. hfg. Ich fand die Larve stets in der Marköhre von oben nach unten arbeitend, hfg. auch Nympsen und z. Th. ausgebildete Käfer.

195. *duplicatus* Grm. Desgl., aber f. sltn.

196. *phlegmaticus* Hb. R., Falkenberg, f. sltn.

197. *carbonarius* F. Desgl.

198. *atramentarius* Mgl. (*aterrimus* Hb.) R., Falkenberg. Brütet in Rüsterästen. Rd.

199. \* *pruni*. In Obstgärten, an Baumstämmen und Pflanzen sitzend, z. hfg.

**44. Erihinus** Schönh.

200. \* *acridulus* L. Frühjahr bis Herbst, unter Moos, Gemüse, auf Holzplätzen, bis ins Gebirge, f. hfg.

201. *aethiops* F. 7. Ustron, f. sltn.

45. **Dorytomus** Grm.
- 202.\* **vorax** F. Obora, Pw., unter Moos, im jungen Laubholz, nicht sltn.
- 203.\* **tremulas** Pk. Desgl.
- 204.\* **taeniatus** F. Desgl.
- 205.\* **majalis** Pk. Desgl.
- 206.\* **pectoralis** Pz. Desgl.
- 207.\* **infirmitus** Hb. Auf Wiesen, geschöpft, z. sltn.
208. **tertix** L. Desgl., aber sltn.
- 209.\* **dorsalis** F. Obora, Bschfp., int jungen Laubholz, sltn.
46. **Crypsidius** Schönh.
- 210.\* **equiseti** F. Sommer. Von Pfl. an stehenden Gewässern geschöpft, z. sltn.
211. **brunnirostris** F. Im Gem. um Bist., sltn.
47. **Ellescus** Mey.
- 212.\* **2-punctatus** L. 6—8. Obora, Edte., Bschfp., von Bl. geschöpft, z. hfg.
48. **Brachonyx** Grm.
- 213.\* **indigena** Hb. 5—8. Ratibor; Falkenberg, Kupp, an den Mätrieben der Kiefern, z. hfg.
49. **Anthonomus** Grm.
- 214.\* **pomorum** L. 6—9. R., Falkenberg, z. hfg.
215. **rubi** Hb. R., von Bl. geschöpft, s. sltn.
216. **druparum**, R., Falkenberg, z. sltn.
50. **Balanus** Grm.
217. **nucum** L. 8—10. R., Falkenberg, auf Ebbholz., besonders Haselaußsträuchern, z. sltn.
218. **glandium** Mrsh. 6—9. R., Falkenberg, desgl.
219. **venosus** Dhl. Desgl.
220. **villosus** Hb. Desgl., s. sltn.
- 221.\* **crux** F. Ratibor, Bschfp., auf Ebbholz., geschöpft, nicht sltn.
- 222.\* **brassicae** F. Desgl.
- 223.\* **pyrrhoceras** Mrsh. Desgl.
51. **Amalus** Schönh.
224. **scortillum** Hb. Von Bl. geschöpft, z. sltn.
52. **Tychius** Grm.
- 225.\* **5-punctatus** L. Ratibor, unter Moos, auf Bl., nicht sltn.
226. **venustus** F. R., Bschfp., auf Bl., sltn.
- 227.\* **tomentosus** Hb. Ratibor; unter Moos, um Baumstämme, z. hfg.
- 228.\* **picrostris** Desgl., s. hfg.
53. **Sibynes** Schönh.
229. **viscariae** L. Ratibor, unter Moos, um Gesträuch, s. sltn.
230. **primitus** Hb. Desgl.
231. **sodalis** Schüpp. Desgl.
54. **Phytobius** Schmidt.
232. **4-nodosus** Gyll. Ob., unter M., z. sltn.
- 233.\* **4-tuberculatus** F. Obora, Leobschütz, Stadtwald, z. hfg.
55. **Anoplus** Schüpp.
- 234.\* **plantaris** Naez. 6. 7. Pw., Bschfp., auf Bl., z. sltn.
56. **Orchestes** Ill.
- 235.\* **quercus** L. 6—8. Pw., Kupp, Bschfp., im Laubholz, s. sltn.
236. **scutellaris** F. 7. Ustron, im Ebbholz, s. sltn.
- 237.\* **fagi** L. 5—7. Br. W., Bschfp. Kupp, Krascheow, Falkenberg, auf jungem Ebbholz, besonders Rothbuchen, z. hfg.
238. **Jota** F. Ob., Kupp, auf jungen Ebbholz., z. hfg.
- 239.\* **populi** F. 5—11. Auf jungem Laubholz, überall, gemein.
240. **rusci** Hb. 5—10. Obora, Pw., auf jungem Laubholz, nicht hfg.  
(Tachyerges Sch.)
241. **bifasciatus** Sch. Ratibor, Ustron, sltn.
242. **salicis** L. Ratibor, Bschfp., z. sltn.
243. **stigma** Grm. Desgl.
- 244.\* **sulcatus** Sch. Ratibor, Kupp, z. sltn.
57. **Styphlus** Schönh.
245. **setiger** Beck. Ratibor, s. sltn.
58. **Trachodes** Sch.
246. **hispidus** L. R., unt. trockenem Gem., s. sltn.
59. **Lyprus** Schönh.
247. **cylindrus** Pk. Ratibor, unter Moos und Gemille, z. sltn.

- 60. Bagous** Grm.
248. 2-notatus L. 6. 7. An der Oder, sltm.
249. lutulentus Gyll. 6. Obora, unter feuchtem Moos, sltm.
- 61. Baridius** Schönh.
250. artemisiae Hb. 6. Ratibor, von Gräsern geschöpft, s. sltm.
251. chlorizans Mllr. Desgl., sltm.
252. lepidii Mllr. Desgl.
253. T-album L. Auf feuchten Wiesen von Gräsern geschöpft, bes. b. Dw., s. hfg.
- 62. Cryptorhynchus** Ill.
254. \* lapathi 5 — 9. Ratibor, Falkenberg, Kupp, Krascheow, bis ins Gebirge, hfg. Die Larve lebt in 3—6jährigen Erlen, bei 10—20jährigen nur in den Nesten, wo sie bis in die Markröhre eindringt. Wülste und Knoten verrathen ihr Dasein. An Weiden und Kiefern habe ich die Larve noch nicht gefunden.
- 63. Coeloides.**
255. rufirostris Sp. 6. Unter Moos, s. sltm.
256. \* rubicundus Pk. 6—8. Brz. W., Kupp, unter Heidekraut, z. sltm.
257. epilobii Pk. 6. Im Eholz, geschöpft, s. sltm
258. \* guttula F. 6 — 8. Desgl., z. hfg.
259. \* subrufus Hb. Desgl.
260. \* didymus L. Desgl., auch unter Moos, um Bmf., hfg.
261. punctum St. Im Eholz, geschöpft, z. sltm.
262. gerani Pk. Desgl.
- 64. Mononychus** Schüpp.
263. pseudacori F. Edke, im Eholz, geschöpft, s. sltm.
- 65. Ceutorhynchus** Schüpp.
264. suturalis E. 6—8. Obora, Dw., unter Moos, auf Bl., sltm.
265. syrites Grm. Desgl.
266. \* assimilis Pk. Desgl., nicht sltm.
267. depressicollis Gyll. Desgl., sltm.
268. \* erysimi F. 4 — 8. Ratibor, Lubowitz, Ratscher, Kupp, unter Moos, an Weg und Wiesenrändern, auf Bl., hfg.
269. contractus Mrsh. 6 — 8. Unter M., z. sltm.
270. atratulus Gyll. Von Bl. geschöpft, s. sltm.
271. terminatus Hb. Desgl.
272. \* floralis Pk. 4 — 9. Ratibor, Kupp, Bschfp., auf Bl., besonders Glockenbl., s. hfg.
273. convexicollis Sch. Von Bl. geschöpft, s. sltm.
274. \* ericae Gyll. 7 — 9. Obora, Brzezie, auf Heidekraut, hfg.
275. consputus Grm. 8. Pw., auf Bl., s. sltm.
276. echii F. 6. Pw., unter Moos, um Birken, s. sltm.
277. viduatus Gyll. Desgl.
278. raphani F. Im Laubholz geschöpft, sltm.
279. borraginis F. Obora. (H.)
280. fulvitarsis 5. Pw., unter Moos und auf Bl., sltm.
281. litura F. 6. Brzezie, auf Bl., z. sltm.
282. asperifolium Krb. Desgl., s. sltm.
283. chrysanthemi Mllr. Desgl.
284. arquatus Hb. Desgl.
285. melanosticticus Mrsh. Desgl.
286. marginatus Pk. Ob., unt. M., auf Bl., sltm.
287. \* punctiger Mgl. 5 — 8. An der Oder, auf niedrigen Pfl., z. sltm.
288. \* sulcicollis Gyll. Obora, Wiesen, geschöpft, nicht sltm.
289. \* alauda F. 5 — 9. Obora, Pw., auf Bl. zwischen Eholz, hfg.
290. rapae Gyll. 5—7. Obora, Bschfp., im Eholz, z. sltm.
291. hirtulus Schüpp. 5. 6. Pw., Brz. W., unter Moos, sltm.
292. \* troglodytes 5—9. Ratibor, Zwockau, Bschfp., auf Bl., hfg.
293. ignitus Grm. Unter Moos, s. sltm.

66. *Rhinocerus* Schönh.
294. *castor* F. 6—9. Ratibor, Kupp, unter Moos, auf niedrigem Pf., j. hfg.
295. *bruchoides* Hb.
296. *inconspectus* Hb. } R., unter Moos, um
297. *pericarpius* F. } Gestrauch, s. sltn.
298. *subfasciatus* Gyll.
299. *albicinctus* Sch.
67. *Poophagus* Schönh.
- 300.\* *sisymbrii* F. Ratibor, an der Oder, auf Bl., sltn.
68. *Rhytidosomus* Schönh.
301. *globulus* Hb. R., unter Moos, s. sltn.
69. *Orobitis* Grm.
- 302.\* *cyanus* L. Frühj., unt. Bl. u. M., sltn.
70. *Cionus* Clairv.
- 303.\* *scrophulariae* L. } Ueberall, s. hfg.
- 304.\* *verbasci* F. }
- 305.\* *thapsi* F. Ratibor, Grabowka, Kupp, hfg.
306. *hortulanus* Mrsh. Brzezie, s. sltn.
- 307.\* *blattariae* F. Adamowicz, Rauden, sltn.
71. *Gymnaetron* Schönh.
308. *labilis* Hb. 7. Ustron, s. sltn.
309. *verbasci* Rossi. 6. Grabowka, s. sltn.
- 310.\* *antirrhini* Pk. Von Bl., geschöpf., j. sltn.
311. *netus* Grm. 6. Wsch., s. sltn.
312. *longirostris* Dj. 7. Pw., s. sltn.
- 313.\* *campanulae* L. 6—10. Im Ebbholz, auf Bl., bes. auf Camp. persicif., überall, hfg.
- 314.\* *graminis* Gyll. 6—8. Im Laubholz, auf Bl., j. sltn.
72. *Mecinus* Grm.
- 315.\* *pyraster* Hb. 3—6. Stw., an der Oder, unter Moos und Laub um Eichen und Pappeln, nicht sltn.
73. *Nanophyes* Schönh.
- 316.\* *lythri* F. 5—7. Lhnst., Brz., unter Moos, hfg.
74. *Sitophilus* Schönh.
- 317.\* *granarius* L. In Getreidevorräthen, ein schlimmer Gast für Roggen, Weizen und Gerste, bisw. s. hfg.
75. *Cossonus* Clairv.
318. *linearis* F. Bodland bei Kreuzburg. (v. F.)
319. *ferrugineus* Clairv. Ratibor, s. sltn.
76. *Rhyncolus* Crtz.
320. *chloropus* F. } 4—6. Pw., Stw., un-
321. *porcatus* Mllr. } ter Moos, um Bmf.,
322. *crassirostris* Mgl. } bes. Eichen, aber immer
323. *truncorum* Sch. } nur in einzelnen Gr.
77. *Dryophthorus* Schüpp.
324. *lymexylon* F. Kupp, Krascheow, in Kiefern und Tannenstückchen, oft s. hfg.

## II. Xylophaga.

### 1. *Hylastes* Er.

- 1.\* *ater* Ph. R., Rauden, Kupp, Krascheow, Falkenberg, unter Kieferrinde, hfg.
2. *brunneus* Er. Falkenberg, nur in Stöcken. (Rd.)
3. *cunicularis* Kze. Brzezie, Falkenberg, desgl.
4. *attenuatus* Er. Falkenberg. (Rd.)
5. *angustatus* Kb. R., Kupp, Falkenberg, in Kiefernklästern und Kieferrinde, j. sltn.
6. *opacus* Ill. Adamowicz, Rauden, desgl.
7. *decumanus* Er. Falkenberg. (Rd.)
8. *palliatus* Gyll. Zawade, Kupp, Krascheow, Falkenberg unt. Fichten- u. Kieferrinde hfg.
9. *polygraphus* L. Rauden, Falkenberg, meist in Fichtenstangen, auch wenn sie im gemischten Holz stehen, s. hfg.

### 2. *Mylurgus* Ltr.

10. *ligniperda* F. Rauden, Falkenberg, in Kiefernstückchen, j. sltn.

### 3. *Dendroctonus* Er.

- 11.\* *piniperda* L. Ueberall, bis ins Gebirge, unter Kieferrinde, hfg.
12. *minor* Hrtg. Rauden, Kupp, Falkenberg, desgl.; er scheint 11 nachzufolgen, ist aber seltener und kommt auch in Fichten vor.
13. *pusillus* Kn. Altwater. Uebers. 1844, p. 68.

4. *Hylesinus* F.

- 14.\* *crenatus* F. 8. R., Krascheow, Kupp, Falkenberg, in alten Eschen, bisweilen hfg.  
 15. *fraxini* F. R., Kupp, Falkenberg, in abgestorbenen Eschen, in deren Ermangelung greift er auch gesunde, sogar 8—20j. Stämme an.

5. *Xyloterus* Er.

- 16.\* *domesticus* L. R., Grätz, Ustron, aus alten Rothbuchen herausgegraben, hfg.; Falkenberg hfg. in Birken. (Rd.)  
 17. *lineatus* OI. R., Kupp, Falkenberg, in Kiefernstangen und Klaftern, nicht sltn.

6. *Crypturgus* Er.

18. *cinereus* Hb. Kupp, Falkenberg, im Bast der Kiefern, hfg.  
 19. *pusillus* Gyll. R., Kupp, Krascheow, Falkenberg, in Fichten und Tannen, hfg.  
 20. *pityographus* Rtzbg. Kupp, Falkenberg, in Fichtenhölzern, aber nicht hfg.  
 21. *Lichtensteinii* Rtzbg. Falkenberg, in Fichten bis auf den Splint gehend.

7. *Cryphalus* Er.

22. *piceae* Rtzbg. R., Kupp, Falkenberg, in alten Tannen.  
 23. *asperatus* Gyll. Gesenke. Uebers. 1844, p. 68.  
 24. *abietis* Rtzbg. R., Kupp, Falkenberg, in Kiefernklästern, nicht sltn.

8. *Bostrichus*.

- 25.\* *typographus* L. R., Kupp, Falkenberg, Ustron ic., besonders auf liegendem Fichtenholze, s. hfg.  
 26. *stenographus* Dft. Sawade, Kupp, Falkenberg, in Kiefern-Klästerholz, oft hfg.  
 27. *laricis* F. Sawade, Kupp, Krascheow, Falkenberg, in Kiefernklästern und alten Eichenstämmen, nicht hfg.  
 28. *suturalis* Dj. R., Kupp, Falkenberg, in Kiefernstöcken, z. hfg.

29. *curvidens* Grm. Sawade, Kupp, Falkenberg, in Tannenklästern, alten Tannen; in deren Ermangelung greift er gesunde Stämme an.

30. *chalcographus* L. Sawade, Kupp, Krascheow, Falkenberg, in Kiefernklästern, s. hfg.; man findet die Brut durchs ganze Jahr.

31.\* *bidens* F. Kuchelna, Kupp, Krascheow, Falkenberg, in verkrüppelten und abgestorbenen Kiefern, die Brut wie bei 30.

32. *autographus* Kn. Kuchelna, Kupp, Falkenberg, in Fichten, nicht sltn.

33. *cryptographus* Kug. Falkenberg. (Rd.)

34. *villosum* F. Rauden, Karlsbrunn, auf Klaftern, s. sltn.

35.\* *2-color* Hb. Sawade, Grätz, Kupp, Falkenberg, meist in Rothbuchen, z. hfg.

36. *dispar* Hllwg. R., Kupp, Falkenberg, in jungen Eichen, z. sltn.

37.\* *monographus* F. R., Kupp, Krascheow, Falkenberg in Eichen, z. hfg.

38. *dryographus* Er. Falkenberg. (Rd.)

39. *Saxesenii* Rtzbg. Rauden, sltn.

40. *eurygraphus* Er. Falkenberg. (Rd.)

9. *Eccoptogaster* Hb.

41.\* *scolytus* F. R., Kupp, Falkenberg, besonders in Rüstern (*Ulmus camp.*) z. hfg.

42. *destructor* OI. Falkenberg. (Rd.)

43. *multistriatus* Mrsch. R., Falkenberg, wie 41, aber sltn.

44.\* *pygmaeus* Hb. R., Falkenberg, wie 41.

45. *iutricatus* Koch. Kupp, Falkenberg, in Eichenstämmen, hfg.

46.\* *pruni* Rtzbg. R., Kupp, Falkenberg, in Pfauenbäumen, hfg.

47.\* *rugulosus* Koch. Desgl.

48. *carpini* Er. Falkenberg. (Rd.)

10. *Platypus* Hb.

49. *cylindrus* F. R., Kupp, Falkenberg.

11. *Apate* F.
- 50.\* *capucina* L. R. sfn., Kupp, Kráscheow, Falkenberg, in morschen Eichen, hfg.
12. *Cis* Ltr.
- 51.\* *boleti* Scop. In Baum schwämmen, an alten Stöcken, bis ins Gebirge, s. gemein.
52. *micans* F. Desgl., aber s. sfn.
- 53.\* *hispidus* Pk. Wie 51, aber nicht s. hfg.
54. *festivus* Block. Gráz. (Z.)
55. *glabratu*s Dj. 7. Ustron, in den Schwäm- men an Fichtenstöcken, nicht sfn.
- 56.\* *nitidus* F. Obora, Ustron, wie 51, aber nicht s. hfg.
- 57.\* *affinis* Gyll. R., Ustron, wie 51.
13. *Corticaria* Mrsh.
58. *pubescens* Jll. R., Giesmannsdorf, unter Moos, s. sfn.
59. *crenulata* Sch. Desgl.
60. *serrata* Pk. Obora, unter Moos, s. sfn.
61. *elongata* Sch. Ob., Kupp, unt. M., s. sfn.
- 62.\* *gibbosa* Hb. R., Kupp, Ustron, unter Moos, gemein.
63. *transversalis* Sch. Obora, unter M., s. sfn.
64. *fuscula* Mgl. Desgl.
14. *Lathridius* Hb.
65. *elongatus* Curt. R., unter Moos, s. sfn.
66. *acuminatus* Pk. Kuchelna (Z.).
- 67.\* *sculptilis* Sch. Ob., Stw., Brz., unter Moos, s. hfg.
68. *porcatus* Hb. Um Graswurzeln, sfn.
- 69.\* *parallelus* Sch. Ob., Stw., unt. M. z. hfg.
15. *Mycetophagus* Hllwg.
- 70.\* *4-maculatus* F. R., Gráz, Ustron, unter der Rinde alter Fichtenstöcke, hfg.
71. *atomarius* F. Ustron, desgl., aber s. sfn.
72. *variabilis* Hllwg. R., Ustron, wie 70, z. sfn.
73. *multipunctatus* F. Schillersdorf, wie 70, sfn.
74. *fulvicollis* Zenk. R., wie 70, s. sfn.
16. *Triphyllus* Mgl.
- 75.\* *2-fasciatus* F. Obora, Borutin, Ustron, wie 70, z. sfn.
76. *punctatus* Hllwg. Stw., unt. M., s. sfn.
77. *fumatus* L. Borutin (Z.).
78. *fagi* Chvr. Stw., unter Moos, s. sfn.
79. *fungorum* F. Im Schwamm an alten Weizen, sfn.
18. *Cerylon* Ltr.
- 80.\* *histeroides* F. Ueberall, bis ins Gebirge, unter der Rinde alter Fichtenstöcke, s. hfg.
81. *deplanatum* Gyll. Ustron, Karlsbrunn, wie 80, z. sfn.
19. *Monotoma* Hb.
- 82.\* *picipes* Pk. Stw., unter M., um Eichen, z. hfg.
20. *Rhizophagus* Hb.
83. *ferrugineus* Pk. Ustron, Karlsbrunn, unter der Rinde alter Stöcke, nicht hfg.
84. *depressus* F. R., im Fluge, Zawade, Schillersdorf, Gráz und wie 83.
85. *dispar* Pk. Wie 83.
- 86.\* *1-pustulatus* F. Wie 83.
87. *nitidulus* F. Wie 83, aber s. sfn.
21. *Bitoma* Hb.
- 88.\* *coenata* F. Ob., Zawade, Kupp, Gráz, Ustron, Karlsbrunn, unter der Rinde alter Bäume, hfg.
22. *Lycetus* F.
- 89.\* *canaliculatus* F. 6. Edke., unter d. Rinde alter Baumstöcke, z. hfg.
23. *Teredus* Dj.
90. *nitidus* F. 7. Ustron, unt. Buchenrinde, z. sfn.
24. *Colydium* F.
91. *elongatum* F. Kupp, Rosenberg, Falkenberg, Ustron, unter Rinde alter Stöcke, z. sfn.
25. *Nomosoma* Desm.
92. *elongatum* Ltr. Kupp, unter der Rinde alter Stöcke, s. sfn.
26. *Silvanus* Ltr.
93. *1-dentatus* F. Karlsbrunn, wie 92.
27. *Trogosita* Ol.
94. *caraboides* F. Karlsbrunn, 1837, unter der Rinde eines alten Fichtenstocks, 2 Er.
28. *Cucujus* F.
95. *depressus* F. Ustron, Karlsbrunn, unter der Rinde alter Stöcke, z. hfg.

29. *Laemophloeus* Dej.  
 96. *monilis* F. Gräß, Ustron, wie 95, s. slt.  
 30. *Uleiota* Latr. (Brontes F.)  
 97. *flavipes* F. R., um Obstbäume: Schillersdorf, um Eichen; Ustron, unter Rinde alter Stöcke, überall z. slt.

### III. Longicornia.

#### 1. *Spondylis* F.

- 1.\* *buprestoides* L. R., Durch das ganze Gebiet, bis ins Geb., auf Kiefern-Klasterschlägen, s. hfg.  
 2.\* *faber* L. Desgl., aber viel seltener.

#### 3. *Prionus* Geoffr.

- 3.\* *coriarius* L. Wie 1; jedoch auch in alten Kiefernstöcken und in alten Eichen.

#### 4. *Hammaticerus* Mgl.

4. *heros* F. Adamowiz, Rauden, Rybnik, Sembowiz, Kupp, Falkenberg, Oppeln, an alt. Eichen sitzend, z. slt.

- 5.\* *cerdo* L. Falkenberg. (Rd.)

#### 5. *Aromia* L.

- 6.\* *moschata* L. R., Malapane, Kupp, Flkbg., hfg. an alt. Weiden, in deren Mulm die Larve lebt.

#### 6. *Criocephalum* Dej.

- 7.\* *rusticum* L. Auf Holzpläzen, z. hfg.

#### 7. *Isarthron* Dej.

8. *Iuridum* F. R., Landsberg, Kupp, Flkbg., Krascheow, Ustron, in Kiefern- und Fichtenklasters und Stöcken, nicht hfg.

var. *aulicum* F. habe ich nur in Ustron gfnd.

#### 8. *Asemum* Eschs.

9. *striatum* L. R., Kupp, auf Holzpl. und Klasterschlägen nicht slt.

#### 9. *Hyletrupes* Serv.

- 10.\* *bajulus* L. R., Kupp, Krascheow, Flkbg., auch im Gebirge, an Kiefern- und Fichtenklasters, Planken u. c., nicht slt.

#### 10. *Callidium* F.

11. *dilatatum* Pk. Rybnik, Kupp, auf d. Bl. von *Salix cinerea*, z. hfg.; obwohl nicht jedes Jahr.

- 12.\* *violaceum* L. Durch das ganze Gebiet, b. ins Geb., an alten Weiden, auf Klasterschlägen und Holzpläzen, hfg.  
 13. *clavipes* F. Mit d. vorigen zsm., aber s. slt.  
 14.\* *sanguineum* L. Ob., Kupp, Flkbg., Ustron, auf Bl. und an Klaatern, z. slt.  
 15. *alni* L. Ob., Landsberg, an Erletalft., s. slt.  
 16.\* *variabile* L. (fennicum F.) R., Krascheow, Kupp, Falkenberg, an alten Weiden, Eichen, auf Holzpläzen u. z. hfg.

#### 11. *Clytus* Laichtg.

17. *detritus* L. Vor längerer Zeit sing ich 2 Ex. a. d. Edte. im Fluge, dann nicht wieder.  
 18.\* *arcuatus* L. R., Rauden, Kupp, Flkbg., Ustron auf Bl. und Holzpläzen, oft s. hfg.  
 19. *liciatus* L. (hafniensis F.) Malapane, s. slt. (v. F.)  
 20. *arietis* L. Falkenberg, slt. (Bd.)  
 21.\* *gazella* F. R., Krizanowiz, Ustron auf Holzpl., Bl. bes. Spir. Aruncus, nicht slt.  
 22. *massiliensis* L. Steinsdorf b. Neiße, Ustron, auf Bl., s. slt.  
 23.\* *verbasci* F. R., Edte., Zawade, Ustron, a. Holzpl., Bl., bes. Samb. Ebalus, nicht slt.  
 24. *misticus* L. Zawade, Polkoinsel b. Oppeln, z. slt.

#### 12. *Obrillum* Mgl.

25. *brunneum* F. 6. Bschfp., auf Bl., s. slt.  
 13. *Necydalis* L. (Molorchus F.)  
 26.\* *major* L. (abbreviatus F.) R., Falkenberg., an alten Weiden, z. slt.  
 27. *minor* L. (dimidiatus F.) R., Flkbg. Bschf., an Kiefernklästern, im jung. Edtz., a. Bl., z. slt.  
 28. *umbellaturum* F. Ustron, auf Bl., bes. Spiräen, s. slt.

#### 44. *Acanthoderus* Serv.

29. *varius* F. Brz. W., an Eichenklästern, slt.

15. **Astynomus** Dej.
30. **x aedilis** L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, auf Holzpläßen, bes. Kiefern-Klaftern, hfg.
16. **Leiopus** Serv.
31. **\* nebulosus** L. Brz. W., an Eichenkfst., s. slt.
17. **Pogonocherus** Mg.
32. **\* fasciculatus** F. R., Sawade, Elbfg., Ustron, auf Klasterschlägen, an Planken, z. slt.
33. **hispidus** L. } Im Gesenke, auf alten
34. **pilosus** F. } Stöcken, s. slt.
18. **Monohammus** Mg.
35. **sartor** F. Rauden (H.), Malapane (v. F.)
19. **Pachystola** Dej.
36. **x textor** L. Durch das ganze Gebiet, auf Hlzpl., an Wegen, a. alten Weiden z., z. hfg.
20. **Mesosa** Mg.
37. **\* curuloides** L. Brz. W., an Eichenkfst., Ustron auf alten Stöcken, slt.
21. **Anaesthetis** Dej.
38. **testacea** F. 7. Ustron, auf Sp. Aruncus, s. slt.
22. **Saperda** F.
39. **\* carcharias** L. Auf Populus nigra, z. slt.
40. **scalaris** L. Auf einer alten Weide 1 Cr.
41. **tremula** F. Krascheow. (v. F.)
42. **x populnea** L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, auf jungen Aspen, Pappeln, auch Bl., z. hfg.
23. **Stenostola** Dej.
43. **nigripes** F. R., Bschfp., im jungen Lbhlz., slt.
24. **Anaetia** Dj.
44. **\* praeusta** L. Auf jungem Laubholz, auch bei Ustron, z. slt.
25. **Oberea**.
45. **x oculata** L. Auf Holzpläßen, Bl., bis ins Gebirge, z. hfg.
46. **\* erythrocephala** F. Edke., Ustron, Karlsbrunn, an Klaftern, slt.
47. **linearis** L. Rupp, Falkenberg, Krascheow, slt.
26. **Phytoecia** Dej.
48. **affinis** Pz. Vor einigen Jahren in der Obora hfg., jetzt s. slt.
27. **Agapanthia** Serv.
49. **cardui** F. Edke., Gesenke (Gabelhäuser) slt.
50. **angusticollis** Gyll. Obora, Edke., im jungen Laubholz, slt.
51. **violacea** F. Edke., an einer Klafter, 1 Cr.
28. **Rhagium** F.
52. **x mordax** F. An Kiefern- und Fichten-Klaftern, bis ins Gebirge, z. hfg.
53. **\* inquisitor** F. Desgl., besonders im Gebirge, s. hfg.
54. **x indajator** F. Wie 53.
55. **\* 2-fasciatum** F. In der Ebene slt., im Gebirge z. hfg.
29. **Rhamnusium** Mg.
56. **salicis** F. Ratibor, hinter dem Schloß, Mosurau, an einer Gartenplanke, s. slt.
30. **Toxotus** Mg.
57. **\* cursor** L. Auf der Barania im Klo-cac= Gebirge in einem faulen Fichtenstamme gegen 20 ganz frisch entwickelte Cr., sonst nur einzeln an alten Stöcken.
58. **noctis** F. 1 Cr. auf dem Altvater gefangen und vom verst. Weber in Berlin bestimmt, kann kein Weibchen von 57 sein und eben so wenig zu 59 gehören.
59. **\* meridianus** L. Ratibor, auf Holzpläßen, an behauenen Stämmen, nicht hfg.
31. **Pachyta** Mg.
60. **x 4-maculata** F. Edke., slt.; Möltsch, Grätz, Ustron, sehr hfg. auf Spiräen.
61. **x maculata** F. Ratibor, z. slt., sonst wie 60.
62. **3-fusciata** F. Fand ich vor Jahren an der Barania auf alten Stöcken, z. hfg.
63. **clathrata** F. Desgl.
- var: **reticulata** F. Desgl., aber seltener.  
Ann.: 62, 63 und var: scheinen sehr slt. zu sein, denn sie haben so guten Abgang gehabt, daß ich selbst nur noch

ein Paar defecte Ex. besitze. Leider habe ich diese Gegend seit Jahren nicht wieder besuchen können.

64. *\* virginea* L. Auf Holzplätschen, alten Weiden, Bl., bes. Spiräen, hfg., auch im Geb.  
65. *\* collaris* L. Desgl.

### 32. *Strangalia* Serv.

66. *\* attenuata* L. An Holzstöcken, bes. aber auf Bl. in Gärten, s. hfg.  
67. *\* calcarata* F. Lde., Kupp, z. sltn.; im Gebirge auf Bl., bes. Spiräen, s. hfg.

### 33. *Stenura* Dej.

68. *\* 4-fasciata* L. Ratibor, Sawade, Kupp, im Kłocacz-Geb. u. Gesenke auf Bl., z. hfg.  
69. *\* villica* F. Krascheow, im Holze von Pop. tremula. (v. F.)  
70. *atra* F. Lde., Grätz, auf Bl., nicht sltn.  
71. *nigra* F. Wie 70, aber s. sltn.  
72. *\* melanura* L. Ratibor, Kupp, im Gebirge, auf Bl., hfg.  
73. *\* 2-fasciata* Mllr. Desgl.

### 34. *Leptura* L.

74. *\* virens* L. Im Kłocacz-Gebirge, im Gesenke, auf Bl., besonders Spiräen, hfg.  
75. *\* testacea* L. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, auf Holzschlägen, Bl. ic., s. hfg.  
76. *scutellata* F. Schillersdorf, Grätz, auf Buchen und Bl., z. sltn.  
77. *cincta* F. Ustron, zw. Fulneck und Tropau, z. sltn.  
78. *\* sanguinolenta* L. Ratibor, z. sltn.; im Gebirge, auf Bl., z. hfg.

79. *\* maculicornis* D. G. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, auf Bl., s. hfg.  
80. *\* livida* F. Desgl., weniger hfg.

81. *2-notata* Dj. Pleß, auf Rosen und andern Gartenbl., z. sltn.  
82. *6-guttata* F. Ultwater. 1841 p. 109.  
83. *rufipes* Schall. Obora, auf Bl., s. sltn.  
84. *lineata* n. sp. Uebers. 1843. p. 173.

### 35. *Grammoptera* Serv.

85. *\* laevis* F. Wie 79.  
86. *lurida* F. Obora, im jungen Eholz., s. sltn.  
87. *ruficornis* F. Oppeln, z. hfg. (v. F.)

## IV. Chrysomelina.

### 1. *Donacia* F.

Diese Käfer habe ich nur auf den um stehende Gewässer wachsenden Pfl. gefunden, ohne ermitteln zu können, welche Pfl. sie besonders lieben.

- \* crassipis* F. Nicht sltn.
- dentata* Hoppe. S. sltn.
- \* 2-dens* St. Sltn.
- \* dentipes* F. Hfg.
- \* lemnae* F. Hfg.
- \* sagittariae*. Hfg.
- \* impressa* Pk. B. hfg.
- thalassina* Grm. Sltn.
- \* sericea* L. B. hfg., in verschied. Varietäten.
- rustica* Sch. Sltn.
- variabilis* Dhl. Sltn.
- \* discolor* Hoppe. Hfg.
- affinis* Kze. S. sltn.
- nigra* F. S. sltn.
- \* menyanthidis* F. Bei Stolzmüh, sltn.
- simplex* F. Hfg.
- linearis* Hoppe. Sltn.
- semicuprea* Pz. Hfg.
- fennica* Pk. Brzezie, Sawade, sltn.
- hydrocharidis* F. S. sltn.

### 2. *Orsadacna* L.

- \* cerasi* F. 6—8. Ratibor, z. sltn., im Gebirge hfg., auf Bl., bes. Spiräen.

### 3. *Zenophora* Kze.

- \* subspinosa* F. N., Bschkp., Frühj. und Herbst, unt. M., sonst auf Bl., nicht sltn.
- \* flavicollis* Mrsh. Desgl.

### 4. *Crioceris* Geoffr. (Lema F.)

- \* merdigera* L. Auf verschiedenen Bl., z. hfg.

- 25.\* *brunnea* F. Desgl.
- 26.\* *12-punctata*. Desgl., bes. auf Spargel.
- 27.\* *asparagi* L. Meist. nur auf Spargel, z. hfg., auch die Variet. mit in Längsstriche verlaufenen Flecken.
28. *melanopa* L. Auf Bl., z. sltn.
29. *rugicollis* F. Desgl.
- 30.\* *cyanella*. Desgl., s. hfg.
5. ***Hispa*** L.
31. *atra* L. 6. Ratibor, Bschkp., um Graswurzeln, s. sltn.
6. ***Cassida*** L.
- 32.\* *equestris* F. (*viridis* L.) An Gräben, von *Mentha*-Arten u., geschöpft, nicht sltn.; bisweilen auch unter jungen Eichen.
33. *hemisphaerica* Hb. Ratibor, im Lbholz, geschöpft, s. sltn.
34. *vittata* F. Desgl.
- 35.\* *murraea* L. Obora, Pw., Dw., im Lbholz, auf jungen Pappeln, Birken u.; Bl., bes. Hieracien; Früh. und Herbst unter Moos, um Bmst., z. hfg.
- 36.\* *sanguinosa* Crtz. (*prasina* Hb.) Wie 35, weniger hfg.
- 37.\* *rubiginosa* Ill. (*viridis* F. Ent. Syst.) Meist im Laubholz, auf Blättern junger Eichen, Pappeln, Birken u., nicht sltn.
38. *vibex* L. Ratibor, Zawade, von Pfl., zwischen Gesträuch, geschöpft, sltn.
- 39.\* *chloris* Sussr. (*prasina* Ill.) Im jungen Laubholz, geschöpft, nicht sltn.
- 40.\* *nobilis* L. Durch das ganze Gebiet, im jungen Laubholz auf Eichen, Birken, Pappeln u.; im Frühj. und Herbst unter M., um Bmst., s. hfg.
41. *oblonga* Ill. Ob., im jungen Lbholz, sltn.
42. *obsoleta* Ill. Pw., Dw., desgl.
43. *ferruginea* F. Wie 42.
- 44.\* *nebulosa* L. Frühj. und Herbst unter Moos um Bmst., im Gem., sonst im jun-
- gen Laubholz auf Eichen, Birken, Pappeln u., hfg.
7. ***Adimonia*** Laichty.
- 45.\* *tanaceti* L. Ratibor, auf niedrigen Pfl., an Wegen durch Gebüsch u., umherkriechend, auch unter Gemille, s. hfg.
- 46.\* *rustica* Schall. Desgl., jedoch seltener.
- 47.\* *capreae* L. Durch das ganze Gebiet im jungen Laubholz, auf Birken, Pappeln, bes. auf Saalweiden, s. hfg.
8. ***Galleruca*** Geoffr.
- 48.\* *calamariensis* F. Auf Pfl. an stillstehenden Gewässern, z. hfg.
- 49.\* *viburni* Pk. Im jungen Laubholz, z. hfg.
- 50.\* *nymphaeae* L. Wie 48.
- 51.\* *lineola* F. Desgl., auch unt. M. u. Gem.
- 52.\* *nigricorne* F. Im jungen Lbholz., sltn.
9. ***Agelastica*** Chevr.
- 53.\* *alni* L. Durch das ganze Gebiet, auf Erlen, jungen Weiden, Birken, s. hfg.
10. ***Phyllobrotica*** Chevr.
54. *4-maculata* L. Pw., Falkenberg, im jungen Laubholz, sltn.
11. ***Luperus*** Geoffr.
- 55.\* *rufipes* F. R., sltn.; Kupp, Krascheow, Elbkg., Ustron, an alten Stöcken, z. hfg.
56. *flavipes* L. Desgl. jedoch seltener.
- 57.\* *pinicola* And. Desgl., s. hfg.
12. ***Calomierus*** Dillwyn.
58. *suturalis* Ill. Edke., a. einem Fichtenstck. 1 Cr.
13. ***Graptodera*** Chevr.
- 59.\* *oleracea* L. Ueberall, s. hfg.
- var. *eruae* F. Z. sltn.
14. ***Crepidodera*** Chevr.
60. *transversa* Mrsh. Auf Bl., s. sltn.
- 61.\* *exoleta* F. Frühj. u. Herbst unt. M., sonst auf Bl. durch d. gz. Gebt., b. i. Geb., s. hfg.
- 62.\* *nididula*. Desgl.
- 63.\* *helxines* L. Desgl., aber weniger hfg.
64. *fulvicornis* F. Ob., Kupp, auf Bl., z. slt.
- 65.\* *moderi* L. Ob., Pw., auf Bl., nicht hfg.

- 66.\* *pubescens* E. H. Ob., Pw., Desgl.
15. ***Phyllotreta*** Chevr.
- 67.\* *armorariae* E. H. Ratibor, Frühj. und Herbst, unt. M., im Sommer auf Bl., nicht hfg.
- 68.\* *tetrastigma* Kze. Desgl.
69. *brassicae* F. Desgl., aber s. sltn.
- 70 *sinuata* Dj. Wie 69.
71. *flexuosa* Jll. R., Kupp, Falkenberg, s. sltn.
- 72.\* *memorium* L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, wie 67, s. hfg.
- 73.\* *atra* F. Wie 67.
- 74.\* *lepidii* E. H. Desgl.
75. *obscurella* Jll. Sawade, s. sltn.
16. ***Aphthona*** Chevr.
- 76.\* *cyparissiae* E. H. Auf Brachen, von niedrigen Pfl., geschöpft, hfg.
77. *lutescens* Gyll. Ob., Bräzie, auf Bl., sltn.
- 78.\* *euphorbiae* Schr. R., Frühj. und Herbst unter Moos, im Sommer auf Bl., hfg.
- 79.\* *pygmaea* Ullr. Desgl., aber weniger hfg.
80. *rubi* Pk. 7. Ustron, auf Bl., s. sltn.
81. *salicariae* Pk. Ratibor, auf Bl., s. sltn.
17. ***Teinodactyla*** Chevr.
82. *verbasci* Pz. 8. Grabowka, Sawade, auf Bl., s. sltn.
83. *atricilla* L. 6. Obora, unter Moos, s. sltn.
- 84.\* *nasturcii* F. An Gräben, von Pfl., geschöpft, s. sltn.
85. *pratensis* Pz. Auf Wiesen ic. wie 84.
86. *longicornis* 106. Ratibor, Kupp, auf Brächen, geschöpft, s. sltn.
87. *pussilla* Gyll. 6. Pw., auf Bl., s. sltn.
- 88.\* *lurida* Rossi. 6—8. Ob., Pw., auf Pfl., nicht hfg.
- 89.\* *parvula* Pk. 5—9. Auf Wiesen, im Laubholz, von Bl. geschöpft, hfg.
18. ***Psylliodes*** Ltr.
90. *hyoscyami* L. 5. Pw., unt. M., s. sltn. (Th.)  
var. *chloromera* St. Desgl.  
var. *coerulea* E. H. Desgl.
91. *chrysocephala* L. 6. Pw., unt. M., s. sltn.
- 92.\* *rapae* Jll. (*napi* F.) 6. Obora, Ustron, auf Bl., s. sltn.
93. *cuprea* E. H. 6. Obora, auf Bl., s. sltn.
- 94.\* *affinis* Pk. 5—8. Dw., Pw., auf Bl., s. bfg.
19. ***Plectroscelis*** Chevr.
- 95.\* *semicoerulea* E. H. 5—8. An der Oder, auf Pfl., s. hfg.
- 96.\* *dentipes* E. H. 5—8. Obora, Edke., Kupp, auf Pfl., hfg.
97. *Sahlbergii* Gyll. 6. Obora, auf Bl., s. sltn.
- 98.\* *aridella* Pk. 6. 7. Pw., Dw., Kupp, auf Bl., s. hfg.
99. *aridulla* Gyll. 5. Ob., unt. Moos, s. sltn.
20. ***Balanomorpha*** Chevr.
100. *rustica* L. 6. An der Oder, auf Pfl., sltn.
101. *chrysanthemi* E. H. 7. Pw., an der Oder, auf Bl., sltn.
21. ***Podagrion*** Chevr.
- 102.\* *fuscicornis* L. Frühj. und Herbst unter M., im Sommer auf verschiedenen Pfl., hfg.
22. ***Argopus*** Fisch.
103. *testaceus* F. Frühj. unter Moos, sltn.
23. ***Timarcha*** Mgl.
104. *coriaria* F. 7. Karlsbrunn, 1 Ex., unter Steinen.
- 105.\* *metallica* F. 2. ein Pärchen, und 4. 1843. 1 Ex. in der Obora, unter Moos; sonst im Kloacz-Gebirge und Gesenke hfg.
106. *splendens* Köhl. 5. 1843 Obora, 2 Ex. unter Moos, 6. 1842, 2 Ex. bei Ustron, unter Steinen.
24. ***Chrysomela*** L.
107. *atra* Dahl. Karlsbrunn. Uebr. 1842 p. 155.
- 108.\* *göttingensis* L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, unter Moos, Gemille, St. ic., hfg.
109. *sturmii* (v. Ullr. best.) Obora, 2 Ex., unter Moos; Ustron, 2 Ex., unt. Steinen.
110. *Dahlii* Kn. 7. Karlsbrunn, unt. St., sltn.
- 111.\* *haemoptera* L. (*hottentotta* F.) R., unt. M. u. Gem., Ustron u. Karlsbrunn, unter St., s. hfg.

112. \* *sanguinolenta* L. Wie 108.  
var. *marginalis* Besser. Mit 112 zus., aber seltener.
113. *limbata* F. 6. Obora, unter M.; Karlsbrunn, unt. St., Rosenberg (Rdsch.) sltn.
114. \* *marginata* L. 6—9. Ob., Karlsbrunn, auf Bl., z. sltn.
115. *analis* L. var. *schach.* F. Ob., 1 Ex. unt. M.; Ustron, 1 Ex. unter St.; ein etwas größeres, b. Groß-Strehlitz gefangenes Ex., mehreren Entomol. fremd, scheint auch hierher zu gehören.
116. *lamina* F. 7. Ob., Edke., z. sltn.
117. *geminata* Pk. 7. Ob., 1 Ex.; Ustron, Karlbrunn, s. sltn.  
var. *brunsvigensis* Kn. Nur b. Ustron u. Karlbrunn, s. sltn.
118. \* *fucata* F. (gemellata Rossi.) An Gräben, auf Mentha-Arten, bisweilen s. hfg.
119. \* *varians* F. Durch das gä. Gebiet, bis ins Gbg., auf verschiedenen Pflz. und in verschiedenen Färbungen, s. hfg.
120. \* *fulgida* F. R., Kupp, Ustron, Karlsbr., im jung. Ebbh., a. Pappeln, Birken, Weiden, nicht sltn.
121. \* *graminis* L. An denf. Orten, außer auf Tanac. vulg. auch auf andern Pfl., z. hfg.
122. \* *fastuosa* L. Wie 120, in verschd. Färbgn.
123. \* *menthae* Schrk. Durch d. gze. Gebiet, an Gräben auf Mentha-Arten, bes. *Mentha sylvestris*, hfg.; seltener im Gebg.
124. *cerealis* L. Obora, Grätz, s. sltn.  
\* var. *Megerlei* F. Obora, z. sltn.; Ustron, s. hfg. unter Gemille.
125. \* *staphyleae* L. Ueberall, im jung. Ebbh., unter Moos und Gemille, s. hfg.
126. \* *polita* L. Desgl., scheint bes. Saalweiden zu lieben.
25. *Oreina* Chevr.
127. *gloriosa* F. 7. Karlsbrunn, auf Bl., z. hfg.
128. *alpicola* Hoppe. Mit 127 zusammen.
129. *senecionis* Köhl. Desgl., z. sltn.
130. \* *phalerata* Ill. 7. Im Gesenke, bes. am Glaserberge; auf Bl., hfg.
131. *cacaliae* Schrk. Desgl.
132. \* *speciosa* L. Desgl.
133. *intricata* Grm. Desgl.
- Anm. Von 127—133 hatte ich meist über 60 Ex., die aber, bis auf einzelne, vertauscht worden sind.
26. *Lina* Mg.
134. \* *populi* L. } Ueberall, im jungen  
135. \* *tremulae* F. } Laubholz ic., gemein.
136. \* *cuprea* F. Obora, Edke., Ustron, Karlbrunn, auf Bl., z. sltn.
137. \* *aenea* L. Desgl.
138. \* *20-punctata* F. Desgl.
139. *collaris* F. Karlsbrunn, auf jung. Ebbh., s. sltn.
27. *Gonioclena* Chevr.
140. \* *viminalis* L. 6—8. R., Kupp, Ebbh., im jungen Ebbh., Pappeln, Birken, Saalweiden ic., hfg.
141. \* *haemorrhoidalis* F. Nur bei Kupp a. Sal. *cinerea*, s. hfg. Dürfte doch wohl eigene Art sein.
142. *rufipes* De G. R., Ebbh., mit 140 zus., selten.
143. \* *pallida* L. Wie 140.  
(*Spartophila* Chevr.)
144. *6-punctata* F. Karlsbrunn. (H.)
145. \* *litura* F. 6—8. Wie 140.
28. *Plagiodesma* Chevr.
146. \* *armoraciae* L. 5—8. Unt. M., a. Bl., hfg.
29. *Gastrophysa* Chevr.
147. \* *polygoni* L. Auf Pfl. um stehende Gewässer, auch im Ebbh., unter Moos, hfg.
148. \* *raphani* F. R., Kupp, Gleiwitz, sltn.; Karlsbrunn hfg.
30. *Phratora* Chevr.
149. \* *vitellinae* L. Ueberall, auf Weiden, gem.  
var. *vulgatissima*. Dürfte doch wohl eigene Art sein.

31. **Phaedon** Mgl.
150. *carniolicus* Mgl. Karlsbrunn, von Pf. geschöpft, s. sltn.
151. *pyritosus* Rossi. Ustron, von Pf. geschöpft, s. sltn.
152. *neglectas* Dj. Desgl.
- 153.\* *cochliariae* F. R., unter M., auf Bl., nicht hfg.
- 154.\* *auctum* F. R., Ustron, z. hfg.
155. *gramica* (Ullr. bsi.) Ustron, s. sltn.
32. **Prasocuris** Latr. (Helodes Pk.)
156. *marginella* L. R., im jung. Ebbh., sltn.
- 157.\* *phellandrii* L. An d. O., um Stüttg. Gewässer, von Pf. geschöpft, oft s. hfg.
- 158.\* *beccabunga* Hllwg. Desgl., aber s. slt.
33. **Bromius** Chevr.
- 159.\* *obscurus* L. R., Kupp, im Ebbh., bes. auf Saalweiden, hfg.
160. *vitis* F. R., an einem Gartenzaune, 2 Er.
34. **Pachnephorus** Chevr.
161. *arenarius* Crtz. Ob., 1841. 1 Er. unter Moos um eine alte Kiefer.
35. **Clytbra** Laichtg.
162. *4-punctata* L. 6—8. R., Edke., Ustron, Karlsbrunn u., im jungen Ebbh., z. sltn.
163. *laeviuscula* Btzbg. Desgl., weniger sltn.
36. **Lapidostomis** Chevr.
164. *cyanicornis* Dahl. 9. Kupp, um Waldränder, von Salix cinerea geschöpft. sltn.
165. *3-dentata* L. 6—8. Ob., Pw., im Ebbh., z. sltn.
166. *fulgida* Dahl. 5. R., Katscher, auf Waldbäumen, sltn.
167. *longimana* L. 6—8. R., Ustron, Karlsbrunn, im Ebbh., nicht hfg.
37. **Coptocephala** Chevr.
168. Hierher dürfte *Clytus diversipes* Letzner gehören. Uebers. 1839, p. 114 — 116. Desgl. 1844, p. 198.
- 169.\* *scopolina* L. R., Kupp, auf Bl., best. Dolden, z. hfg.
170. *tetradyma* Mgl. Desgl., aber sltn.
- 171.\* *4-maculata* F. Desgl., auch an Kiefern, nicht sltn.
38. **Cyaniris** Chevr.
172. *aurita* L. Edke., s. sltn.
- 173.\* *affinis* Hllwg. 6. R., Bschp., im Ebbh., z. hfg.
- 174.\* *cyanea*. Desgl., noch häufiger.
39. **Pachybrachis** Chevr.
- 175.\* *hieroglyphica* Laich. 6—8. R., Kupp, Ustron im Ebbh., bisweilen hfg.
40. **Cryptocephalus** Geoff.
176. *2-maculatus* F. Beneschau. (Z.)
- 177.\* *2-punctatus* L. R., Sawade, Katscher, Kupp, Karlsbrunn im jungen Ebbh., nicht selten.
178. *lineola* F. Ob., Pw., Sawade, im Ebbh., aber nie mit 177 zus., s. sltn.
179. *coryli* L. R., Bschp., im Ebbh., z. sltn.
180. *cordiger* F. R., Sawade, Karlsbrunn, im Ebbh., s. sltn.; v. U. fand ihn besonders auf Sal. Caprea.
181. *variabilis* Schn. Katscher, Sawade, Karlsbrunn, im Ebbh., s. sltn.; v. U. fand ihn auf Sal. Caprea und avrita.
- 182.\* *6-dunctatus* L. R., Edke, Sawade, Ustron, Karlsbrunn, im Ebbh., z. sltn.
- 183.\* *variegatus* F. Wie 182.  
var. *distinguendus* F. Nur 1 Er.
- 184.\* *4-puocatus* Ol. R., Edke., Sawade, im Laubholz, z. sltn.
185. *laetus* F. Obora, an jungen Birken, s. slt.
186. *10-punctatus* L. Desgl.
- 187.\* *srenatus* F. Ob., Dw., Sawade, an der Oder, auf Birken, Weiden und den dazwischen stehenden Bl., hfg.
- 188.\* *flavescens* F. Desgl., weniger hfg.
- 189.\* *Moraei* L. Durch d. gg. Gebiet, im Ebbh. und besonders auf Kleefeldern, s. hfg.
190. *3-pustulatus* F. 6—8. Ob., Pw., Kupp, im Laubholz, nicht hfg.

- 191.\* *sericeus* L. Durch das gze. Gebiet, auf verschiedenen Bl., besonders Hieracien und Ranunkeln, s. hfg.  
var. *auratus* Mgl. R., Edke, Ufftron, Karlsbrunn, z. sltn.
- 192.\* *chlorodius* Mgl. Wie 191; ist doch wohl eigene Art.
193. *violaceus* F. R., Krascheow, auf jungen Birken, 2 Gr.
194. *nitidulus* F. Pw., Sawade, Jägerndorf, Karlsbrunn, im jungen Ehlz., z. sltn.
195. *nitens* L. Desgl.
196. *flavifrons* F. Desgl.
- 197.\* *flavipes* F. Desgl., jedoch weniger sltn.
198. *frontalis* Mrsh. Ratscher, im Ehlz., 2 Gr.
199. *flavilabris* F. Desgl.
200. *sulcratus* Grm. Ich fing ihn vor Jahren um R. in großer Menge mit 187 zusammen und vertauschte die Gr. bis auf 1, da ich hoffte, ihn auch ferner noch oft zu finden; leider ist er mir nicht wieder vorgekommen.
201. *marginatus* F. Wie 200. Ich fing später nur noch 2 Gr.
- 202.\* *geminus* Mgl. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gbg., hfg.
203. *Wasastjernae* Gyll. Dw., auf Wiesenbl. geschöpft, s. sltn.
204. *labiatus* L. Wie 202.
205. *Hübleri* F. Ufftron, auf Wiesenbl. geschöpft, s. sltn.
- 206.\* *vittatus* F. Ob., Dw., Rudnik, Kupp, im Ehlz., z. hfg.
207. *2-lineatus*. Wie 205.
208. *elegantulus* Ol. Obora, Edke, Ufftron, im Ehlz. und unter Moos, selten.
209. *pusillus* F. Brz. W., Kupp, von Bl. geschöpft, z. sltn.
210. *minutus* F. R., Kupp, an Bl. geschöpft, hfg.
- 41. *Diopus* Chevr.**
211. *pini* L. R., Kupp, Falkenberg, Ufftron, an Kiefern, nicht hfg.
- 42. *Triplex* Hb.**
212. *russica* L. (*nigripennis* F.) R., Edke., unt. Rinde an alten Stöcken, z. sltn.
- 213.\* *aenea* Pk. Rath., in Baumschwämmen, nicht sltn.
- 214.\* *2-pustulata* F. R., Grätz, unt. Rinde, z. sltn.
- 43. *Phacrus* Pk.**
- 215.\* *corruscus* Pk. Frühj. unter Moos um Brust, s. hfg.
- 44. *Olibrus* Er. (*Phalacrus* Pk.)**
- 216.\* *corticalis* 6–8. R., Bischp., Kupp, unt. Rinde u. Moos, um alte Stöcke, z. hfg., bes. bei Kupp.
- 217.\* *aeneus* F. Frühj. unt. M., später unter Bl., nicht sltn.
- 218.\* *2-color* F. Desgl., bes. auf Maibl., z. slt.
219. *millesolii* Pk. (*ulicis* Gyll.) 6. Ob., unt. M., s. sltn.
220. *pusillus* Dj. (*pygmaeus* St.) Desgl., z. selten.
- 221.\* *geminus* Ill. (*testaceus* Gyll.) Frühj. unt. M., später auf Bl., nicht hfg.
- 45. *Amphicyllis* Er.**
222. (*Agathidium*) *globus* F. 6. Dr. D., Ehnst. unter Moos und Gemille, s. selten.
- var. *tota rufo-ferruginea*. Desgl. (Th.)
- 46. *Agathidium* Ill.**
223. *atrum* Hb.
224. *seminulum* L. Obora, Ehnst., Pw., im
225. *badium* Zgl. Frühj. unter Moos und
226. *laevigatum* Er. Frühj. unter Moos und
227. *rotundum* Gyll. Gemille, s. sltn.
228. *marginatum* St.
229. *glabratum* Wltl. Zaupitz b. Neiße. (H.)  
(*Clambus* Er.)
230. *minutum* St. Ehnst., im Frühj. unter M., s. selten.
231. *armadillo* De G. (*punctulum* St. ?)  
Desgl., auch unter Dgr., s. sltn.

## IV. Trinera.

### 1. Hippodamia Chevr.

- 1.\* *mutabilis* Jll. 5—9. Auf Bl. u. Blättern im jungen Etblz., bis ins Gbg., hfg.
- 2.\* *13-punctata* L. Desgl.
2. *Anisosticta* Chevr.
- 3.\* *19-punctata* L. 5—9. Sawade, Borutin, z. hfg.; sonst sltn.
4. *M-nigrum* F. 6—7. Brz. W., Sawade, Ede., Kupp, im Etblz., sltn.

### 3. Coccinella L.

Diese Käfer leben vom Frühj. bis Herbst meist auf Bl. und Blättern, jungen Stämmen, selbst Kiefern. Sie suchen überhaupt die freien, der Sonne ausgesetzten Stellen, an welche andere Insecten ihre Eier absetzen, deren Larven sie verzehren und dadurch nützlich werden.

- 5.\* *hieroglyphica* L. Ob., Rudnik, z. sltn.
- 6.\* *2-punctata* L. Durch d. g. Gebiet z. hfg.
- 7.\* *6-pustulata* L. R., z. sltn.  
var. *4-pustulata* F. R., hfg.  
var. *dispar* Jll. R., s. sltn.
- 8.\* *7-punctata* L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, hfg.
- 9.\* *5-punctata* L. Desgl.
10. *16-punctata* F. Ede., Krascheow, s. sltn.  
var. *marginepunctata* F. Ede., s. sltn.
- 11.\* *impustulata* L. Durch das g. Gebiet, bis ins Gebirge, hfg.
- 12.\* *conglobata* L. Desgl.
- 13.\* *22-(20-)punctata* L. R., Bschfp., z. hfg.
- 14.\* *variabilis* Jll. Desgl., weniger hfg.
15. *humeralis* Sch. R., Bschfp., z. sltn.
- 16.\* *12-pustulata* F. Wie 11.
- 17.\* *14-pustulata* L. Wie 11.
- 18.\* *ocellata* L. Desgl., aber z. sltn.
- 19.\* *oblongoguttata* L. Wie 18.
20. *tigrina* L. R., Kupp, s. sltn.

- 21.\* *16-guttata* L. Wie 18.
22. *bis-7-guttata* F. R., Krascheow, sltn.
- 23.\* *14-guttata* L. Bes. auf Haselnusssträuchern hfg.
- 24.\* *bis-6-guttata*. Wie 23, aber seltener.
25. *18-guttata* L. Brzezie, Budzin, z. sltn.
5. *Hyperaspis* Chevr.
26. *lateralis* Pz. Obora, Pw., z. sltn.
5. *Micraspis* Chevr.
- 27.\* *12-punctata* L. Frühj. unt. M., später auf Bl. u. Blättern, hfg. in der Ebene als im Gebirge.

### 6. Chilocorus Leach.

- 28.\* *renipustulatus* Scr. Z. hfg. Durch das g. Gebiet, bis ins
- 29.\* *2-pustulatus* L. Z. sltn. Gb., im Frühj.
- 30.\* *4-pustulatus* L. Hfg. unt. M., später
31. *meridionalis* Dj. S. sltn. a. Bl. u. Blät., bei. im jungen
- 32.\* *auritus* Scr. Z. sltn. Laubholz.

### 7. Cynegetis Chevr.

- 33.\* *globosa* Schn. Überall, s. hfg.
- 34.\* *impunctata* L. Desgl., aber nicht s. hfg.
8. *Scymnus* Kug.
35. *nigrinus* Kug. 6—8. Ob., Bschfp., Glkbg., im jungen Etblz., sltn.
36. *flavipes* Pz. Falkenberg. (Rd.)
37. *ater* Kug. 6. Obora, unter Moos, s. sltn.
38. *parvulus* F. 6—8. Obora, Borutin, s. sltn.
39. *haemorrhoidalis* Hbst. 3—5. R., unter M., sltn.

40. *analis* F. Obora, Falkenberg, s. sltn.
41. *flavilabris* Pz. Obora, s. sltn.
42. *frontalis* F. Stw., Kl. Herlich, s. sltn.
43. *bis-2-pustulatus* F. Obora, s. sltn.
44. *4-notatus* Mgl. Desgl.
45. *4-pustulatus* St. Desgl.
46. *discoideus* Schn. Pw., Falkenberg, sltn.
47. *abietis* Pk. Ob., Sawade, Glkbg., z. sltn.

### 9. Nundina Dj.

48. *litura* F. 6. Obora, um Bmst., s. sltn.
16. *Coccidula* Kug.
- 49.\* *scutellata* F. Obora, Brzezie, Borutin, Bschfp., z. hfg.

50. *pectoralis* F. Karlskruhn. (v. U.)  
**11. Endomychus** W. 1892  
 51. *coccineus* L. 6—8. R., hinter dem Schloße,  
 auf Bl., jungen Weiden, z. hfg.

## V. Dimera.

### 1. Tychus Pk.

1. *niger* Pk. Stw., im Frühj. unt. M., um  
 Bmst., s. sltn.

### 2. Euplectus Krb.

2. *sulcicollis* Mgl. Im Frühj. geschöpft, auch  
 in der Nähe von Pilzen (b. Schießhaus),  
 s. sltn. (Th.)

3. *Karstenii* Rchb. Ob., im Frühj. unter M.,  
 um Bmst., s. sltn. (Th.)

- 4.\* *ambiguus* Rchb. Stw., unter M., z. sltn.  
**3. Briaxis Koch.**

- 5.\* *sanguinea* Pk. R., unt. M., um Bmst., z. hfg.

6. *longicornis* Leach. Stw., unt. M., s. slt. (Th.)

7. *fossulata* Rchb. Stw. unt. Moos, an der  
 Oder unter Gemüse, z. sltn.

- 8.\* *haematica* Rchb. Ob., Stw., Pw., unter  
 Moos um Bmst., hfg.

### 4. Bythinus Leach.

9. *Curtisi* Leach. Frühj., im Stw., unter M.,  
 um Eichen, sltn.

- 10.\* *Burellii* Denny. Desgl., z. hfg.

11. *Iuniger* Aubé. Stw., unt. M., s. slt. (Th.)

12. *bulbifer* Kn. Stw., unter Moos, s. sltn.

13. *glabricollis* Rchb. Wie 11.

14. *clavicornis* Pz. Wie 12.

### 5. Pselaphus Hb.

15. *Heisii* Hb. Wie 11.

### 6. Claviger Pr.

16. *foveolatus* Mlr. 6. Ob., unter Laub mit  
 Ameisen zus., z. sltn.

## N a c h t r a g.

Während des Druckes stellten sich noch ein:

- 1.\* *Cryptophagus dermestoides* Hb. 7. Ustron,  
 an der Weichsel, unter St., z. hfg.

- 2.\* *Cryptophagus tetraphagus* Grm. Desgl.
3. *Diacanthus impressus* F. 5. R., unt. Gem.,  
 s. sltn.
- 4.\* *Adrastus axillaris* Er. R., Ustron, z. sltn.
- 5.\* *Adrastus pallens* F. Desgl.
6. *Orthoperus* (*Cryptoph.*) *atomus* Gyll. 7.  
 R., Ustron in Baumstammwänden, s. sltn.

## Übersicht.

### I. Pentamera.

1. Caraboidea . . . . .	285
2. Hydrocantharida . . . . .	68
3. Brachelytra . . . . .	363
4. Sternoxa . . . . .	97
5. Malacodermata . . . . .	88
6. Xylotrogi . . . . .	39
7. Clavicornia . . . . .	184
8. Palpicornia . . . . .	38
9. Lamellicornia . . . . .	83
	1245

### II. Heteromera.

1. Melasomata . . . . .	4
2. Taxicornia . . . . .	17
3. Tenebrionida . . . . .	7
4. Heloplia . . . . .	9
5. Trachelida . . . . .	16
6. Cantharida . . . . .	7
7. Stenelytra . . . . .	17
	77

### III. Tetamera.

1. Rhynchophora . . . . .	324
2. Xylophaga . . . . .	97
3. Longicornia . . . . .	87
4. Chrysomelina . . . . .	231
	739

### IV. Trimera . . . . .

### V. Dimera . . . . .

### Nachtrag . . . . .

Hier von kommen 1892 auf die Umgegend von  
 Ratibor, indeß die übrigen 242 dem weiteren  
 Überhlesiien ausschließlich angehören.



Die Schwierigkeit der Ausarbeitung, wie die des Drucks, hat nachstehende Verbesserungen veranlaßt:

G.	3	C.	1	S.	19	v.	o.	I.	Rauden	st.	Rauden.
-	3	-	1	-	21	v.	o.	I.	Kupp	st.	Kupp.
-	3	-	1	-	2	v.	u.	I.	1845	st.	1345.
-	3	-	2	-	9	v.	u.	I.	angeschwemmt	st.	angeschwemmteu.
-	5	-	1	-	8	v.	o.	I.	chern	st.	cheru.
-	5	-	1	-	11	v.	o.	I.	Agonum	st.	Agorum.
-	5	-	2	-	19	v.	o.	I.	lepidus	st.	lequidus.
-	5	-	2	-	11	v.	u.	I.	129	ft.	119.
-	6	-	2	-	4	v.	u.	I.	158	ft.	168.
-	8	-	1	-	10	v.	o.	I.	Crtz.	st.	Cetz.
-	9	-	2	-	16	v.	u.	I.	assimile	st.	assimile.
-	10	-	2	-	15	v.	u.	I.	häufig	st.	häufig.
-	14	-	2	-	17	v.	u.	I.	hfg.	st	hfg.
-	22	-	2	-	16	v.	u.	I.	rubens	st.	rnbens.
-	23	-	2	-	6	v.	u.	I.	78	ft.	76.
-	30	-	1	-	20	v.	u.	I.	pusillus	st.	pussilus.
-	37	-	2	-	7	v.	o.	I.	H.	st.	Ol.
-	39	-	2	-	7	v.	o.	I.	primitus	st.	primitns.
-	42	-	2	-	8	v.	u.	I.	intricatus	st.	iutricatus.
-	44	-	2	-	18	v.	o.	I.	Rd.	st.	Bd.
-	45	-	1	-	19	v.	o.	I.	sttn.	st.	sttn.
-	47	-	1	-	20	v.	u.	I.	Fruhj.	st.	Fruh.
-	48	-	1	-	9	v.	o.	I.	nemorum	st.	memorium.

—	1	E.	1	B.	5	v.	o.	soll vor Kupp ein (.) stehen.
—	5	—	2	—	12	v.	o.	soll vor Ulz ein (.) stehen.
—	9	—	1	—	17	v.	o.	soll vor U. ein (.) st.
—	9	—	1	—	10	v.	u.	— wodurch ein (.) st.
—	21	—	1	—	20	v.	o.	— Kupp (R.) st.
—	22	—	1	—	12	v.	u.	— Ufftron (Edke.) st.
—	27	—	2	—	15	v.	u.	soll hinter Gem ein (.) st.
—	29	—	2	—	16	v.	o.	— St. (R.) st.
—	31	—	2	—	5	v.	o.	— Falkenbg. ein (.) st.
—	37	—	1	—	14	v.	u.	— Gem. ein (.) st.
—	37	—	2	—	17	v.	u.	— 150. ein (*) st.
—	45	—	2	—	18	v.	o.	— Schloß ein (.) st.
—	46	—	1	—	3	v.	u.	— Ultwater. (Uebers.) stehen.

S.	G.	C.	N.	140. aethiops soll cursiv gedruckt sein.
—	6	—	1	145. latibulus
—	8	—	2	224. sciapus
—	11	—	1	43. silesiacus
—	12	—	2	35. languida
—	14	—	1	102. gracilis
—	14	—	1	103. intermedia
—	17	—	2	263. coerulescens
—	18	—	2	323. dichrous
—	20	—	1	18. nocivus
—	20	—	1	19. fagi
—	21	—	1	42. obscurus
—	21	—	2	64. 4-pustulatus
—	21	—	2	68. ferrugineus
—	23	—	1	47. fulvipennis
—	23	—	2	78. ater
—	25	—	2	18. nigrita
—	25	—	2	22. 4-maculatum
—	26	—	1	56. var. minor
—	26	—	2	59. pusilla
—	28	—	1	142. plana
—	37	—	1	120. amoenus
—	37	—	1	127. glaucus
—	42	—	2	48. carpini
—	44	—	1	96. monilis
—	44	—	2	20. arietis

**S. 1 C. 2 № 19.** *quadrillum* soll nicht cursiv gedruckt sein und statt: Nur in — soll R., a. d. Oder; — stehen.

S. 19. C. 1 № 335. *piceum* soll nich cursiv gedruckt sein.  
 — 21. — 1 — 44. *mesomelas* desgl.  
 — 33. — 1 III. № 4. *quercinus* desgl.  
 — 34. — 1 VII. — 2. *sanguinicollis* desgl.  
 — 38. — 1 № 178. *laevigatus* desgl.