

Für Kleinpolen als neu nennt der Verfasser: 1. *Smerinthus populi* L. ab. *rufescens* Sal. Longch. 2. *Agrotis fimbria* L. ab. *brunnea* Tutt. 3. *A. f.* ab. *virescens* Tutt. 4. *A. primulae* Esp. v. *conflua* Tr. 5. *Bombycia viminalis* F. v. *obscura* Stgr. 6. *Xylina ingraca* HS. ab. (v.) *pexata* Grote.

NIEZWYKŁE ŻEROWANIE KORNIKA BRÓZDKOWANEGO (*PITYOPHTHORUS MICROGRAPHUS* L.)

[THE UNCOMMON FEEDING OF THE BARK-BEETLE
(*PITYOPHTHORUS MICROGRAPHUS* L.).]

podał

A. KOZIKOWSKI (Lwów).

Drobny ten 1·1 do 1·5 mm długości mierzący kornik występuje zwykle w żerdziowinach świerkowych, rzadziej już na jodle, sośnie pospolitej i wejmutce, a zatem na drzewach szpilkowych, jak zresztą wszystkie jemu pokrewne gatunki. Mimo to złapałem go d. 4. IX. 1914 w Rymanowie-zdroju, żerującego na czereśni. Niedowierzając sobie z powodu osobliwości żerowania tego wybitnego szkodnika drzew szpilkowych na drzewie liściastym, poprosiłem jeszcze śp. Marjana Łomnickiego o sprawdzenie oznaczenia gatunku, które potwierdziło moją determinację.

Jak na załączonej fotografii kawałka drzewa czereśni widać, był to dopiero początek żerowania, ale już z tego sądzić można, że obraz żerowania byłby taki sam, jak na drzewach szpilkowych. Komórka godowa bowiem wygryziona jest w drzewie pod korą, chodniki macierzyste zataczają poprzeczne łuki o ostrych konturach naokoło strzały, widać w nich też już poszczególne nyże jajowe i początkowy żer młodej larwy. Czy jednak potomstwo byłoby w czereśni dojrzałe i wydało owada doskonałego, jest rzeczą wątpliwą, gdyż w niektórych chodnikach macierzystych, bynajmniej niedokończonych, znalazłem nieżywe, spleśniałe samiczki.

Okazy pochodzą z młodej czereśni, którą znalazłem ściętą wśród żerdziowiny świerkowej w dolinie zdroju rymanowskiego na północny wschód od samego zdroju.



Cielęzki czereśni z gniazdemi kornika bródkowanego (*Pityophthorus micrographus* L.)
 The cherry-tree branches with the burrows of the bark-beetle (*Pityophthorus micrographus* L.)

SUMMARY.

This bark-beetle a distinct parasite of the spruce was found by the author on the 4. th september 1914 at Rymanów feeding on a cherry-tree branch in a young spruce wood.